

國家生技研究園區營運中生態監測調查計畫 季報告書

營運中第 8 季
秋，109 年 9-11 月
<修訂版>

主辦單位

中央研究院

執行單位

福爾摩莎自然史資訊有限公司

調查團隊

計畫主持人：白梅玲

協同主持人：連裕益

研究人員：邱于祐、陳保元、池文傑、楊昌諺、
周政翰、黃嘉祥、王宸勻、陳柏緯、
馬英普、黃婕寧、陳建彰、林天讚、
黃盈修、許廷毅

中華民國 110 年 3 月

摘要

本案計畫為「國家生技研究園區營運中生態監測調查計畫」，監測地點位於臺北市南港區研究院路二段 12 巷底，服務案依約每季（每 3 個月）須提送 1 次季報告書。

營運中第 8 季監測調查時間為 2020 年 9 月至 2020 年 11 月，共執行陸域動物調查分析（包含■■■■■■■■■■調查分析）、陸域植物調查分析、水域動物調查分析、紅外線自動相機監測及分析、指標物種族群分佈監測及分析、指標物種生存狀況評估等 6 項調查。調查樣線、樣區與方法皆延續前期施工生態監測進行，陸域包含沿線調查、鼠籠誘捕法、紅外線相機監測法、蝙蝠超音波偵測器錄音法、回播法、鳴叫等級計數法、導板集井式陷阱、網捕法、吊網陷阱、移植喬木及新植苗木生長狀況量測與物候調查，水域包含蝦籠誘捕法、手拋網、電魚法、蘇柏氏網法與手抄網等。

營運中第 8 季之動物調查結果，陸域有鳥類 29 科 54 種、哺乳類 12 科 18 種、兩棲類 5 科 9 種、爬蟲類 6 科 11 種、蝶類 5 科 67 種、蜻蛉類成蟲 8 科 28 種、螢火蟲 1 科 1 種；水域有魚類 5 科 12 種、兩棲類（含卵與幼體）2 科 2 種、蝦蟹類 3 科 6 種、螺貝類 5 科 8 種、水棲昆蟲（含蜻蛉類水蜚）11 科 19 種、環節動物 2 科 4 種、浮游動物 7 科 11 種。本季調查到之保育類物種有 15 種，包括 1 種一級瀕臨絕種保育類動物（■■■■■■■■■■），10 種二級珍貴稀有保育類動物（藍腹鷗、東方蜂鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黑鷲、黃嘴角鴉、領角鴉、■■■■■■■■■■、麝香貓、無霸勾蜓），與 4 種三級其他應予保育類動物（台灣山鷓鴣、紅尾伯勞、台灣藍鵲與食蟹獴）。

指標物種部分，領角鴉在經過兩季回播調查無回應後，本季有 2 隻次回應，密度 1.3 隻次/100 公頃；大赤鼯鼠密度指標為 0.65 隻次/km；白鼻心在固有 12 台相機之平均 OI 值為 7.29，出現樣點比例為 83 %；■■■■■■■■■■在固有 12 台相機之平均 OI 值為 0.12，出現樣點比例為 17%。其中白鼻心與■■■■■■■■■■自營運期以來族群似有成長的趨勢；本季兩者的 OI 值皆較前季為低，是否營運以來的恢復趨勢能夠持續值得關注。

蝶類部分，尖翅翠蛺蝶為近年新出現於台灣的外來種，2019 年 10 月首次在基隆被記錄到，2020 年 5 月曾於園區被生態委員目擊，本季則在園區吊網陷阱中捕獲雌蝶，須持續監測並留意。

水域部分，滯洪池本季調查的狀況仍舊不佳，高體鰮鰻數量低迷，浮游動物與水棲昆蟲的數量也偏低，推測與前季進行棲地管理、水位下降有關，須密切監測其復原情況。

陸域植物方面，本季紫花藿香薊、大花咸豐草持續開花生長；山芙蓉、暎穗蓼、江某、野薑花、小梗木薑子及山刈葉進入花期；水同木、稜果榕、菲律賓榕、水冬瓜、錫蘭饅頭果為花果並存期；鐵冬青、九節木、白匏子、瑪瑙珠、九芎、臭娘子、穗花棋盤腳進入果期，樹杞則有殘果；其餘樹種多數處於生長期。

整體而言，本季各類群或物種的數量與歷年相比雖有所變動，不過多在固有的起伏之內。需持續改善鳥擊問題、監測流浪犬貓與移除水域外來種，以維護園區生態品質。

目錄

摘要.....	I
目錄.....	II
圖目錄.....	IV
表目錄.....	VII
一、計畫緣起及基地概述.....	1
1.1 計畫緣起.....	1
1.2 國家生技研究園區環境概述.....	3
1.3 計畫目標.....	5
二、工作項目及實施方法.....	6
2.1 營運中生態監測調查工作項目及實施方法.....	6
2.2 陸域動物調查分析方法.....	10
2.2.1 陸域動物調查方法.....	10
2.2.2 鳥類調查方法.....	12
2.2.3 哺乳類調查方法.....	13
2.2.4 兩棲類調查方法.....	13
2.2.5 爬蟲類調查方法.....	15
2.2.6 	16
2.2.7 蝶類調查方法.....	17
2.2.8 蜻蛉類調查方法.....	18
2.2.9 螢火蟲調查方法.....	19
2.3 陸域植物調查分析方法.....	20
2.3.1 原生雜木林復育區（低海拔原生林復育區）物候調查方法.....	20
2.4 水域調查分析方法.....	22
2.4.1 水域動物調查方法.....	22
2.4.2 魚類調查方法.....	24
2.4.3 兩棲類（含卵與幼體）調查方法.....	24
2.4.4 底棲動物—水棲昆蟲（含蜻蛉類水蠅）、蝦蟹螺貝及環節動物調查方法.....	24
2.4.5 浮游動物調查方法.....	25
2.4.6 水域植物（含浮游植物及附生藻類）調查方法.....	26
2.5 紅外線自動相機監測及分析方法.....	28
2.6 指標物種族群分佈監測及分析方法.....	30
2.7 樣區、樣站及動物分布位置之 GIS 分析.....	31
2.8 生態環境、動、植物相演替變化分析.....	32
2.9 辦理營運中與生態保育相關之工作.....	32
三、預期成果.....	33
3.1 預期成果概述.....	33
四、調查結果與初步分析.....	34

4.1	陸域動物調查分析.....	34
4.1.1	鳥類.....	34
4.1.2	哺乳類.....	52
4.1.3	兩棲類.....	60
4.1.4	爬蟲類.....	67
4.1.5	 錯誤! 尚未定義書籤。	
4.1.6	蝶類.....	77
4.1.7	蜻蛉類.....	83
4.1.8	螢火蟲.....	88
4.2	水域動植物調查分析.....	91
4.2.1	魚類.....	91
4.2.2	兩棲類 (含卵、幼體).....	96
4.2.3	底棲動物 (蝦蟹螺貝類).....	101
4.2.4	底棲動物 (水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅) 與環節動物).....	108
4.2.5	浮游動物.....	111
4.3	陸域植物.....	115
4.3.1	移植後樹木.....	115
4.3.2	原生雜木林復育區 (低海拔原生林復育區).....	121
4.4	紅外線自動相機監測及分析.....	127
4.4.1	本季調查成果分析.....	127
4.4.2	歷年比較分析.....	128
4.4.3	結論建議事項.....	129
4.5	指標物種族群分佈監測及分析.....	138
4.5.1	領角鴉.....	138
4.5.2	大赤鼯鼠.....	143
4.5.3	白鼻心.....	147
4.5.4	 錯誤! 尚未定義書籤。	
五、	本季調查結果討論與綜合分析.....	157
5.1	陸域生態.....	157
5.2	水域生態.....	158
5.3	建議事項.....	158
六、	參考文獻.....	160

圖目錄

圖 1.1-1	國家生技研究園區地理位置圖.....	2
圖 1.1-2	調查範圍圖.....	2
圖 1.2-1	國家生技研究園區鄰近郊山分布示意.....	3
圖 1.2-2	國家生技研究園區配置規劃圖.....	4
圖 2.1-1	前期調查計畫樣點樣線位置圖.....	8
圖 2.1-2	本計畫調查樣線編號圖.....	8
圖 2.1-3	工作流程圖.....	9
圖 2.2-1	集井導板式陷阱架設位置圖.....	16
圖 2.2-2		16
圖 2.2-3		16
圖 2.2-4	吊網陷阱位置圖.....	18
圖 2.3-1	新植樹苗調查位置圖.....	20
圖 2.4-1	水域生態調查樣站位置圖.....	22
圖 2.4-2	水域生態調查執行點位.....	22
圖 2.5-1	自動相機位置圖.....	29
圖 4.1-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-大冠鷲分布圖	37
圖 4.1-2	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-鳳頭蒼鷹分布圖	38
圖 4.1-3	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-東方蜂鷹分布圖	38
圖 4.1-4	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-黑鳶分布圖	39
圖 4.1-5	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-黃嘴角鴉分布圖	39
圖 4.1-6	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-領角鴉分布圖	40
圖 4.1-7	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-藍腹鵲分布圖	40
圖 4.1-8	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-台灣山鵲分布圖	41
圖 4.1-9	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-紅尾伯勞分布圖	41
圖 4.1-10	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-台灣藍鵲分布圖	42
圖 4.1-11	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種鳥類分布圖	42
圖 4.1-12	2008-2020 年各季鳥類累計物種數	43
圖 4.1-13	2008-2020 年各季鳥類記錄物種數	43
圖 4.1-14	2012-2020 年鳥類秋季族群指標變化	44
圖 4.1-15	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 小獸類鼠籠捕捉陷阱籠位圖	54
圖 4.1-16	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育哺乳類-.....分布圖	55
圖 4.1-17	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育哺乳類-麝香貓分布圖	55
圖 4.1-18	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育哺乳類-食蟹獾分布圖	56
圖 4.1-19	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種哺乳類-家犬分布圖	56
圖 4.1-20	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種哺乳類-家貓分布圖	57
圖 4.1-21	2008-2020 年各季哺乳類累計物種數	57
圖 4.1-22	2008-2020 年各季哺乳類記錄物種數	58
圖 4.1-23	2012-2020 年哺乳類秋季族群指標變化	58
圖 4.1-24	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種兩棲類-斑腿樹蛙分布圖	62

圖 4.1-25	2008-2020 年各季兩棲類累計物種數	63
圖 4.1-26	2008-2020 年各季兩棲類記錄物種數	63
圖 4.1-27	2012-2020 年兩棲類秋季族群指標變化	64
圖 4.1-28	2008-2020 年各季爬蟲類累計物種數	69
圖 4.1-29	2008-2020 年各季爬蟲類記錄物種數	69
圖 4.1-30	2012-2020 年爬蟲類秋季族群指標變化	70
圖 4.1-31	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 I 級保育龜類-  發現位置圖	74
圖 4.1-32	2008-2020 年各季蝶類累計物種數	79
圖 4.1-33	2008-2020 年各季蝶類記錄物種數	79
圖 4.1-34	2012-2020 年蝶類秋季族群指標變化	80
圖 4.1-35	2008-2020 年各季蜻蛉類累計物種數	85
圖 4.1-36	2008-2020 年各季蜻蛉類記錄物種數	85
圖 4.1-37	2012-2020 年蜻蛉類秋季族群指標變化	86
圖 4.1-38	2008-2020 年各季螢火蟲類累計物種數	89
圖 4.1-39	2008-2020 年各季螢火蟲類記錄物種數	89
圖 4.2-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種魚類分布圖	93
圖 4.2-2	2008-2020 年各季魚類累計物種數	93
圖 4.2-3	2008-2020 年各季魚類記錄物種數	94
圖 4.2-4	2012-2020 年魚類秋季族群指標變化	94
圖 4.2-5	營運中第 8 季外來種水域兩棲類分布圖。	98
圖 4.2-6	2008-2020 年各季水域兩棲類 (含幼體與卵) 累計物種數	98
圖 4.2-7	2008-2020 年各季水域兩棲類 (含幼體與卵) 記錄物種數	99
圖 4.2-8	2014-2020 年水域兩棲類 (含幼體與卵) 秋季族群指標變化	99
圖 4.2-9	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種螺貝類-福壽螺分布圖	103
圖 4.2-10	2008-2020 年各季蝦蟹類累計物種數	103
圖 4.2-11	2008-2020 年各季螺貝類累計物種數	104
圖 4.2-12	2008-2020 年各季蝦蟹類記錄物種數	104
圖 4.2-13	2008-2020 年各季螺貝類記錄物種數	105
圖 4.2-14	2012-2020 年蝦蟹類秋季族群指標變化	105
圖 4.2-15	2012-2020 年螺貝類秋季族群指標變化	106
圖 4.2-16	2008-2020 年各季水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅) 與環節動物記錄物種數	109
圖 4.2-17	2008-2020 年各季浮游動物累計物種數	113
圖 4.2-18	2008-2020 年各季浮游動物記錄物種數	113
圖 4.3-1	2020 年 9-11 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片	117
圖 4.3-2	2020 年 12 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片	118
圖 4.3-3	2020 年 9-11 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片	123
圖 4.3-4	2020 年 12 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片	124
圖 4.5-1	歷年夜間回播調查領角鴉密度變化圖	140
圖 4.5-2	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種大赤鼯鼠記錄點位分布圖	144
圖 4.5-3	歷年夜間沿線調查大赤鼯鼠密度指標變化圖	144
圖 4.5-4	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種白鼻心記錄點位分布圖	149
圖 4.5-5	歷年指標物種白鼻心出現指數 (OI 值) 變化圖	149

圖 4.5-6	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種■■■■記錄點位分布圖	154
圖 4.5-7	歷年指標物種■■■■出現指數 (OI 值) 變化圖	154

表目錄

表 2.1-1	工作事項表及執行進度.....	7
表 2.2-1	陸域生態調查方法彙整表.....	10
表 2.2-2	鳥類調查方法與執行方式.....	12
表 2.2-3	哺乳類調查方法與執行方式.....	13
表 2.2-4	兩棲類調查方法與執行方式.....	14
表 2.2-5	兩棲類鳴叫等級.....	14
表 2.2-6	爬蟲類調查方法與執行方式.....	15
表 2.2-7	■■■■■調查方法與執行方式.....	16
表 2.2-8	蝶類調查方法與執行方式.....	18
表 2.2-9	蜻蛉類調查方法與執行方式.....	19
表 2.2-10	螢火蟲調查方法與執行方式.....	19
表 2.3-1	新植樹苗調查方法與執行方式.....	20
表 2.3-2	新植樹苗及移植喬木生長狀況評估表.....	21
表 2.4-1	水域生態調查方法彙整表.....	23
表 2.4-2	魚類調查方法與執行方式.....	24
表 2.4-3	兩棲類 (含卵與幼體) 調查方法與執行方式.....	24
表 2.4-4	底棲動物—水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅)、蝦蟹螺貝及環節動物調查方法與執行方式.....	25
表 2.4-5	浮游動物調查方法與執行方式.....	25
表 2.4-6	水域植物 (含浮游植物及附生藻類) 調查方法與執行方式.....	26
表 2.6-1	指標物種棲地需求特徵.....	30
表 2.6-2	指標生物調查規劃.....	31
表 2.6-3	指標生物族群量特性.....	31
表 2.9-1	營運中可能面臨之生態事項及建議處理措施.....	32
表 3.1-1	預期成果表.....	33
表 4.1-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 鳥類調查工作時間表.....	34
表 4.1-2	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區鳥類物種與數量.....	45
表 4.1-3	2008-2020 年各區各季鳥類多樣性指數及均勻度指數.....	49
表 4.1-4	施工中第 18 季至今 (2018/5/13-2020/11) 鳥擊事件.....	50
表 4.1-5	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 哺乳類調查工作時間表.....	52
表 4.1-6	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區哺乳類物種與數量.....	59
表 4.1-7	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 兩棲類調查工作時間表.....	60
表 4.1-8	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區兩棲類物種與數量.....	65
表 4.1-9	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各區兩棲鳴叫計數法記錄物種與相對豐富度.....	66
表 4.1-10	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 爬蟲類調查工作時間表.....	67
表 4.1-11	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區爬蟲類物種與數量.....	71
表 4.1-12	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) ■■■■■調查工作時間表.....	73
表 4.1-13	施工中第 13-18、營運中第 1-8 季■■■■■■■■■■.....	75
表 4.1-14	施工中第 14-20、營運中第 1-8 季■■■■■■■■■■.....	76
表 4.1-15	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 蝶類調查工作時間表.....	77

表 4.1-16	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蝶類物種與數量.....	81
表 4.1-17	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 蜻蛉類調查工作時間表.....	83
表 4.1-18	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蜻蛉類物種與數量.....	87
表 4.1-19	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 螢火蟲調查工作時間表.....	88
表 4.1-20	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區螢火蟲物種與數量.....	90
表 4.2-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 魚類調查工作時間表.....	91
表 4.2-2	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區魚類物種與數量.....	95
表 4.2-3	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 兩棲類 (含卵、幼體) 調查工作時間表.....	96
表 4.2-4	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區水域兩棲類 (含幼體與卵) 物種與數量.....	100
表 4.2-5	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 底棲動物-蝦蟹螺貝類調查工作時間表.....	101
表 4.2-6	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蝦蟹類物種與數量.....	107
表 4.2-7	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區螺貝類物種與數量.....	107
表 4.2-8	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 底棲動物-水棲昆蟲與環節動物調查工作時間表.....	108
表 4.2-9	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅) 與環節動物物種與數量.....	110
表 4.2-10	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 浮游動物調查工作時間表.....	111
表 4.2-11	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區浮游動物物種與數量.....	114
表 4.3-1	營運中第 8 季移植後樹木調查工作時間表.....	115
表 4.3-2	移植樹木物候調查結果.....	119
表 4.3-3	營運中第 8 季原生雜木林復育區調查工作時間表.....	121
表 4.3-4	原生雜木林復育區新植樹苗物候調查結果.....	125
表 4.4-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 紅外線自動相機調查工作時間表.....	127
表 4.4-2	本計畫及歷年監測案紅外線自動相機位置表.....	130
表 4.4-3	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱調查哺乳類各樣點出現指標.....	131
表 4.4-4	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱調查鳥類各樣點出現指標.....	133
表 4.4-5	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱昆蟲各樣點出現指標.....	137
表 4.5-1	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種領角鴉調查工作時間表.....	138
表 4.5-2	歷年指標物種領角鴉回播記錄隻次及密度指標.....	141
表 4.5-3	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種大赤鼯鼠調查工作時間表.....	143
表 4.5-4	歷年指標物種大赤鼯鼠記錄隻次及密度指標.....	145
表 4.5-5	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種白鼻心調查工作時間表.....	147
表 4.5-6	歷年指標物種白鼻心各相機陷阱出現指數.....	150
表 4.5-7	營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種■■■■調查工作時間表.....	154
表 4.5-8	歷年指標物種■■■■各相機陷阱出現指數.....	155

一、計畫緣起及基地概述

1.1 計畫緣起

「國家生技研究園區開發計畫」位於臺北盆地東緣，南港山系北側、基隆河南岸，內容分為「國家生技研究園區」(以下簡稱園區或 A 區)及「生態研究區(緩衝區)」(以下簡稱 B 區)兩大區塊(圖 1.1-1)，相對於周邊的都會建成區，保有較完整的次生林相及郊山生態環境。本開發計畫以永續發展為目標，從基地規劃、施工到營運管理都以區域生態為考量，兼顧環境保育與區域發展，為國內具指標性之區域開發計畫。

依據國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書審查決議(行政院環境保護署環境影響評估審查委員會第 206 次會議)及環境影響說明書定稿本(中央研究院 2012)，園區應依據所提之生態保育及復育計畫，持續維護生態環境品質，於施工前、中、後及營運管理階段需對園區及周邊環境進行長期監測(全區營運後之環境監測應執行 6 年以上)，建立長期生態觀察資料。先期「環境影響說明書」、「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」、「國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務計畫」及「國家生技研究園區施工中生態監測補充調查委託專業服務案」等 4 階段，已針對國家生技研究園區開發計畫範圍(A 區及 B 區)與鄰近區域內(202 兵工廠區，以下簡稱 C 區)之陸域維管束植物、陸域動物(鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類、蝶類)、水域生物(魚類、蝦蟹螺貝類、水生昆蟲及浮游生物)及指標物種(大赤鼯鼠、白鼻心、、領角鴉)實施生態調查與監測。其中環說書階段累積有 2008 年 12 月(冬季)、2009 年 3 月(春季)與 2010 年 8 月(秋季)共 3 季的調查資料與報告；施工前生態調查階段累積有 2012 年 11 月(秋季)至 2013 年 11 月(秋季)共 5 季的調查資料與報告；施工中生態監測階段則自 2014 年 2 月(冬季)至 2018 年 11 月(秋季)止，業累積 20 季的調查資料與報告。

本次「國家生技研究園區營運中生態監測調查計畫」(以下簡稱本計畫)將以前期之「環境影響說明書」、「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」與「國家生技研究園區施工中生態監測計畫」為基礎，持續進行施工後之生態調查與監測，評估園區內動植物的生態變化，以瞭解施工之影響，作為復育與保育規劃的依據，並提供後續管理人員有效之監測方法，以達到環境開發與生態保育的均衡。調查範圍涵蓋國家生技研究園區 25.31 公頃(A 區)、生態研究區 11.94 公頃(B 區)及周邊國防部第 202 廠火工區(C 區)，共約 150 公頃(圖 1.1-1、圖 1.1-2)，工作內容含括水、陸域生態環境監測。



圖 1.1-1 國家生技研究園區地理位置圖
(摘自需求說明書)




圖 1.1-2 調查範圍圖

(摘自國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務第九季報告書)

1.2 國家生技研究園區環境概述

國家生技研究園區北側與忠孝東路僅一山之隔，東側鄰近中央研究院，西側緊臨「國防部軍備局生產製造中心第 202 廠」。園區基地位於臺北市南港區，北側為中南山，南接南港山系，園區內地形主要為低海拔山脈指狀末端鑲嵌小塊平緩地形與低窪濕地，殘存有古三重埔埤遺跡，包括園區內約 0.8 公頃之滯洪池與鄰近 202 兵工廠內的三重埔埤，為北部淺山地區重要的濕地生態系（圖 1.2-1）。由於園區原為「國防部軍備局生產製造中心第 202 廠」之土地利用特性，過去園區基地僅平地部分開發成兵工廠，其餘則保有較完整的闊葉次生林相，為北臺灣重要的淺山生態系。目前之開發內容包含「國家生技研究園區」及「生態研究區（緩衝區）」兩部分，土地使用均為機關用地；國家生技研究園區之配置規劃有生態保留區、生態滯洪池、低海拔原生林帶復育區、樹木銀行、臺北樹蛙棲境復育區、東北角臨時性積水溼地復育區以及研究專區（建築物 A 棟至 G 棟），如圖 1.2-2。

根據環境影響評估階段 3 季、施工前 5 季及施工中 20 季生態監測的調查結果顯示，園區內具有豐富的生物多樣性，為野生動物重要的棲息地。計畫區域內水域動物調查紀錄包含了高體鰮鰻、羅漢魚、極樂吻鰕虎、合蒲絨螯蟹、日本沼蝦、瘤蟯、臺灣蜆、石蚌、圓蚌等物種，陸域動物調查紀錄有███、麝香貓、食蟹獾等 3 種保育類哺乳動物，臺北樹蛙、環紋赤蛇、███、███等 5 種保育類兩棲爬蟲類，遊隼、林鵰、魚鷹、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹、松雀鷹、蒼鷹、黃嘴角鴉、領角鴉、褐鷹鴉、鴛鴦、水雉、彩鶇、八色鳥、野鴉、藍腹鵲、臺灣山鵲、紅尾伯勞、臺灣藍鵲、白尾鵲、白耳畫眉、冠羽畫眉等 25 種保育鳥類及無霸勾蜓等 1 種保育蜻蛉類，極具生態價值。



圖 1.2-1 國家生技研究園區鄰近郊山分布示意
(摘自國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書)



圖 1.2-2 國家生技研究園區配置規劃圖

(摘自國家生技研究園區施工生態監測委託調查分析專業服務第九季報告書)

1.3 計畫目標

本計畫將以淺山地區生態保育為目標，以前期之「環境影響說明書」、「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」及「國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務計畫」為基礎，進行營運期間之生態調查與監測，並比對園區先期階段的生態狀況，據以監測施工影響程度、持續維護生態環境品質，並檢討園區復育及保育成效。詳細之工作項目，除持續利用文字和影像資料記錄監測工作、機動支援保育相關事宜、配合出席相關會議以及提供資料等例行性工作之外，尚包括以下工作項目：

1. 國家生技研究園區施工中陸域及水域生態監測。
2. 生態研究區及周邊原生種龜類調查。
3. 彙整生態監測調查資料並分析動植物變化。
4. 擬定反映生態環境品質變化之監測指標。
5. 辦理施工中與生態保育相關之工作。
6. 運用 GIS 製作生態調查分析成果圖及建置原始調查資料庫。

表 2.1-1 工作事項表及執行進度

項次	項目	單位	數量	前季累計執行數量	本季執行數量	備註
一	營運中生態調查、監測及分析					
1.1	陸域動物調查分析	鳥類	次	4	1	依環說書及需求書內容，每季1次三重複變更為每月1次，累計一季三重複調查
		其他類群	次	4	1	(1) 其他陸域動物包含哺乳類、兩棲爬蟲類、蜻蛉類、蝶類、螢火蟲 (2) 依環說書及需求書內容，每季1次 (3) 蝶類變更為每月1次調查，累計一季三重複調查
		■■■■	次	4	1	(1) ■■■■ (2) ■■■■
1.2	陸域植物調查分析	原生雜木林復育區(低海拔原生林帶復育區)	次	2	0	(1) 依環說書及需求書內容，監測原生雜木林復育區(低海拔原生林帶復育區)與園區補充苗每株新植樹苗之存活率及生長狀況(含物候) (2) 取樣測量新植樹苗之胸高圍、胸高直徑、樹高、樹冠寬幅 (3) 每半年1次
		其他樣區	次	1	0	(1) 依環說書調查內容，監測生態研究區1處森林永久樣區 (2) 每年1次
1.3	水域動物調查分析		次	5	1	(1) 依環說書內容，包含魚類、兩棲類(含卵、幼體)、底棲動物(水棲昆蟲、蝦蟹螺貝類及環節動物)、浮游動物、蜻蛉類水蠅等 (2) 每季1次；於颱風季做較密集之觀測，擇一路徑經過北部區域之颱風過後進行調查分析
1.4	水域動物外來種志工教育訓練		次	4	0	(1) 依園區現況帶領園區志工辦理吳郭魚、螯蝦、福壽螺及斑腿樹蛙等外來種清除，並辦理清除成效調查分析；指導志工操作紅外線自動相機監測
1.5	水域植物調查分析		次	1	0	(1) 依環說書及需求書內容，包含浮游植物及附生藻類等 (2) 每年1次
1.6	紅外線自動相機監測及分析		季	4	1	(1) 以紅外線自動相機監測，至少設置13部 (2) 延續前期施工中調查相機樣點，國家生技研究園區設置至少5處監測區，生態研究區至少設置2處，202兵工廠範圍6處，共24部
1.7	指標物種族群分佈監測及分析		次	4	1	(1) 於計畫區內針對指標物種大赤鼯鼠、領角鴉、■■■■及白鼻心應分別設計沿線調查和相機陷阱調查法進行監測 (2) 延續前期施工中調查樣線、回播樣點及相機樣點位置 (3) 每季1次




圖 2.1-1 前期調查計畫樣點樣線位置圖
(摘自需求說明書)



圖 2.1-2 本計畫調查樣線編號圖




圖 2.1-3 工作流程圖

2.2 陸域動物調查分析方法

2.2.1 陸域動物調查方法

本計畫陸域動物各物種類群依計畫目標與類群特性，延續「國家生技研究園區施工中生態監測調查計畫」之調查方法與記錄方式。目標類群包括鳥類、哺乳類、兩棲類、爬蟲類、蝶類、蜻蛉類與螢火蟲等，分別使用沿線調查、相機陷阱、陷阱捕捉調查法與網捕調查法等，調查項目依據環評說明書、最新版動物生態評估技術規範與植物生態評估技術規範所列之調查項目為基礎，並依現場環境檢討調整。調查過程同時利用數位相機記錄影像資料，調查時間、方法與頻率如表 2.2-1 所示。

表 2.2-1 陸域生態調查方法彙整表

類群	調查方法	調查方法說明	調查時間	鑑定參考資料
鳥類	沿線調查法	利用 8-10 倍之雙筒望遠鏡觀察沿線鳥類，輔以鳴叫聲音辨別，記錄沿樣線左右兩側看到和聽到的鳥類種類、數量及座標；鳥類出現位置座標以手持式 GPS 定位調查者座標，再輔以指北針定出鳥類位置方位角及估算與調查者距離來計算	日出至日出後 5 小時； 日落前 3 小時至日落； 入夜後 5 小時內	(1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (2) 中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之最新版臺灣鳥類名錄 (3) 保育類野生動物名錄 (行政院農業委員會 2019 年 1 月 9 日公告，農林務字第 1071702243A 號)
哺乳類	沿線調查法	沿樣線記錄看到與聽到的哺乳類種類、數量以及其足印、食痕、排遺、窩穴等痕跡或道路上遭車撞輾斃的屍體，並針對蝙蝠棲所進行調查	上午 8-12 時； 夜間 19-23 時	(1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (2) 臺灣哺乳動物 (祁偉廉, 2008) (3) 臺灣蝙蝠圖鑑 (鄭錫奇等, 2010) (4) 保育類野生動物名錄 (行政院農業委員會 2019 年 1 月 9 日公告，農林務字第 1071702243A 號)
	陷阱捕捉調查法 (誘捕法)	於園區選定 3 處樣線，每樣線設置薛爾曼式活捕捉器 (Sherman live trap) 與臺製雙門總抓鼠籠，以地瓜沾花生醬為誘餌進行捕捉。於天黑前佈設完畢，隔日進行檢查，捕獲的動物經鑑定種類後原地釋放	放置 4 天 3 夜，每日巡視檢查	
	相機陷阱調查法	設置至少 13 台紅外線自動相機裝置，定期下載資料後辨識中大型地棲哺乳動物物種，並計算相對密度指數	自放置起至器材回收	
	音頻調查	利用蝙蝠發出超音波回聲定位的特性進行調查，於傍晚至夜間以蝙蝠偵測器於計畫區內收集蝙蝠之超音波	18-21 時 (日落後開始)	
兩棲類	沿線調查法	利用目視遇測法 (visual encounter survey) 於園區內進行調查。沿樣線記錄看到與聽到的兩棲類種類和數量。道路上的兩棲類路死 (road-killed) 個體亦為調查記錄重點。沿線附近之樹林底層、埤塘、溝渠、溪流、水窪及積水容器等微棲地環境，均會進行定點停留調查	日間 8-14 時； 夜間 19-23 時 (日落後半小時開始)	(1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (2) 臺灣兩棲爬行類圖鑑 (向高世, 2009) (3) 保育類野生動物名錄 (行政院農業委員會 2019 年 1 月 9 日公告，農林務字第 1071702243A 號)
	導板集井式陷阱	架設導板集井式陷阱 (drift-fence funnel trap)，利用 3 公尺長、30 公分高的矮圍籬 (導板)，配合改裝過的蝦籠所組成，作為調查林下兩棲爬蟲及無脊椎動物之調查工具	放置 4 天 3 夜，每日巡視檢查	
爬蟲類	沿線調查法	利用目視遇測法 (visual encounter survey) 於園區內進行調查。日間主要調查蜥蜴和龜鱉類動物，夜間則針對壁虎科及蛇類進行調查。調查沿線進行，輔以徒手或用棍棒翻動地表和落葉，另外針對樹林底層、草叢、水田、	日間 8-14 時； 夜間 18-23 時 (日落後半小時開始)	

類群	調查方法	調查方法說明	調查時間	鑑定參考資料
		埤塘、溝渠、溪澗和溪流等微棲地環境進行定點調查。道路上的爬蟲類路死 (road-killed) 個體亦為調查記錄重點		
	導板集井式陷阱	架設導板集井式陷阱 (drift-fence funnel trap)，利用 3 公尺長、30 公分高的矮圍籬 (導板)，配合改裝過的蝦籠所組成，作為調查林下兩棲爬蟲及無脊椎動物之調查工具	放置 4 天 3 夜，每日巡視檢查	
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
	■	■ ■ ■	■ ■ ■	
蝶類	沿線調查法	沿樣線以目視輔以 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察，記錄沿線兩側各 5 公尺範圍內發現的蝶種、數量，無法辨識的種類以攝影器材輔助記錄，並視情況許可以昆蟲網進行捕捉，鑑定種類後即釋放。偏好黃昏出沒的蝶種亦會在傍晚進行補充調查。在積水與蜜源植物豐富等蝶類較易聚集的微棲地時則進行定點調查	上午 8-11 時; 下午 15-18 時	(1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (2) 臺灣蝶圖鑑第一卷、第二卷、第三卷 (徐堉峰 2000、2002、2006) (3) 臺灣蝶類生態大圖鑑 (濱野榮次，1987) (4) 保育類野生動物名錄 (行政院農業委員會 2019 年 1 月 9 日公告，農 林 務 字 第 1071702243A 號)
	網捕法	於植群上掃網，鑑定及計算蝶類種類與數量	上午 8-11 時; 下午 15-18 時	
	吊網陷阱	有些蝶類生性隱密，沿線調查不易察覺；故以腐果氣味誘蝶，記錄種類與數量，以彌補沿線調查法的不足	上午 8-11 時; 下午 15-18 時	
蜻蛉類	沿線調查法	沿樣線以目視輔以 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察，記錄沿線兩側各 5 公尺範圍內發現的蜻蛉類種類、數量，無法辨識的種類以攝影器材輔助記錄，並視情況許可以昆蟲網進行捕捉，鑑定種類後即釋放。於蜻蛉目昆蟲常出現的埤塘、草澤、溪流和溝渠等水域環境會進行定點調查。另外針對有特殊棲地需求或晨昏活動等特殊習性的蜻蛉種類，會於潛在棲地環境或適宜的時間進行搜尋	上午 8-11 時; 下午 15-18 時	
	網捕法	於各水域環境、砌石縫、植群上掃網，鑑定及計算蜻蛉種類與數量	上午 8-11 時; 下午 15-18 時	
螢火蟲	沿線調查法	夜間調查時沿線以昆蟲網進行捕捉，鑑定種類後立即釋放。螢火蟲容易出現在溪邊、草溝、潮濕的林緣等環境，故除沿線外，亦於鄰近潮濕環境區域進行搜尋	18-21 時 (日落後開始)	
	網捕法	於植群上掃網，鑑定及計算螢火蟲種類與數量	18-21 時 (日落後開始)	
本表修改自「國家生技研究園區施工中生態監測補充調查計畫」				

2.2.2 鳥類調查方法

鳥類調查以沿線調查法為主、並輔以自動相機陷阱法完善園區內鳥類的名錄。兩種方法中僅沿線調查所得之鳥類物種、數量與分布納入後續比較分析，自動相機（方法及分析方式詳見 2.5 節）所記錄之鳥種僅用於補充物種名錄，不納入數量分析。

沿線調查法延續「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」及「國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務計畫」之方法及樣線（圖 2.1-1），調查頻率為每月 1 次。鳥類調查方法與執行方式詳表 2.2-2。

分析時，以各樣區各樣線各次調查所記錄之該物種數量（隻次）最大值的總和，求得每季沿線調查各物種在 3 個樣區的出現隻次，代表當季該物種在 3 樣區內的最大可能分布數量，並依此計算 3 個樣區的鳥類物種多樣性及均勻度指數。每季全區各鳥種的數量則為各月該物種全區數量總和之最大值。

鳥類物種多樣性指數採用 Shannon-Wiener 多樣性指數 (Shannon-Wiener's diversity index, H')：

$$H' = -\sum_{i=1}^S P_i \log_{10} P_i$$

S：各群聚中所記錄到之物種數

P_i ：各群聚中第 i 種物種所占的數量百分比

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之種豐度 (species richness) 及個體數在種間分配是否均勻。若 H' 值愈大，則表示群聚中種數愈多或種間分配較均勻。

均勻度指數採 Pielou 均勻度指數 (Pielou's evenness index, J')：

$$J' = H' / H'_{max} = H' / \log_{10} S$$

S：所出現的物種數

J' 值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。

鳥類調查方法與分析均符合行政院環境保護署公告之動物生態評估技術規範。所記錄之鳥類依據 (1) 中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之最新版臺灣鳥類名錄、(2) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 與 (3) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別稀有度、遷移屬性、特有種及保育等級等。所得資料將與施工前與施工中相同季節或月份之資料進行比較，並在有所差異時提供建議。

表 2.2-2 鳥類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	以每小時 1.5 公里的速度沿穿越線進行，利用 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察沿線鳥類，輔以鳴叫聲音辨別，記錄沿線左右兩側看到和聽到的鳥類種類、數量及座標；鳥類出現位置座標以手持式 GPS 定位調查者座標，再輔以指北針定出鳥類位置方位角及估算與調查者距離來計算；並觀察鳥類活動方向，避免重複計數
相機陷阱	利用紅外線自動相機陷阱補充地面活動鳥類的資料，將設置自動攝影機器於基地內 24 處樣點，選擇獸徑交會點進行架設，架設時適度清理拍攝範圍的地被植物，並調整拍攝角度以利成果清晰完整。各相機陷阱於電池耗盡前進行更換回收，回收之調查資料由具鳥類辨識專業者進行判別與彙整。詳細之相機陷阱調查法規劃與流程請參考 2.5 節

2.2.3 哺乳類調查方法

哺乳類調查以沿線調查法、陷阱捕捉調查法 (誘捕法)、相機陷阱法與音頻調查法等多方面進行，調查頻率為每季 1 次。沿線調查延續「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」及「國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務計畫」之方法及樣線 (圖 2.1-1)，分析時將目擊及聽聞紀錄 (隻次) 及痕跡紀錄 (筆數) 分別統計；陷阱捕捉調查法 (誘捕法) 以小型哺乳動物為目標，於 3 分區各設置 1 條捕捉樣線 (圖 2.1-1)，每條捕捉樣線設置薛爾曼式活捕捉器 (Sherman live trap) 及雙門總抓捕鼠籠，以地瓜沾花生醬為誘餌，每季進行 4 天 3 夜的連續捕捉；相機陷阱法除了延續「國家生技研究園區施工中生態監測調查計畫」的 13 個樣點外，新增設自動相機至 24 台 (詳見 2.5 節)，進行定點長期監測取樣；音頻調查法針對翼手目 (蝙蝠類) 物種，於傍晚至夜間以蝙蝠偵測器 Anabat Walkabout、Anabat Scout 或 Echo Meter Touch 2 PRO 進行蝙蝠超音波錄製與分析，這些蝙蝠偵測器可同時記錄取樣航跡與時間，經由與錄音檔比對，可獲取所錄得物種的座標與出現時間；對於潛在的蝙蝠棲所並額外進行目視調查。哺乳類調查方法與執行方式詳表 2.2-3。

哺乳類調查方法與分析均符合行政院環境保護署公告之動物生態評估技術規範。所記錄之哺乳類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>)、(2) 祁偉廉所著「臺灣哺乳動物」(2008)、(3) 鄭錫奇等編著「臺灣蝙蝠圖鑑」(2010)，以及 (4) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-3 哺乳類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	以每小時 1.5 公里的速度沿穿越線進行，沿線記錄發現的哺乳類種類、數量 (隻次)、出現地點座標、棲地與發現狀況，包括目擊、屍體、叫聲、足跡、食痕 (含掘痕、啃痕、掘食洞穴、食餘等取食痕跡)、排遺、通道、窩穴等痕跡，道路上遭車撞輾斃的屍體亦為記錄重點，並針對蝙蝠棲所進行調查。調查時以手持式 GPS 定位調查者座標，再輔以指北針定出哺乳類位置方位角及估算牠們與調查者距離來計算出目擊或聽聞之動物所在位置座標，並避免重複計數；動物活動痕跡則直接以手持式 GPS 定出痕跡所在座標 沿線調查資料分析時將目擊及聲音紀錄合併成見聞紀錄，記錄種類及估算其數量 (隻次)，其他非見聞紀錄則合併成活動痕跡紀錄，記錄其數量 (筆數)
陷阱捕捉調查法 (誘捕法)	於各分區各選定 1 條樣線，設置鼠籠捕捉小型哺乳動物。樣線設置地點以倒木周圍、樹洞旁等小型齧齒目動物活動環境為主，每條樣線設置薛爾曼式陷阱 (Sherman live trap) 與臺製雙門總抓鼠籠，以地瓜沾花生醬為餌進行捕捉。陷阱將於天黑前佈設完畢，隔日進行檢查，捕獲動物經鑑定種類後原地釋放
相機陷阱	設置紅外線自動相機樣點 24 處，調查地面活動之哺乳類。相機選擇獸徑交會點進行架設，架設時適度清理拍攝範圍地被植物，並調整拍攝角度以利成果清晰完整。於電池耗盡前進行更換回收，回收之資料由具哺乳類動物辨識專業者進行判別與彙整，詳細相機陷阱調查法規劃與流程請參考 2.5 節
音頻調查	利用蝙蝠發出超音波回聲定位的特性，於傍晚至夜間以蝙蝠偵測器 Anabat Walkabout、Anabat Scout 或 Echo Meter Touch 2 PRO 收集區內蝙蝠之超音波。這些蝙蝠偵測器可同時記錄取樣航跡與時間，藉由與錄音檔比對，可以獲得所錄得的物種之座標與出現時間。調查時用緩慢速度步行，以超音波偵測器偵測並錄製穿越線附近活動蝙蝠發出之超音波訊號。錄得之音頻將由臺灣蝙蝠學會具蝙蝠聲紋辨識之專業者進行物種判別

2.2.4 兩棲類調查方法

兩棲類的調查延續「國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務計畫」之方法，參考農委會之臺灣野生動物資源調查—兩棲類動物資源調查手冊 (楊懿如等，2008)，以目視遇測法 (visual encounter survey) 配合鳴叫計數法 (audio strip transects) 進行

沿線調查，並將目擊資料與鳴叫計數資料分別記錄；另搭配導板集井式陷阱調查法 (drift-fence funnel trap)，調查頻率為每季 1 次。兩棲類調查與執行方式詳表 2.2-4。

鳴叫個體數等級常被用來做為兩棲類監測的指標，可顯示進入生殖狀態的雄性蛙類出沒狀態。專業調查人員於夜間沿線調查過程中，分區於兩棲類重要微棲地進行兩棲類鳴叫等級的評估。鳴叫聲分級依 Bishop et al. (1994) 建議的基準，將兩棲類鳴叫狀況區分為 I 至 IV 級 (Lips et al., 2001)，如表 2.2-5。

統計分析時將目擊調查隻次 (目視遇測法與導板陷阱法) 及鳴叫調查隻次結果分別統計。其中目視遇測法之目擊隻次，以各樣區各樣線各次調查所記錄之該物種數量 (隻次) 最大值的總和，求得每季沿線調查各物種在 3 個樣區的出現隻次，代表當季該物種在 3 樣區內的最大可能目擊隻次；導板陷阱調查所得之資料則額外標示與分析。鳴叫調查隻次以鳴叫計數法進行分析，以各物種平均鳴叫指數及鳴叫等級之最大值代表當季該物種在 3 樣區內的最高鳴叫指數及鳴叫等級。

所記錄之兩棲類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>)、(2) 向高世等所著「臺灣兩棲爬行類圖鑑」(2009)，以及 (3) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-4 兩棲類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	記錄沿線看到與聽到的兩棲類物種和數量，輔以徒手或用棍棒翻動地表和落葉，特別注意可能有兩棲類出沒的地點，包括樹林底層、草叢、水田、埤塘、溝渠、溪澗和溪流等微棲地，經過重要微棲地時進行定點調查。調查結束後沿相同路線返回時，為避免重複計數，只記錄先前未發現的物種，道路上的兩棲類路死動物個體 (road-killed) 亦為調查記錄的重點
鳴叫計數法	鳴叫個體數量等級常做為兩棲類監測之指標，尤其是進入生殖狀態的雄性蛙類之出沒狀態。於夜間沿線調查時，分區於重要微棲地進行兩棲類鳴叫程度記錄並估算各蛙種的鳴叫等級
導板集井式陷阱	以 3 公尺長、30 公分高的矮圍籬 (導板) 配合改裝過的蝦籠組成陷阱，為調查林下兩棲爬蟲及無脊椎動物之工具，可偵測目視遇測法難以記錄到的種類 (毛俊傑，2011)

表 2.2-5 兩棲類鳴叫等級

等級	鳴叫狀況
I	單一雄性鳴叫
II	2-5 隻雄性聚集鳴叫
III	6-10 隻雄性聚集鳴叫
IV	超過 10 隻雄性聚集鳴叫

2.2.5 爬蟲類調查方法

爬蟲類主要以目視遇測法 (visual encounter survey) 進行包括日、夜間的沿線調查；日間主要針對蜥蜴、日行性蛇類及龜鱉類動物，時間約為上午 8 至 14 時，夜間則針對壁虎科及夜行性蛇類進行調查，於入夜後約 18 至 23 時進行；各樣線每季各進行 1 次日、夜間取樣調查。此外並使用導板集井式陷阱調查法 (drift-fence funnel trap) 偵測目視遇測法難以記錄到的種類，以完善區內的爬蟲類物種名錄。爬蟲類調查方法與執行方式詳表 2.2-6，集井式導板陷阱架設位置詳圖 2.2-1。

爬蟲類各物種各季目擊隻次統計，以各樣區各樣線各次調查所記錄之該物種數量（隻次）最大值的總和，求得每季沿線調查各物種在 3 個樣區的出現隻次，代表當季該物種在 3 樣區內的最大可能分布數量。

爬蟲類物種多樣性指數採用 Shannon-Wiener 多樣性指數 (Shannon-Wiener's diversity index, H')：

$$H' = -\sum_{i=1}^S P_i \log_{10} P_i$$

S：各群聚中所記錄到之物種數

P_i ：各群聚中第 i 種物種所占的數量百分比

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之種豐度 (species richness) 及個體數在種間分配是否均勻。若 H' 值愈大，則表示群聚中種數愈多或種間分配較均勻。

均勻度指數採 Pielou 均勻度指數 (Pielou's evenness index, J')：

$$J' = H' / H'_{max} = H' / \log_{10} S$$

S：所出現的物種數

J' 值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。

所記錄之爬蟲類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>)、(2) 向高世等所著「臺灣兩棲爬行類圖鑑」(2009)，以及 (3) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-6 爬蟲類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	記錄沿線看到的爬蟲類種類和數量，輔以徒手或用棍棒翻動地表和落葉，特別注意沿線可能有爬蟲類出沒的地點，包括樹林底層、草叢、水田、埤塘、溝渠、溪澗和溪流等微棲地，經過重要微棲地時進行定點調查。調查結束後沿相同路線返回時，為避免重複計數，只記錄先前未發現的物種，道路上的爬蟲類路死動物個體 (road-killed) 亦為調查記錄重點
導板集井式陷阱	以 3 公尺長、30 公分高的矮圍籬 (導板) 配合改裝過的蝦籠組成陷阱，為調查林下兩棲爬蟲及無脊椎動物之工具，可偵測目視遇測法難以記錄到的種類 (毛俊傑, 2011)




圖 2.2-1 集井導板式陷阱架設位置圖

2.2.6 調查方法

- 。
- 。
- 。

表 2.2-7

調查方法	執行方式

圖 2.2-2 生態研究區野放位置圖
(中央研究院提供)

圖 2.2-3 捕捉陷阱位置圖

2.2.7 蝶類調查方法

蝶類調查方法以行政院環境保護署公告之「動物生態評估技術規範」為基準，採用沿線調查法、吊網陷阱與網捕調查法等三種方法，並先將過去曾記錄之 133 種蝶類製成表格以利調查進行。調查頻度每月一次。蝶類調查方法與執行方式詳表 2.2-8。以各物種各分區各次調查數量的最大值代表該分區該季該物種之數量，全區各物種數量則為各分區之總和。

吊網陷阱捕捉法之樣點及數量延續前期之規劃，於各分區各設置 2 處陷阱，共計 6 個樣點 6 個陷阱 (圖 2.2-4)。

所記錄之蝶類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>)、(2) 臺灣蝶類圖鑑第一至三卷 (徐堉峰，2000、2002、2006)、(3) 臺灣蝶類生態大圖鑑 (濱野榮次，1987)，以及 (4) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-8 蝶類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	沿樣線以每小時 1.5 公里的速度步行。調查時以目視輔以 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察，記錄所有目擊蝶類的種類與數量，無法辨識的種類則視情況許可以昆蟲網進行捕捉，鑑定種類後立即釋回。在積水與較多蜜源植物等蝶類較易聚集的微棲地時則進行定點調查。除成蟲外，亦針對幼蟲進行搜尋。調查結束後沿相同路線返回時，為避免重複計數，只記錄先前未發現的物種
吊網陷阱	對部分習性隱密、沿線調查不易察覺的物種，於林間或步道邊緣利用吊網並置入腐果以氣味誘捕之，並記錄捕獲蝶類的種類與數量，以彌補沿線調查法的不足
網捕法	主要針對非穿越線經過的草生棲地環境上之蝶類進行捕捉，記錄捕獲蝶類的種類與數量



圖 2.2-4 吊網陷阱位置圖

(摘自本案施工中生態監測第十八季報告書)

2.2.8 蜻蛉類調查方法

蜻蛉類調查方法以行政院環境保護署公告之「動物生態評估技術規範」為基準，採用沿線調查法與網捕調查法進行，並先將過去曾記錄之 9 科 56 種蜻蛉類列表以利調查工作進行。調查時留意園區內已知的保育類物種無霸勾蜓 (*Anotogaster sieboldii*) 的棲息環境與數量。蜻蛉類調查頻度為每季一次，調查方法與執行方式詳表 2.2-9。以各物種各分區各次調查數量的最大值代表該分區該季該物種之數量，全區各物種數量則為各分區之總和。

所記錄之蜻蛉類種類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 以及 (2) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-9 蜻蛉類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	路線與蝶類調查相同，以每小時 1.5 公里的速度步行。調查時以目視輔以 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察，記錄所有目擊蜻蛉的種類和數量，無法辨識的種類則視情況許可以昆蟲網進行捕捉，鑑定種類後立即原地釋回。調查結束後沿相同路線返回時，為避免重複計數，只記錄先前未發現的物種
網捕調查法	針對水岸周邊蜻蛉類活動的草生環境進行捕蟲網捕捉法，記錄捕獲蜻蛉類的種類與數量。蜻蛉類幼蟲水蠶之調查於水域底棲動物調查時一併採集與鑑定，詳見第 2.4.4 節。

2.2.9 螢火蟲調查方法

螢火蟲調查方法以行政院環境保護署公告之「動物生態評估技術規範」為基準，採用沿線調查法與網捕調查法進行，同時將過去調查已知的螢火蟲 1 科 8 種先行列表以利調查進行。螢火蟲調查頻度為每季一次，調查方法與執行方式詳表 2.2-10。

所記錄之螢火蟲種類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 以及 (2) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.2-10 螢火蟲調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
沿線調查	調查樣線與蝶類相同，於日落後 1 小時，沿著樣線以每小時 1.5 公里的速度步行。使用套上紅色塑膠紙之手電筒照明，搜尋步道間發光的螢火蟲，並以目視鑑定或以昆蟲網捕捉進行鑑定，記錄種類、數量及棲地環境後，立即原地釋回。在潮濕陰暗處等螢火蟲較易聚集的微棲地則進行定點調查，除成蟲外，亦針對幼蟲進行搜尋
網捕調查法	針對草生與潮溼環境進行捕蟲網調查，記錄捕獲螢火蟲之種類與數量

2.3 陸域植物調查分析方法

2.3.1 原生雜木林復育區（低海拔原生林復育區）物候調查方法

針對新植樹苗監測，監測方向以樹苗的存活率及生長狀況為主，存活率以量化方式表示，調查頻率為每半年 1 次。新植樹苗調查方法與執行方式詳表 2.3-1，原生雜木林復育區位置如圖 2.3-1 所示。

存活率以各樹種苗木死亡數占該樹種總取樣數計算；生長狀況以性狀敘述並輔以照片呈現，調查時以表 2.3-2 進行下列項目之記錄：

- 頂芽：是否完整、折斷或枯萎情況；
- 枝條：生長情形及枯萎情況；
- 枝葉：茂密程度、生長均勻度及病害；
- 主幹：生長情形、健康程度及腐朽情形；
- 根部：外露、病害
- 人為損害；
- 環境壓力；
- 物候情況：開花、葉色變化、結果

表 2.3-1 新植樹苗調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
取樣測量	新植樹苗每一樹種隨機取樣 20%，且數量不得少於 10 株；未滿 10 株之樹種則全數取樣。其中前案已取樣的植株，依照前案取樣之植株編號持續進行生長狀況監測；本計畫執行期間新栽植之樹種，則依上述原則取樣編號，並持續進行監測。監測項目至少包含胸高圍、胸高直徑、樹高、樹冠寬幅



圖 2.3-1 新植樹苗調查位置圖

(摘自「國家生技研究園區施工生態監測委託調查分析專業服務計畫」第九季報告書)

表 2.3-2 新植樹苗及移植喬木生長狀況評估表

樹木編號： 文件編號： /

調查項目	☐ 新植樹苗 ☐ 移植喬木		調查日期	年 月 日 時 分
調查位置	☐ 樹木銀行 ☐ 原生林復育區 ☐ 其他_____			
取樣區間	胸高直徑 ☐ 10cm 以上 ☐ 20cm 以上 ☐ 30cm 以上 ☐ 其他____cm			
相片編號				
樹籍資料	胸高圍	胸高直徑	樹高	樹冠寬幅
	cm	cm	m	m
評估結果	○生長良好 ☒ 生長不良 /無此項目			
評估項目	評估標準	生長良好	生長不良	生長不良原因說明
頂芽 (新植樹苗)	是否完整、折斷或枯萎情況			
枝條	生長情形或枯萎情況			
枝葉	茂密程度、生長均勻度及病害			
主幹	生長情形、健康程度及腐朽情形			
根部	外露、病害			
物候情況	開花、葉色變化、結果			
生長狀況 (以樹形敘述)：				
異常狀況敘述 (人為損害、環境壓力)：				

2.4 水域調查分析方法

2.4.1 水域動物調查方法

水域動物生態調查的對象包含魚類、兩棲類（含卵與幼體）、底棲動物（水棲昆蟲、蝦蟹螺貝類及環節動物）、浮游動物、蜻蛉類水蠅等。水域生態調查之樣站延續前案，分別為三重埔埤、滯洪池、四分溪上游及四分溪下游（圖 2.4-1），調查執行點位如圖 2.4-2。調查方法整理如表 2.4-1，調查所得之生物個體拍照存證並記錄生活史狀態。



圖 2.4-1 水域生態調查樣站位置圖
(摘自本案施工中生態監測第十八季報告書)



圖 2.4-2 水域生態調查執行點位

表 2.4-1 水域生態調查方法彙整表

類群	調查方法	調查方法說明	調查頻率	鑑定參考資料
魚類	蝦籠誘捕法	蝦籠屬氣味誘引陷阱。採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上，蝦籠內置入具香味的誘魚粉做為誘引物。蝦籠誘捕法之優點為可進行長時間誘集，且能捕捉到不易採集之小型魚蝦。蝦籠至少每 24 小時檢查一次，取出所誘捕之生物並置換誘引物。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75% 之酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄每一類群生物之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態等	自放置起 4 天 3 夜回收。至少每 24 小時檢查一次	沈世傑 (1989)、陳義雄 (1999)、邵廣昭 (2004)、周銘泰 (2011) 等
	手拋網	以八卦網於各水域拋入水體中，輔助採集魚類及蝦蟹類。調查樣站不包含人工濕地復育區北側新設溪流樣站，因該樣點溪流窄且淺，不適用手拋網調查	每季 1 次	
兩棲類 (含卵、幼體)	蝦籠誘捕法	採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上。蝦籠至少每 24 小時檢查一次。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75% 酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄調查到之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態等	自放置起 4 天 3 夜回收。至少每 24 小時檢查一次	TaiBNET 臺灣物種名錄、行政院農業委員會保育類野生動物名錄
底棲動物 (水棲昆蟲、蝦蟹螺貝及環節動物)	蝦籠誘捕法	採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上，蝦籠內置入具香味的誘魚粉做為誘引物。蝦籠誘捕法之優點為可進行長時間誘集，且能捕捉到不易採集之小型魚蝦。蝦籠至少每 24 小時檢查一次，取出所誘捕之生物並置換誘引物。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75% 之酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄每一類群生物之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態	自放置起 4 天 3 夜回收。至少每 24 小時檢查一次	施志昀 (1998, 2009)、賴景陽 (2005)、林春吉 (2007) 等
	手拋網	以八卦網輔助採集底棲動物，並以徒手搜尋其它無脊椎動物	每季 1 次	
	蘇柏氏網法與手抄網	以蘇柏氏網採取四分溪、新設溪流樣區之河川底棲性水棲昆蟲與無脊椎動物。於樣站選擇水深不超過 60 公分的區域，逆向放置蘇柏氏網，攪動鐵框內的水並將附著在石塊上的動物掃至網內。每一個採樣區內重複採樣 5 次；在不適合使用蘇柏氏網的深水環境與水池 (含新設池塘樣點，滯洪池區則另針對鄰近防爆牆之石砌區進行螺貝類調查)，以手抄網進行水棲昆蟲與無脊椎動物調查，在水體岸邊撈取採集 5 網。收集所得之無脊椎動物置入 75% 的酒精中，標本瓶上記錄採樣時間、地點及採集者，於實驗室內鏡檢分類鑑定，記錄各樣點之物種、數量及其棲地環境等	每季 1 次	川合禎次 (1985)、行政院環境保護署環境檢驗所 (1990)、楊平世 (1992)、徐崇斌與楊平世 (1997)
浮游動物	浮游生物採集網	在溪流與水塘樣區 (不含新設溪流池塘樣站) 內利用孔徑 80 μm 之浮游生物網進行採集，每一個樣站取水樣 20 公升，經過濾濃縮後倒入採集瓶中，再將 2 ml 中性福馬林倒入濃縮液中，加蒸餾水至 50 ml，使溶液達到含有 4% 之中性福馬林，攜回實驗室置於光學顯微鏡下進行鑑定與計量。實驗室中以浮游生物計算盤 (Sedgewick-Rafter counting cell) 觀測，每次取 1 ml 樣本，重複 5 次；每一樣本分別取上層、中層、下層與側邊共 5 ml 的濃縮液。將濃縮液緩慢注入計算盤中，靜置 15 分鐘等待樣本沉澱，以 100-400X 放大倍率鏡檢，記錄浮游動物物種與計算數量，同時對每一物種拍照記錄	每季 1 次	山路勇 (1986)、千原光雄 (1997) 等

2.4.2 魚類調查方法

魚類主要以底棲式蝦籠進行調查，並以手拋網輔助進行採集捕捉，以完善區內魚類物種名錄。魚類調查點位如圖 2.4-2，調查方法與執行方式詳表 2.4-2。

魚類類鑑定參考沈世傑 (1989)、陳義雄 (1999)、邵廣昭 (2004)、周銘泰 (2011)等著作，並依據 TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 以及行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.4-2 魚類調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
蝦籠誘捕法	蝦籠屬氣味誘引陷阱。採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上，蝦籠內置入具香味的誘魚粉做為誘引物。蝦籠誘捕法之優點為可進行長時間誘集，且能捕捉到不易採集之小型魚蝦。蝦籠至少每 24 小時檢查一次，取出所誘捕之生物並置換誘引物。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75%之酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄每一類群生物之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態等
手拋網	以八卦網於各水域拋入水體中，輔助採集魚類及蝦蟹類。調查樣站不包含人工濕地復育區北側新設溪流樣站，因該樣點溪流窄且淺，不適用手拋網調查

2.4.3 兩棲類 (含卵與幼體) 調查方法

兩棲類 (含卵與幼體) 主要利用底棲型蝦籠進行調查，調查點位如圖 2.4-2，調查方法與執行方式詳表 2.4-3。

所記錄之兩棲類依據 (1) TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 以及 (2) 行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.4-3 兩棲類 (含卵與幼體) 調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
蝦籠誘捕法	採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上。蝦籠至少每 24 小時檢查一次。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75%酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄調查到之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態等

2.4.4 底棲動物—水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蜚)、蝦蟹螺貝及環節動物調查方法

蝦蟹螺貝類主要利用底棲型蝦籠進行調查，並利用手拋網輔助採集；水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蜚) 調查主要採用蘇柏氏定面積網與手抄網進行調查。底棲動物調查頻率為每季 1 次，調查點位如圖 2.4-2，調查方法與執行方式詳表 2.4-4。

水棲昆蟲鑑定以川合禎次 (1985)、行政院環境保護署環境檢驗所 (1990)、楊平世 (1992)、徐崇斌與楊平世 (1997) 等著作為參考依據；其他大型無脊椎動物的鑑定以施志昀

(1998, 2009)、賴景陽 (2005)、林春吉 (2007) 等著作為參考依據。並依據 TaiBNET 臺灣物種名錄 (<http://taibnet.sinica.edu.tw>) 以及行政院農業委員會於 2019 年 1 月 9 日公告之保育類野生動物名錄 (農林務字第 1071702243A 號)，進行名錄製作並判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

表 2.4-4 底棲動物—水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蚤)、蝦蟹螺貝及環節動物調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
蝦籠誘捕法	採用底棲式蝦籠，分別置放於定點的水體底床上，蝦籠內置入具香味的誘魚粉做為誘引物。蝦籠誘捕法之優點為可進行長時間誘集，且能捕捉到不易採集之小型魚蝦。蝦籠至少每 24 小時檢查一次，取出所誘捕之生物並置換誘引物。調查所得之生物分類鑑定並拍照存證，若有無法鑑定之物種則以 75% 之酒精浸泡後，帶回實驗室處理。並記錄每一類群生物之種類、數量、分布地點及個體之生活史狀態
手拋網	以八卦網於各水域之岸邊拋入水體中，輔助採集蝦蟹類。調查樣站不包含人工濕地復育區北側新設溪流樣站，因該樣點溪流窄且淺，不適用手拋網的調查
蘇柏氏定面積網	以蘇柏氏網採取四分溪、新設溪流樣區之河川底棲性水棲昆蟲與無脊椎動物。於樣站選擇水深不超過 60 公分的區域，逆向放置蘇柏氏網，攪動鐵框內的水並將附著在石塊上的動物掃至網內。每一個採樣區內重複採樣 5 次。採集之標本置放於 75% 的酒精中，帶回實驗室內鏡檢分類鑑定，記錄各樣點的物種、數量及其棲地環境等
手抄網	在不適合使用蘇柏氏網的深水環境與水池 (含新設池塘樣點，滯洪池區則另針對鄰近防爆牆之石砌區進行螺貝類調查)，以手抄網進行水棲昆蟲與無脊椎動物調查，在水體岸邊撈取採集 5 網，採集之標本置放於 75% 的酒精中，帶回實驗室內鏡檢分類鑑定，記錄各樣點的物種、數量及其棲地環境等

2.4.5 浮游動物調查方法

浮游動物主要利用浮游生物網進行採樣與鑑定，調查方法與執行方式詳表 2.4-5。

多樣性指數採用 Shannon-Wiener 多樣性指數 (Shannon-Wiener's diversity index, H')：

$$H' = -\sum_{i=1}^S P_i \log_{10} P_i$$

S ：各群聚中所記錄到之物種數

P_i ：各群聚中第 i 種物種所占的數量百分比

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之種豐富度 (species richness) 及個體數在種間分配是否均勻。若 H' 值愈大，則表示群聚中種數愈多或種間分配較均勻。

浮游動物分類以山路勇 (1986) 及千原光雄 (1997) 等文獻為參考依據，並請水域生態專家協助指導。鑑定時並對每一物種拍照記錄，藉此建立證據標本照片，以供後續參考與比對。

表 2.4-5 浮游動物調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
浮游生物採集網	利用孔徑 80 μm 之浮游生物網行採集，於樣點處 (不含人工濕地復育區北側新設樣站) 取水樣 20 公升，經過濾濃縮後倒入採集瓶中，再將 2 ml 中性福馬林倒入濃縮液中，加蒸餾水至 50 ml，使溶液達到含有 4% 之中性福馬林；實驗室中以浮游生物計算盤 (Sedgewick Rafter counting cell) 定量取樣，每次取 1 ml 樣本，重複 5 次，每一樣本分別取上層、中層、下層與側邊共 5 ml 的濃縮液；將濃縮液緩慢注入計算盤中，靜置 15 分鐘等待樣本沉澱，以 100-400X 放大倍率鏡檢，記錄浮游動物物種與計算數量，同時對每一物種拍照記錄

2.4.6 水域植物 (含浮游植物及附生藻類) 調查方法

水域植物 (含浮游植物及附生藻類) 分別以取水樣及刮取樣本的方法，在各樣區進行取樣調查；水域植物調查頻度為每年一次，調查方法與執行方式詳表 2.4-6。

浮游植物及附生藻類分類以胡鴻鈞等 (1981)、水野壽彥 (1987)、森若美代子等 (1996) 與行政院環境保護署 (1999) 等文獻資料為參考依據，並請水域生態專家協助指導與鑑定。鑑定時並對每一物種拍照記錄，藉此建立證據標本照片，以供後續監測參考與比對。

表 2.4-6 水域植物 (含浮游植物及附生藻類) 調查方法與執行方式

調查方法	執行方式
取樣調查 (取水樣)	在選定的樣點採取 1 公升水樣，採集到的樣品以 3-5% 之中性福馬林固定保存，攜回實驗室置顯微鏡下進行鑑定與計量
取樣調查 (刮取樣本)	附著性藻類樣品係取水下之護岸、石塊或木頭，以細銅刷或毛刷刮取 10 cm × 10 cm 定面積上之藻類，之後打散、溶解、過濾。本項採集避免於大雨後一週內進行。採集到的樣品以 3-5% 之中性福馬林固定保存，攜回實驗室置顯微鏡下進行鑑定與計量

水域植物完成種類鑑定後，計算以下指標以分析水域植物群聚的特性與水質狀況：

(1) Shannon-Wiener 多樣性指數 (Shannon-Wiener's diversity index, H')：

$$H' = -\sum_{i=1}^S P_i \log_{10} P_i$$

S：該樣站所記錄到之物種數

P_i ：該樣站第 i 種物種所占的數量百分比

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之種豐度 (species richness) 及個體數在種間分配是否均勻。若 H' 值愈大，則表示群聚中種數愈多或種間分配較均勻。

(2) 物種豐富度指數 (Margalef's richness index, D)：

$$D = \frac{S}{\ln n}$$

S：所記錄到之物種數

n：所有物種個體數總和

(3) 腐水度指數 (SI)：

腐水度指數 (saprobic index, SI) 以水中的藻類為指標來計算腐水程度，用以評估河川、池塘、溪流及水庫等水域環境的水體進行分解作用的程度，可以反映水域的水質優劣，計算公式如下 (Zelinka & Marven, 1961)：

$$SI = \sum (s_i \cdot h_i \cdot g_i) / \sum (h_i \cdot g_i)$$

s_i ：藻類群落中 i 指標藻種的腐水度值

h_i ：藻類群落中 i 指標藻種的出現頻度

g_i ：藻類群落中 i 指標藻種的指標權重

SI < 1.5 為貧腐水級水質；1.5 < SI < 2.5 為 β -中腐水級水質；2.5 < SI < 3.5 為 α -中腐水級水質；3.5 < SI 為強腐水級水質。

(4) 優養化指數 (ATSI)：

藻類優養化指數 (algal trophic state index, ATSI) 係利用出現的貧養 (oligo)、普養 (meso) 及優養 (eu) 條件的指標性藻類的出現頻度總和計算出優氧化指數，計算公式如下：

$$ATSI = (F_{oligo} + F_{meso}) / (F_{meso} + F_{eu})$$

F_{oligo} ：貧養性指標藻頻度總合

F_{meso} ：普養性指標藻頻度總合

F_{eu} ：優養性指標藻頻度總合。

ATSI > 1.5 為貧養，0.5 < ATSI < 1.5 為中養，ATSI < 0.5 為優養。

(5) 藻屬指數 (GI)：

藻屬指數 (Generic Index, GI) 為以矽藻類中的曲殼藻屬 (*Achnanthes*)、卵形藻屬 (*Cocconeis*)、小環藻屬 (*Cyclotella*)、橋彎藻屬 (*Cymbella*)、直鏈藻屬 (*Melosira*) 及菱形藻屬 (*Nitzschia*) 之出現頻度比值，評估水域環境的污染程度和環境優劣，計算公式如下 (Wu, 1999)：

$$GI = X / Y$$

X：*Achnanthes*、*Cocconeis* 及 *Cymbella* 藻屬出現的頻度和

Y：*Cyclotella*、*Melosira* 及 *Nitzschia* 藻屬出現的頻度和

GI > 30 為極輕微污染水質；11 < GI < 30 為微污染水質；1.5 < GI < 11 為輕度污染水質；0.3 < GI < 1.5 為中度污染水質；GI < 0.3 為嚴重污染水質。

2.5 紅外線自動相機監測及分析方法

自動照相機具有可長時間調查、日夜工作、標準化、能偵測稀有隱密難以觀察記錄之動物、雨天仍能工作等優點，特別適合中大型哺乳動物如鼬獾、白鼻心、麝香貓、■■■■等，及地棲型鳥類如臺灣竹雞、臺灣山鷓鴣、黑冠麻鷺、翠翼鳩及鶉科鳥類等，能夠補充現場沿線調查難以發現記錄的物種資訊。透過自動照相機，除了知道物種是否出現之外，也能了解動物出現之時間（活動模式），更能進一步分析與量化動物族群豐富度與喜好出現之棲地環境。

自動照相機的資料分析，主要包括物種名錄、活動模式及出現頻度 (Chiang 2007、Chiang et al. 2012)。活動模式部分，當一動物在某一時段越活躍，則其在該時段被拍攝到的機率越高，因此各時段某種動物的有效照片張數可以當作該物種在該時段的活動頻度指標，累計全天 24 小時每個時段的有效照片張數，即可以說明該物種的活動模式。每一時段活動量之計算公式如下：

$$\text{某時段活動量} = (\text{一物種在某時段有效照片總數} / \text{該物種全部有效照片數}) * 100\%$$

以每次記錄區間之最後一張照片的時間為基準，往回推算 24 小時的倍數，將每次記錄區間第一天不足 24 小時部分所拍到的照片略去，不計入活動模式的張數；刪除第 1 天的原因，主要是減少第一天架設工作的人為干擾對動物活動之可能影響所造成的偏差。1 個小時以內同 1 隻個體的連拍只視為 1 張有效照片紀錄，並以第 1 張當作有效活動時間與出現頻度紀錄；不同個體即使同 1 個小時內連拍，也當作不同的有效紀錄；若是 1 張照片內有 2 隻以上不同個體，每隻個體都視做 1 筆獨立的有效紀錄。臺灣竹雞及臺灣山鷓鴣等 2 種地棲性鳥類為群居動物，因此以群為取樣單位；這 2 種動物 1 小時內連拍的紀錄，即使是不同個體，一率視為同 1 群而只當作 1 筆有效紀錄。動物之相對出現頻度以 OI 值 (occurrence index) 表示：

$$OI = (\text{一物種在該樣點的有效照片數} / \text{該樣點的總工作時數}) * 1000 \text{ 小時}$$

臺灣竹雞及臺灣山鷓鴣等 2 種地棲性鳥類的有效照片數皆以群為單位，其他動物則以單隻為單位。自動照相機的拍照頻度可以作為動物相對豐富度的指標 (Carbone et al. 2001, O'Brien et al. 2003, Rovero & Marshall 2009)，因此 OI 值可表示動物的相對族群量 (裴家騏、姜博仁，2004)。

本計畫自動照相機之架設樣點依需求說明書建議，延續「國家生技研究園區施工中生態監測補充調查計畫」之 13 個樣點，並新增 11 個樣點，架設點位如圖 2.5-1 所示。

所採用之自動照相機為 Bushnell Trophy Cam HD，該相機使用被動式紅外線感應器，為熱與動作感應的形式，在感應到動物移動時即觸發，拍攝感應時間 0.5 秒以下。配合感應器設計，拍攝獸徑動物的數位相機設置於約 30-50 cm 的低高度，俯角 10-20 度略微朝下，以水平感應穿越獸徑之動物。每一季更換電池並下載資料，收回之數位資料將以人工辨識，記錄物種、數量、出現位置、出現時間等，並加註其他附屬資訊 (如天候、行為、調查人員等)。



圖 2.5-1 自動相機位置圖

2.6 指標物種族群分佈監測及分析方法

本計畫將針對環境影響說明書指定之指標物種進行分佈調查與研究，因「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」已規劃有物種調查方法及族群量計算方式，為維持資料之準確性並保持調查計畫之延續性，本計畫將延續「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」之規劃，進行指標物種調查。

「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」依據指標物種之生態習性、活動區域等(表 2.6-1)，設計不同調查方式，其規劃之調查方法如表 2.6-2 所示，大赤鼯鼠以沿線調查、領角鴉以回播調查法、與白鼻心以紅外線自動相機進行調查，調查頻率為每季 1 次。指標物種族群數量監測之目的為了解指標物種分布位置及在各區域之相對密度，據此提出指標物種保育計畫；同時建立族群數量基本資料，提供營運階段調查基準，並評估保育成效。4 種動物依其特性採取不同的調查方法，而各方法所得之族群量特性如表 2.6-3，其中出現頻度為族群相對豐度指標，並非實際族群量，因此必須以相同方法及努力量進行調查比較，以對其相對數量變化與所反映之環境變化情形提出綜合分析。

另為因應施工中 1 至 20 季監測結果發現本區數量似有減少之趨勢，本計畫除了持續採用紅外線自動相機監測外，。

表 2.6-1 指標物種棲地需求特徵

	白鼻心	大赤鼯鼠		領角鴉
環境需求	棲地環境偏好依各區域研究稍有不同，但主要是闊葉林，且偏好於林緣活動。施工前監測拍攝到最多白鼻心活動的環境分別是次生林內的水池旁、次生林內的乾燥溪溝。喜食喬、灌木果實，也食用老鼠和甲蟲，故林相組成有多樣化果實亦可吸引其利用	樹棲性動物，會在樹冠間移動，故連結性佳之森林為合適棲地。利用天然樹洞、岩洞、樹枝巢、崖薑蕨、針葉枝葉叢和藤蔓叢等築巢。施工前監測在道路或步道旁的樹上多次目擊其活動。植食性，以樹葉、果實為主食，不同調查區域其利用植物種類不同。施工前監測記錄到其取食森氏紅淡比，並觀察到其活動於山紅柿及相思樹上		對環境適應力佳，但仍以面積較大且完整之次生林較理想，偏好離水源近的環境，在園區內均勻分布在區域次生林中。利用樹洞營巢，也願意使用人工設置的巢箱。以昆蟲、蛙類、鳥類及小型哺乳類為食，喜歡選擇突出之枝條獵食

備註：本表修改自國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫

表 2.6-2 指標生物調查規劃

紅外線自動相機拍攝：白鼻心、 ■■■■	
白鼻心及 ■■■■ 習性隱密，不易見到個體或活動痕跡（ ■■■■ ），因此採紅外線自動照相機進行調查，並依兩種動物的活動範圍設定相機放置密度。參考兩物種活動範圍之文獻資料，白鼻心活動範圍約 182-410 公頃 (Wang, 1999)； ■■■■ 。考量白鼻心與 ■■■■ 的活動範圍、環評階段調查評估結果、現勘判斷之動物可能活動路徑、棲地類型等因素，綜合評估後確定放置位置，每季檢查電池及相機狀況，並下載拍攝結果	
沿線調查：大赤鼯鼠	
配合延續環評、施工前及施工中之夜間哺乳動物調查，於日落後進行沿線調查，利用強力手電筒探照尋找大赤鼯鼠，輔以 8-10 倍的雙筒望遠鏡觀察，記錄沿線左右兩側各 50 公尺範圍內看到及聽到的數量、棲地類型，若發現取食、交配、育幼等行為或巢穴位置，需記錄並簡單描述。大赤鼯鼠出現位置座標以手持式 GPS 定位調查者座標，再輔以指北針定出大赤鼯鼠之位置方位角、並估算其與調查者距離來計算	
回播法：領角鴉	
領角鴉具有領域性，適合以回播法進行調查。播放預先收錄的領角鴉聲音，可引起附近其他個體前來配對或捍衛地盤。配合定點計數法（圓圈法）即可調查領角鴉的族群量；此方法相較於沿線調查法或定點計數法調查，能更精準估計數量。 沿陸域動物調查的樣線設置至少 10 個回播樣點，樣點必須涵蓋各種棲地類型；為排除重複計數，樣點間直線距離至少 200 m 以上。調查時間自日落後開始，每樣點定點停留 5 分鐘，以片段式的方式撥放預錄的領角鴉叫聲，每次撥放不超過 30 秒，記錄看到及聽到的領角鴉數量與距離；領角鴉出現位置座標以手持式 GPS 定位調查者座標，再輔以指北針定出領角鴉位置方位角、並估算其與調查者距離來計算	

備註：本表修改自國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫

表 2.6-3 指標生物族群量特性

指標物種	調查方法	族群量特性
白鼻心	紅外線自動照相機	出現指數 (OI 值)(有效影片數量/相機工作時間)
大赤鼯鼠	沿線調查	出現頻度 (目擊數量/穿越線長度)
■■■■	紅外線自動照相機	出現指數 (OI 值)(有效影片數量/相機工作時間)
領角鴉	回播法	密度 (個體數量/單位面積)

2.7 樣區、樣站及動物分布位置之 GIS 分析

本計畫每季將彙整機關不定期提供之國家生技研究園區生態觀察資料，併入本案生態調查資料分析。每季與前案資料比對分析歷年各季物種數量變化趨勢，並以 GIS 軟體呈現園區各類群關注物種（指標物種、保育類動物、外來種）之分布熱點及變化圖。

利用 GIS 軟體建置原始調查資料資料庫（含計畫名稱、調查點座標、調查日期及時間、物種類別（綱）、中文名稱、學名、調查方法、數量、調查者、鑑定者、天氣狀況、棲地類型、座標誤差值及其他等欄位項目），並輸出為 EXCEL 檔案格式，併成果報告書提送電子檔。繪製時，樣區、樣站、樣點及動物分佈位置調查結果圖面以最新版相片基本圖、正射影像圖或福衛 2 號衛星影像圖為底圖進行繪製。

地理資訊系統之分析內容將包括調查位置座標、物種相對數量與區域分布，建置 GIS 空間資料庫後，將可產生各樣區、樣站、樣點及動物分佈位置之空間關係 shp 格式圖層，並且得加以綜觀本案及「國家生技研究園區開發計畫」之歷年生態調查案成果。

2.8 生態環境、動、植物相演替變化分析

本計畫將彙整及比對「國家生技研究園區開發計畫」環評階段 (97-99 年)、施工前 (101-102 年)、施工中 (103-107 年) 與本案之生態調查資料，分析生態環境狀況，提供機關作為營運階段監測比對的依據以及監測指標擬定的基礎。

2.9 辦理營運中與生態保育相關之工作

營運中可能面臨之生態事項及建議處理措施，將依照環境影響說明書附錄 22 保育復育計畫 (P.附 22-20) 針對園區營運階段建議之保護原則及對策，其保護措施係針對園區內水、陸域動植物保護之規範，並納入「國家生技研究園區營運中生態監測委託調查分析專業服務計畫」中為防止鳥類撞擊建物玻璃的友善鳥類建築設計及對策 (Audubon, 2007)。監測調查期間若有影響生態之突發狀況，將及時反映相關議題並提供建議與院方；調查期間捕獲之入侵外來物種，如克氏原螯蛄、斑腿樹蛙、福壽螺等，將及時移除；每季並提出應注意之生態相關事項，如該季繁殖之物種、採集適期之植物等，以防止或減緩人為干擾及適時採集棲地復育所需之種源。以下統整相關建議於表 2.9-1。

表 2.9-1 營運中可能面臨之生態事項及建議處理措施

營運階段影響減輕對策	
1	園區內行車速度限制在 25 km/h 以下，減少動物道路致死事件發生
2	建築物的玻璃、內部透射而出的光束及鄰近建築體外圍的光源等，均是造成鳥類撞擊建築結構體而喪命的首要威脅；同時，4 種指標物種均偏好夜間活動，營運階段應落實規劃設計階段之燈光管控，並監測研究專區各大樓野生動物撞擊建築物玻璃的發生頻率與熱點，據以改善玻璃及光源，以完善友善野生動物之建築設計
3	經營上禁止使用除草劑，減少使用化學肥料、化學藥劑等，藉以營造接近自然環境之多樣性環境空間，以利各種野生動物自然孕育及棲息
4	生態保留區、低海拔原生林帶復育區以及人工濕地復育區，屬管制開放區域，除經核備之生態調查研究及解說參訪行程外，禁止人員進入
5	為減緩國家生技研究園區、生態研究區、軍方 202 兵工廠邊界與南港山區之圍籬及圍牆對動物棲地的切割效應，應彙整歷年指標物種、保育類物種等關注物種之分布熱點，於鄰近分布熱點的地點增設動物通道，以維持各區動物之交流
6	動物通道架設紅外線自動相機監測動物利用狀況，另外也關注是否有持續的道路致死課題發生，用以檢視保護措施之效用

三、預期成果

3.1 預期成果概述

本計畫預期完成生態調查、指標物種監測、水體評估監測與 GIS 分析如下表所示。並彙整生態監測調查資料，與環評、施工前及施工中監測調查資料分析比對，分析生態環境狀況，動、植物相演替變化情形。

表 3.1-1 預期成果表

項次	項目		預期成果	預計時程
一	生態調查、監測及分析		(1) 陸域動物名錄 (2) 成果分析與統計	每季1次
1.1	陸域動物調查分析	鳥類		
		其他類群		
1.2	陸域植物調查分析	原生雜木林復育區（低海拔原生林帶復育區）及移植後樹木物候	原生雜木林復育區新植樹苗及移植後樹木物候情況	半年1次
1.3	水域動物調查分析		(1) 水域動物名錄 (2) 成果分析與統計	每季1次
1.4	紅外線自動相機監測及分析		(1) 動物名錄、OI值 (2) 有效動物照片 (3) 成果分析與統計	每季1次
1.5	指標物種族群分佈監測及分析		(1) 指標物種分布、各季相對數量變化 (2) 成果分析與統計	每季1次
二	樣區、樣站及動物調查結果GIS分析		GIS分析圖	每季1次
三	季報告書製作			每季1次
四	年報告書製作		(1) 每季調查分析成果 (2) 彙整歷年生態監測調查資料	結案時

四、調查結果與初步分析

4.1 陸域動物調查分析

4.1.1 鳥類

表 4.1-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 鳥類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
鳥類	2020/09/22-23	06:09-15:25	日間鳥類調查	鳥類沿線調查法	國家生技研究園區(A區)、生態研究區(B區)、202 兵工廠區(C區)	2 人
	2020/10/15	06:15-12:00	日間鳥類調查		國家生技研究園區(A區)、生態研究區(B區)、202 兵工廠區(C區)	2 人
	2020/11/25	06:15-13:40	日間鳥類調查		國家生技研究園區(A區)、生態研究區(B區)、202 兵工廠區(C區)	2 人

4.1.1.1 本季調查成果分析

- 物種組成與數量

營運中第 8 季鳥類調查以日間沿線調查法為主，於 2020 年 9-11 月沿各樣線進行每月 1 次日間沿線調查，調查時間詳見表 4.1-1；另輔以自動相機調查補充地棲性鳥類名錄，自動相機調查總工作時數詳見第 4.4 節。

營運中第 8 季 (2020 年 9 月至 11 月) 全區調查共記錄鳥類 29 科 54 種 484 隻次 (附錄二、附表一)，鳥類沿線調查法記錄鳥類 26 科 44 種 286 隻次 (表 4.1-2，不含飛過及時段外等不列入分析之個體)，自動相機陷阱記錄鳥類 13 科 19 種，其中台灣山鷓鴣、藍腹鷓鴣、山鷓鴣、短尾鶯、白腰鵲鴝、白氏地鵲及赤腹鵲鴝僅記錄於自動相機陷阱，未於沿線調查記錄 (表 4.1-2)，野鴿、黃嘴角鴝與領角鴝 3 種則僅在其他調查或非調查時段記錄 (附錄二、附表一)。

本季園區內記錄留鳥 30 種，為台灣竹雞、小鸚鵡、黃頭鷺、夜鷺、黑冠麻鷺、大冠鷺、鳳頭蒼鷹、黑鳶、白腹秧雞、紅冠水雞、翠翼鳩、黃嘴角鴝、領角鴝、小雨燕、五色鳥、大卷尾、黑枕藍鶇、台灣藍鶇、樹鶇、洋燕、白頭翁、紅嘴黑鵲、灰頭鷓鴣、褐頭鷓鴣、綠繡眼、山紅頭、小彎嘴、大彎嘴、白鵲鴝及斑文鳥；冬候鳥 10 種，包括蒼鷺、大白鷺、小白鷺、磯鶇、紅尾伯勞、黃尾鷺、白氏地鵲、白腹鵲、赤腹鵲及灰鵲鴝；引進種 2 種，為野鴿及白腰鵲鴝。

- 保育類

本季全區共記錄 10 種保育類鳥類，包括珍貴稀有之第二級保育類 7 種 (藍腹鷓鴣、東方蜂鷹、大冠鷺、鳳頭蒼鷹、黑鳶、黃嘴角鴝及領角鴝)，其他應予保育之第三級保育類 3 種 (台灣山鷓鴣、紅尾伯勞及台灣藍鶇)，其中藍腹鷓鴣、台灣山鷓鴣及黑鳶為不普遍留鳥，其餘種類均為台灣低海拔森林常見物種。本季記錄之

保育類鳥類分布位置如圖 4.1-1 至圖 4.1-10。

- **特有種**

本季共記錄特有種 8 種 (台灣山鷓鴣、台灣竹雞、藍腹鷓鴣、五色鳥、台灣藍鵲、小彎嘴、大彎嘴及繡眼畫眉)，特有亞種 13 種 (大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃嘴角鴉、領角鴉、小雨燕、大卷尾、小卷尾、黑枕藍鶇、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鶇、褐頭鷓鴣及山紅頭)。除台灣山鷓鴣、藍腹鷓鴣及灰腳秧雞為不普遍留鳥外，其餘鳥種皆為台灣低海拔森林及平原常見物種。

- **外來種**

本季共記錄外來種 3 種，分別為綠頭鴨、野鴿及白腰鵲鴿，其分布如圖 4.1-11。

- **優勢種**

營運中第 8 季 (秋季，2020 年 9 月至 2020 年 11 月) 沿線調查數量最豐富的優勢鳥種 (係指數量超過總數量 5% 的種類)，分別為白頭翁 (74 隻次，佔比為 25.87%)、綠繡眼 (50 隻次，佔比為 17.48%) 及樹鵲 (21 隻次，佔比為 7.34%) 等 3 個物種，3 種累計隻次占鳥類總隻次的 50.70%。優勢鳥種皆為台灣低海拔淺山森林及開闊平原常見鳥類，普遍分布於全區。

- **空間分布、棲地利用**

本計畫第 8 季鳥類沿線調查結果，國家生技研究園區記錄 20 科 31 種 129 隻次，202 兵工廠區記錄 18 科 32 種 117 隻次，生態研究區則記錄 12 科 16 種 40 隻次 (詳見表 4.1-2)。

本季調查時節為秋季，除了留鳥外已可以記錄不少數冬候鳥或過境鳥。整體而言，A 區的物種組成仍維持森林性及水域性物種的組成模式，B 區本季除零星冬候鳥外仍以森林性留鳥為主要組成，C 區則與 A 區類似，由喜好森林環境與水域環境的物種所組成。

4.1.1.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

本案歷年監測結果，「環說書」與「國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫」共記錄 15 目 38 科 82 種，施工中 20 季監測共記錄鳥類 16 目 46 科 118 種 (包括前案施工中 1-12 季記錄 16 目 44 科 101 種)；營運中第 1-8 季全區共記錄鳥類 16 目 40 科 87 種；環說書、施工中監測、營運中監測等三階段加總，共記錄鳥類 17 目 48 科 128 種 (圖 4.1-12)。

營運中監測第 1 季至第 8 季，較環說書、施工前與施工中監測新增加稀有留鳥林鵲、稀有過境鳥烏灰鶇、稀有過境鳥蒼翡翠、不普遍留鳥黑鶇、普遍留鳥粉紅鸚嘴、南亞夜鷹、白環鸚嘴鶇及引進種白腰鵲鴿；本季 (營運中第 8 季) 新增黑鶇一種。

- **整體趨勢分析**

營運中第 8 季全區沿線調查所得種類 44 種。A 區調查所得種類為 31 種，略高於與上季 (27 種) 與前一年同季節 (29 種) (圖 4.1-13)。

數量部分，本季沿線調查全區共記錄 286 隻次。A 區共記錄 129 隻次，略低於前季 (145 隻次)。前季 (夏季) 屬於繁殖季，本季屬於非繁殖季且開始會有結群的情況發生，但本季未遇到太多成群活動或是成群數量較少，並無預期中數量多於前季的情況。本季調查所得數量，大多低於施工中階段調查所得數量，是否因調查方法、統計方式抑或者是棲地變化造成，仍須更深入探討。

- **指標變化分析**

本季 A 區多樣性指數為 1.06，而過去歷年秋季 A 區的多樣性指數介於 1.04-1.31 (表 4.1-3)，本季的鳥類多樣性指數偏低；本季 A 區的均勻度指數為 0.71，歷年夏季 A 區的均勻度指數介於 0.70-0.83，本季的均勻度較為偏低。

在相似度分析上，本季全區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 70.71 及 76.19，兩者的相似度接近數值略低，顯示本季調查的物種種類相對較不穩定，由於涵蓋三區包含的棲地環境多，且 B 區 (生態研究區) 及 C 區 (202 兵工廠) 的棲地變化不大，鳥種與數量歷來應該都相對穩定，主要應為 A 區 (生技園區) 及過境或冬候鳥的組成變動所造成。以相似度來說，A 區與去年同季及 2013 指標年夏季相比，相似度為 69.14 與 62.16，相似度就相對更低。本季屬於秋季，除了留鳥外，過境或冬候鳥的比例也會相對提高，因此各年度間的相似度可能因為每年冬候鳥或過境鳥的組成差異而相對較低，且不論全區或是單看 A 區皆有相同的趨勢。雖然相似度偏低，但本季的種類數都高於去年同季與 2013 年指標年，顯示 B 區與 C 區的環境保存狀況仍舊保持的良好狀況，而 A 區的狀況有逐步朝向恢復原有生態系功能的方向發展，但仍須更多年分及季節的資料才能更準確的說明其生態系功能的復原狀況 (圖 4.1-14)。

4.1.1.3 結論建議事項

國家生技研究園區研究專區各大樓於營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 共發生 11 隻次的鳥擊事件 (表 4.1-4)。與前一季相似，仍舊維持於撞擊次數相對高的狀況。108 年度下半年度開始實施相關的鳥擊防範措施，包括窗貼與拉窗措施，希望能夠降低鳥擊事件，由於剛實施的兩季 (2019 冬及 2020 春)，撞擊次數有呈現降低的趨勢，顯示鳥擊的防範措施有一定的防範作用，但從上季開始撞擊次數又呈現增加的趨勢，上季的物種組成主要是翠鳥與斑文鳥，本季則相對較雜，包含極北柳鷹及灰鵲等冬候鳥，對於目前的鳥擊防範措施可能需要進一步的探討與改進。每年度每季的鳥類活動狀況有所差異，目前已有包含四季的資料，以夏、秋兩季的撞擊頻度較高，冬、春的頻度較低，因此接續防範重點可以優先針對夏秋兩季。同時由於防範措施的實施時間僅有一年度的資料，後續仍須持續觀察及收集撞擊的資料，以便釐清年間的變化，尤其應釐清冬春兩季的次數降低是因防範措施或僅是年間的差異所造成。

國家生技園區的復育工程大致已經有一定的程度，變動性也逐步降低，但滯洪池周邊水域波動仍大且隱密性不佳，加上經常性的除草，使得生態功能雖漸增但仍非常有限。棲地養護時應至少保留 2-3 公尺濱岸植被帶不予除草，以維護濕地的隱密性，並且避開春、夏季鳥類繁殖育雛期。未來仍建議要多樣化復育棲地環境，避免鳥種的單一化。但整體而言，國家生技園區的復育工作，使施工中期消失鳥種有

逐漸重回的跡象，且濕地的鳥類群聚多樣性也有增加。

未來將延續相同調查方法，持續記錄本區域鳥類於工程結束後的變化，適時提供合宜的建議來減緩施工影響，並針對生態滯洪池、人工濕地復育區、低海拔原生森林復育區、樹木銀行、臺北樹蛙棲境復育區、生物資訊大樓濕地棲地補償復育區等生態措施，進行施工階段及營運中復育演替階段之鳥類群聚的調查與變化分析。



圖 4.1-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-大冠鷺分布圖



圖 4.1-2 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-鳳頭蒼鷹分布圖



圖 4.1-3 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-東方蜂鷹分布圖



圖 4.1-4 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-黑鳶分布圖



圖 4.1-5 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-黃嘴角鴉分布圖



圖 4.1-6 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-領角鴉分布圖



圖 4.1-7 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育鳥類-藍腹鵲分布圖



圖 4.1-8 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-台灣山鷓鴣分布圖



圖 4.1-9 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-紅尾伯勞分布圖



圖 4.1-10 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育鳥類-台灣藍鵲分布圖



圖 4.1-11 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種鳥類分布圖




圖 4.1-12 2008-2020 年各季鳥類累計物種數




圖 4.1-13 2008-2020 年各季鳥類記錄物種數




圖 4.1-14 2012-2020 年鳥類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-2 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區鳥類物種與數量

目	科	中文名	台灣生息狀態	特有種	保育類	營運中監測第 8 季 (秋 2020/9-11)			
						A 區	B 區	C 區	全區
雁形目	雁鴨科	鶯鶯	留、不普/過、稀		II				
雁形目	雁鴨科	綠頭鴨	冬、不普/引進種、稀					2	2
雁形目	雁鴨科	花嘴鴨	留、不普/冬、不普						
雁形目	雁鴨科	琵嘴鴨	冬、普						
雁形目	雁鴨科	小水鴨	冬、普						
雁形目	雁鴨科	鳳頭潛鴨	冬、普						
雁形目	雁鴨科	北京家鴨	引進種、普						
雞形目	雉科	台灣山鵲	留、不普	◎	III		*		*
雞形目	雉科	台灣竹雞	留、普	◎		1*	*	*	1*
雞形目	雉科	藍腹鵲	留、不普	◎	II		*		*
鸛形目	鸛科	小鸛	留、普/冬、普			1			1
鸛形目	鸛科	大水獺	海、普						
鵜形目	鵜科	黃小鵜	留、普/夏、普						
鵜形目	鵜科	蒼鵜	冬、普			1		2	3
鵜形目	鵜科	大白鵜	冬、普/夏、不普			1		4	5
鵜形目	鵜科	中白鵜	冬、普/夏、稀						
鵜形目	鵜科	小白鵜	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			6		2	8
鵜形目	鵜科	黃頭鵜	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			2			2
鵜形目	鵜科	池鵜	冬、稀						
鵜形目	鵜科	夜鵜	留、普/冬、稀/過、稀			2		1	3
鵜形目	鵜科	黑冠麻鵜	留、普			1*	*	1*	2*
鷹形目	鵟科	魚鷹	冬、不普		II				
鷹形目	鷹科	東方蜂鷹	留、不普/過、普		II			1	1
鷹形目	鷹科	大冠鵟	留、普	○	II	1	1*	1*	3*
鷹形目	鷹科	林鵟	留、稀		II				
鷹形目	鷹科	灰面鵟	過、普/冬、稀		II				
鷹形目	鷹科	鳳頭蒼鷹	留、普	○	II	*		1	1*
鷹形目	鷹科	赤腹鷹	過、普		II				
鷹形目	鷹科	松雀鷹	留、不普	○	II				
鷹形目	鷹科	蒼鷹	冬、稀		II				
鷹形目	鷹科	黑鵟	留、不普		II	1			1
鵲形目	秧雞科	灰腳秧雞	留、不普	○					
鵲形目	秧雞科	白腹秧雞	留、普			1	1		2
鵲形目	秧雞科	緋秧雞	留、普						
鵲形目	秧雞科	紅冠水雞	留、普			3			3
鵲形目	秧雞科	白冠雞	冬、不普						
鵲形目	長腳鵲科	高蹺鵲	留、不普/冬、普						

目	科	中文名	台灣生息狀態	特有種	保育類	營運中監測第 8 季 (秋 2020/9-11)			
						A 區	B 區	C 區	全區
鴿形目	鴿科	小環頸鴿	留、不普/冬、普						
鴿形目	彩鵒科	彩鵒	留、普		II				
鴿形目	水雉科	水雉	留、稀/過、稀		II				
鴿形目	鵒科	磯鵒	冬、普					5	5
鴿形目	鵒科	白腰草鵒	冬、不普						
鴿形目	鵒科	青足鵒	冬、普						
鴿形目	鵒科	山鵒	冬、稀					*	*
鴿形目	鳩鵒科	野鴿	引進種、普						
鴿形目	鳩鵒科	金背鳩	留、普(orii)/過、稀	○					
鴿形目	鳩鵒科	紅鳩	留、普						
鴿形目	鳩鵒科	珠頸斑鳩	留、普						
鴿形目	鳩鵒科	翠翼鳩	留、不普			*	*	1	1*
鴿形目	鳩鵒科	綠鳩	留、不普						
鵑形目	杜鵑科	北方中杜鵑	夏、普						
鵑形目	杜鵑科	鷹鵑	夏、普						
鵑形目	杜鵑科	番鵑	留、普						
鴉形目	鴉科	黃嘴角鴉	留、普	○	II				
鴉形目	鴉科	領角鴉	留、普	○	II			*	*
鴉形目	鴉科	褐鷹鴉	留、不普/過、不普		II				
夜鷹目	夜鷹科	普通夜鷹	過、稀						
夜鷹目	夜鷹科	南亞夜鷹	留、普	○					
雨燕目	雨燕科	小雨燕	留、普	○		1			1
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	留、普/過、不普					1	1
佛法僧目	翠鳥科	蒼翡翠	過、稀						
鷺形目	鬚鷺科	五色鳥	留、普	◎		2	1	5*	8*
鷺形目	啄木鳥科	小啄木	留、普						
隼形目	隼科	遊隼	留、稀/冬、不普/過、不普		II				
雀形目	八色鳥科	八色鳥	夏、不普		II				
雀形目	伯勞科	紅尾伯勞	冬、普/過、普		III	1	*	1	2*
雀形目	綠鵙科	綠畫眉	留、普				3	3	6
雀形目	卷尾科	大卷尾	留、普/過、稀	○		3		3	6
雀形目	卷尾科	小卷尾	留、普	○				1	1
雀形目	王鵓科	黑枕藍鵓	留、普	○		3	1	1	5
雀形目	鴉科	台灣藍鵲	留、普	◎	III	*	2*	5*	7*
雀形目	鴉科	樹鵲	留、普	○		8	3*	10*	21*
雀形目	鴉科	喜鵲	引進種、普						
雀形目	鴉科	巨嘴鴉	留、普						
雀形目	燕科	家燕	夏、普/冬、普/過、普					1	1
雀形目	燕科	洋燕	留、普/過、蘭嶼稀			1		2	3

目	科	中文名	台灣生息狀態	特有種	保育類	營運中監測第 8 季 (秋 2020/9-11)			
						A 區	B 區	C 區	全區
雀形目	鶇科	白環鸚嘴鶇	留、普	○					
雀形目	鶇科	白頭翁	留、普	○		46*	10	18*	74*
雀形目	鶇科	紅嘴黑鶇	留、普	○		2	1	9	12
雀形目	樹鶇科	短尾鶇	冬、稀/過、稀				*	*	*
雀形目	樹鶇科	日本樹鶇	冬、稀						
雀形目	樹鶇科	遠東樹鶇	冬、不普						
雀形目	柳鶇科	褐色柳鶇	冬、稀/過、稀						
雀形目	柳鶇科	黃眉柳鶇	冬、普						
雀形目	柳鶇科	極北柳鶇	冬、普						
雀形目	柳鶇科	堪察加柳鶇	？						
雀形目	葦鶇科	東方大葦鶇	冬、普						
雀形目	蝗鶇科	蒼眉蝗鶇	過、稀						
雀形目	蝗鶇科	茅斑蝗鶇	過、不普						
雀形目	扇尾鶇科	灰頭鷓鶇	留、普			1			1
雀形目	扇尾鶇科	褐頭鷓鶇	留、普	○		1			1
雀形目	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	留、普	○					
雀形目	繡眼科	冠羽畫眉	留、普	◎	III				
雀形目	繡眼科	綠繡眼	留、普(simplex)/冬、稀(japonicus(?))			26	6	18	50
雀形目	畫眉科	山紅頭	留、普	○		1	1	3	5
雀形目	畫眉科	小鸚嘴	留、普	◎		2	2	1	5
雀形目	畫眉科	大鸚嘴	留、普	◎		1	2	1	4
雀形目	雀眉科	頭烏線	留、普	○					
雀形目	噪眉科	繡眼畫眉	留、普	◎			4		4
雀形目	噪眉科	白耳畫眉	留、普	◎	III				
雀形目	噪眉科	黑喉噪眉	引進種、稀	@					
雀形目	鵲科	台灣紫鵲	留、普	◎					
雀形目	鵲科	白腰鵲	引進種、不普	@		*	*		*
雀形目	鵲科	野鵲	冬、普/過、普						
雀形目	鵲科	白尾鵲	留、不普	○	III				
雀形目	鵲科	黃尾鵲	冬、不普			1	1		2
雀形目	鵲科	黑喉鵲	冬、不普/過、不普						
雀形目	鶇科	白氏地鶇	冬、普			*	*	*	*
雀形目	鶇科	烏灰鶇	過、稀						
雀形目	鶇科	中國黑鶇	留、稀/冬、稀						
雀形目	鶇科	白眉鶇	冬、不普						
雀形目	鶇科	白腹鶇	冬、普			3*		4*	7
雀形目	鶇科	赤腹鶇	冬、普			*			*
雀形目	鶇科	斑點鶇	冬、不普						

目	科	中文名	台灣生息狀態	特有種	保育類	營運中監測第 8 季 (秋 2020/9-11)			
						A 區	B 區	C 區	全區
雀形目	八哥科	白尾八哥	引進種、普						
雀形目	八哥科	家八哥	引進種、普						
雀形目	八哥科	灰椋鳥	留、稀/冬、不普						
雀形目	啄花科	綠啄花	留、不普	○					
雀形目	鵲鴝科	東方黃鵲鴝	冬、普/過、普					1	1
雀形目	鵲鴝科	灰鵲鴝	冬、普			2	1	4	7
雀形目	鵲鴝科	白鵲鴝	留、普/冬、普/迷					4	4
雀形目	鵲鴝科	樹鵲	冬、普						
雀形目	鷓鴣科	田鷓	過、稀						
雀形目	鷓鴣科	野鷓	過、稀		II				
雀形目	鷓鴣科	黑臉鷓	冬、普						
雀形目	麻雀科	麻雀	留、普						
雀形目	梅花雀科	白腰文鳥	留、普						
雀形目	梅花雀科	斑文鳥	留、普			3			3
科數						20(1)	12(6)	18(3)	26(2)
種數						31(6)	16(9)	32(5)	44(8)
隻數						129	40	117	286

出現頻率：稀 - 稀有、不普 - 不普遍、普 - 普遍；

生息狀態：留 - 留鳥、冬 - 冬候鳥、夏 - 夏候鳥、過 - 過境鳥；

遷徙屬性依據中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會在 2017 年公佈的臺灣鳥類名錄。

特有性：◎臺灣特有種、○臺灣特有亞種、@外來引進種；

保育類：I - 瀕臨絕種保育類野生動物、II - 珍貴稀有保育類野生動物、III - 一般保育類野生動物；

保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告及 108 年 1 月 9 日農林務第 1071702243A 號公告

樣區：A 區 - 國家生技研究園區、B 區 - 生態研究區、C 區 - 其餘位於 202 兵工廠調查範圍；

*表示自動相機記錄；(數字)表示自動相機記錄增加科數與種數；自動相機記錄物種僅作為物種補充用，不列入數量統計；

表格資料擇優後呈現

#由園區生態委員或志工目擊

表 4.1-3 2008-2020 年各區各季鳥類多樣性指數及均勻度指數

計畫階段	年度	季節	A 區(國家生技研究園區)		B 區(生態研究區)		C 區(202 兵工廠區)	
			Shannon-Wiener's diversity index (H')	Pielou's evenness index (J')	Shannon-Wiener's diversity index (H')	Pielou's evenness index (J')	Shannon-Wiener's diversity index (H')	Pielou's evenness index (J')
環境說明書第 1 季	2008	冬	1.3	0.93	1.13	0.96	1.12	0.91
環境說明書第 2 季	2009	春	1.28	0.95	1.13	0.94	1.22	0.93
環境說明書第 3 季	2010	夏	1.27	0.93	1.01	0.91	1.30	0.93
施工前監測第 1 季	2012	秋	1.17	0.76	1.16	0.84	1.24	0.8
施工前監測第 2 季	2013	冬	0.96	0.68	1.16	0.94	1.22	0.82
施工前監測第 3 季	2013	春	1.34	0.85	1.18	0.88	1.27	0.83
施工前監測第 4 季	2013	夏	1.25	0.88	1.19	0.92	1.26	0.87
施工前監測第 5 季	2013	秋	1.24	0.78	1.12	0.89	1.30	0.83
施工中監測第 1 季	2014	冬	1.12	0.79	1.07	0.87	1.19	0.79
施工中監測第 2 季	2014	春	1.32	0.84	1.20	0.92	1.28	0.79
施工中監測第 3 季	2014	夏	1.23	0.76	1.20	0.92	1.30	0.80
施工中監測第 4 季	2014	秋	1.22	0.76	1.20	0.88	1.22	0.72
施工中監測第 5 季	2015	冬	1.21	0.70	1.12	0.84	1.27	0.79
施工中監測第 6 季	2015	春	1.33	0.78	1.35	0.94	1.26	0.77
施工中監測第 7 季	2015	夏	1.09	0.69	1.15	0.87	1.26	0.79
施工中監測第 8 季	2015	秋	1.31	0.83	1.14	0.89	1.23	0.76
施工中監測第 9 季	2016	冬	0.81	0.50	1.14	0.91	1.08	0.65
施工中監測第 10 季	2016	春	1.36	0.81	1.19	0.93	1.16	0.70
施工中監測第 11 季	2016	夏	1.11	0.76	1.24	0.91	1.12	0.71
施工中監測第 12 季	2016	秋	1.16	0.71	1.08	0.82	1.28	0.77
施工中監測第 13 季	2017	冬	1.08	0.67	0.97	0.72	1.05	0.64
施工中監測第 14 季	2017	春	1.20	0.74	1.25	0.86	1.19	0.71
施工中監測第 15 季	2017	夏	1.32	0.81	1.08	0.9	1.1	0.67
施工中監測第 16 季	2017	秋	1.20	0.72	0.94	0.68	1.11	0.64
施工中監測第 17 季	2018	冬	0.91	0.55	0.89	0.63	1.04	0.60
施工中監測第 18 季	2018	春	1.15	0.71	1.24	0.91	1.19	0.78
施工中監測第 19 季	2018	夏	1.03	0.68	0.81	0.66	1.04	0.68
施工中監測第 20 季	2018	秋	1.21	0.69	1.15	0.82	1.28	0.77
營運中監測第 1 季	2019	冬	0.97	0.87	0.93	0.79	1.30	0.86
營運中監測第 2 季	2019	春	1.09	0.84	1.11	0.97	1.24	0.82
營運中監測第 3 季	2019	夏	1.18	0.85	0.73	0.86	0.85	0.68
營運中監測第 4 季	2019	秋	1.04	0.70	1.01	0.90	1.09	0.79
營運中監測第 5 季	2020	冬	1.06	0.67	1.1	0.83	0.99	0.68
營運中監測第 6 季	2020	春	1.18	0.78	-	-	-	-
營運中監測第 7 季	2020	夏	1.17	0.82	1.03	0.92	1.11	0.79
營運中監測第 8 季	2020	秋	1.06	0.71	1.06	0.88	1.29	0.86

指數以各鳥種當季 3 次調查記錄數量之最大值進行計算

表 4.1-4 施工中第 18 季至今 (2018/5/13-2020/11) 鳥擊事件

日期	物種	數量	大樓代號	牆面方位
2018/5/13	五色鳥	1	F	西
2018/5/13	斑文鳥	1	F	西
2018/5/25	白腰文鳥	1	A	北
2018/5/25	白腰文鳥	1	A	北
2018/6/4	翠鳥	1	C	東
2018/6/15	白腰文鳥	1	F	西
2018/6/17	珠頸斑鳩	1	B	南
2018/6/27	不明	1	B	西
2018/6/27	白腰文鳥	1	C	中央花園
2018/6/27	褐頭鷓鴣	1	C	中央花園
2018/7/12	麻雀	3	F	東
2018/7/19	麻雀	1	F	東
2018/7/22	五色鳥	1	F	西
2018/7/23	麻雀	2	F	西
2018/7/26	綠繡眼	1	F	南
2018/7/30	麻雀	1	F	東
2018/7/31	褐頭鷓鴣	1	F	東
2018/8/12	麻雀	1	F	西
2018/8/13	麻雀	1	F	東
2018/8/16	白腰文鳥	2	F	西北
2018/8/19	麻雀	1	F	東
2018/8/19	麻雀	1	F	西
2018/8/22	麻雀	1	F	東
2018/9/15	五色鳥	1	F	西南
2018/9/29	麻雀	1	F	東
2018/10/15	麻雀	1	F	東
2018/11/20	翠翼鳩	1	E	南
2018/11/20	翠翼鳩	1	E	南
2018/12/2	白腹鸚	1	F	東
2018/12/16	白氏地鸚	1	C	東南
2019/2/27	紅鳩	1	C	西
2019/3/11	虎鸚	1	E	北
2019/3/16	白腹鸚	1	E	西南
2019/4/12	白腰文鳥	2	B	建築物間天井
2019/4/22	赤腹鸚	2	G	西
2019/4/29	五色鳥	1	G	東
2019/4/29	翠翼鳩	1	G	東北
2019/5/31	翠鳥	1	E	南
2019/6/16	白頭翁	1	F	西
2019/6/29	翠鳥	1	F	西
2019/7/12	翠翼鳩	1	F	西北

日期	物種	數量	大樓代號	牆面方位
2019/7/31	翠鳥	1	B	東
2019/8/1	白頭翁	1	B	西
2019/9/2	白頭翁	1	C	西
2019/9/22	北蝗鶯	1	F	西
2019/10/23	黃嘴角鴉	1	G	東
2019/10/27	五色鳥	1	A	西
2019/10/27	白頭翁	1	A	西
2019/10/27	白頭翁	1	A	西
2019/11/20	翠翼鳩	1	D	東
2019/12/2	白腹鸛	1	F	北
2019/12/2	白腹鸛	1	G	東北
2019/12/03	白腹鸛	1	F	北
2020/2/23	白頭翁	1	C	西北
2020/3/20	白腹鸛	1	C	東南
2020/4/26	白頭翁	1	C	東南
2020/6/9	翠鳥	1	A	西
2020/6/10	翠鳥	1	A	西
2020/6/29	翠鳥	1	C	東南
2020/6/30	斑文鳥	1	F	東
2020/7/18	翠鳥	1	A	東
2020/7/20	斑文鳥	1	F	西
2020/7/21	家八哥	1	A	東
2020/8/23	斑文鳥	1	F	西
2020/9/3	野鴿	1	G	東北
2020/9/7	白頭翁	1	C	西
2020/9/7	斑文鳥	1	F	西南
2020/9/10	松雀鷹	1	B	西南
2020/9/22	綠繡眼	1	E	南
2020/9/26	極北柳鶯	1	B	東北
2020/9/30	極北柳鶯	1	D	北
2020/10/4	翠鳥	1	C	西
2020/10/10	翠鳥	1	F	西
2020/10/22	灰鵲鴿	1	C	西
2020/10/30	翠翼鳩	1	C	西

4.1.2 哺乳類

表 4.1-5 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 哺乳類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
哺乳類	2020/9/21	09:00-12:00	日間哺乳類調查	沿線痕跡調查法、小獸類鼠籠誘捕法、蝙蝠超音波偵測器錄音法	國家生技研究園區(A區)、生態研究區(B區)、202兵工廠區(C區)	2 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			2 人
	2020/9/22	09:00-12:00	日間哺乳類調查			2 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			2 人
	2020/9/23	09:00-12:00	日間哺乳類調查			2 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			2 人
	2020/9/24	09:00-12:00	日間哺乳類調查			2 人
	2020/12/1-2 (電池記憶卡更換) 2020/9/1-2020/11/30 (相機工作時間)		紅外線相機陷阱調查法	紅外線相機陷阱調查		2 人

4.1.2.1 本季調查成果分析

● 物種組成與數量

哺乳類動物以相機陷阱調查法為主要調查方法，並輔以沿線痕跡調查、蝙蝠超音波偵測器錄音法及小獸類鼠籠誘捕法等方法以完善物種名錄，本季調查時間如表 1，線痕跡調查法於 2020/9/21-24 進行全區穿越線調查與穿越線蝙蝠超音波偵測器錄音取樣，2020/9/21-24 設置 Sherman's 陷阱及總抓雙門陷阱 (圖 4.1-15)，進行 4 天 3 夜小獸類鼠籠誘捕取樣，以上 3 種方法均累積 3 重複；相機電池、記憶卡更換日期詳見表 4.1-5。

本案自動相機架設樣點接續前案進行監測，其中 13 個樣點為延續施工中 1 至 20 季的樣點，並額外新增 11 台自動相機，共計架設 24 台自動相機 (圖 2.5-1)。為求資料之完整性，此部分以全部 24 台相機進行物種名錄討論。本季全區歷年架設之 12 臺相機總工作時數為 24770.87 小時，各樣點工作時數平均為 2064.24 小時，最短工作時數為 C04 相機的 1176.37 小時，最長工作時數為 2184 小時。本季全區 24 臺相機總工作時數為 48975 小時，各樣點工作時數平均為 2040.63 小時，最短工作時數為 A12 相機的 180.17 小時，最長工作時數為 2184 小時。

綜合 4 種不同方法，本季共調查到哺乳動物 12 科 18 種 (不含未鑑定之動物，詳見表 4.1-6)，包括原生哺乳動物及家犬與家貓等 2 種外來引進種。

比較本季不同調查方法所記錄之物種數量：相機陷阱調查法共調查到哺乳動物 9 科 12 種 (不包含人及未鑑定物種)；沿線調查法記錄有 4 科 5 種，其中目擊或聽聞 1 科 2 種 10 隻次，為大赤鼯鼠 8 隻次與赤腹松鼠 2 隻次；哺乳類痕跡記錄 3 科 3 種，共計 6 筆；陷阱捕捉法無捕捉到哺乳類動物；蝙蝠超音波偵測器錄音記錄到翼手目動物 3 科 6 種及一類僅能辨識至鼠耳蝠屬之類群，為葉鼻蝠科的臺灣葉鼻蝠、蹄鼻蝠科的臺灣小蹄鼻蝠及蝙蝠科的東亞家蝠、東亞褶翅蝠、高頭

蝠、赤黑鼠耳蝠及鼠耳蝠屬。

- **保育類**

本季共記錄有保育類哺乳動物 3 種，包括 II 級保育類珍貴稀有之██████、麝香貓，與 III 級保育類其他應予保育之食蟹獐 (圖 4.1-16、圖 4.1-17、圖 4.1-18)。

- **特有種**

本季共記錄有 2 種特有種哺乳類動物，分別為臺灣小蹄鼻蝠及臺灣次鼠；特有亞種 8 種，分別為鼬獾、白鼻心、麝香貓、臺灣葉鼻蝠、██████、山羌、赤腹松鼠、大赤鼯鼠。

- **外來種**

本季共記錄外來種 2 種，為家犬與家貓，皆為全區分布(圖 4.1-19、圖 4.1-20)。

- **空間分布、棲地利用**

本季共記錄哺乳類 12 科 18 種 (不含未鑑定之物種，表 4.1-6)，其中國家生技園區 (A 區) 11 科 16 種、202 兵工廠區 (B 區及 C 區) 12 科 16 種。鼬獾、白鼻心、麝香貓、食蟹獐、臺灣葉鼻蝠、臺灣小蹄鼻蝠、赤黑鼠耳蝠、東亞家蝠、山羌、臺灣刺鼠、赤腹松鼠、大赤鼯鼠及外來種犬、貓在全區皆有紀錄；東亞褶翅蝠及高頭蝠僅於 A 區有錄音紀錄；██████及小黃腹鼠僅 202 兵工廠區有紀錄。

4.1.2.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

哺乳類調查至今全區共累計 17 科 32 種，A 區共累計 28 種 (圖 4.1-21)。山羌自 2017 年夏季起於 C 區首次記錄，2018 年秋季於 B 區首次記錄。營運期起於 2019 年春季在 B、C 兩區皆有影像紀錄，本季更是全區皆有影像紀錄 (表 4.4-3)。食蟹獐於 2017 年秋季在 B 區首次記錄 2 隻個體，本季於全區皆有紀錄 (表 4.4-3)。

- **整體趨勢分析**

物種、數量與上季 (夏季) 相比，全區與 A 區皆差異不大。與去年同季相比，全區與 A 區種類數量增多，以長時間尺度而言，整體趨勢呈穩定且略為上升現象 (圖 4.1-22)。

- **指標變化分析**

本季全區與 A 區族群指標相較去年來說，皆有上升；與施工前 2013 指標年相比，全區及 A 區指標值均上升。在相似度分析上，本季全區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 78.79 及 50.00；本季 A 區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 64.29 及 19.05。物種組成與去年差異不大，主要差異為本季調查到較多的蝙蝠物種。造成與 2013 年物種組成相比差異的原因，可能為近年山羌、食蟹獐、白鼻心與麝香貓的加入，以及調查到較多種蝙蝠物種所影響。整體而言，單以秋季進行檢視，物種數有上升的趨勢，但仍需要更長期的監測才能下定論 (圖 4.1-23)。

4.1.2.3 結論建議事項

本案規劃了生態保留區及生態研究區，提供哺乳動物在施工期間的避難棲所，

減緩了施工對牠們的影響。而施工對空中覓食的蝙蝠類影響不大，但生態滯洪池南側道路旁的軍方廢棄煙道洞穴，為臺灣大蹄鼻蝠或臺灣葉鼻蝠的棲所，在圍籬拆除後的現階段應該適度管制，非必要不要進入洞穴，以避免干擾。

■■■■。




圖 4.1-15 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 小獸類鼠籠捕捉陷阱籠位圖

圖 4.1-16 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育哺乳類- 分布圖




圖 4.1-17 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 II 級保育哺乳類-麝香貓分布圖




圖 4.1-18 營營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之 III 級保育哺乳類-食蟹獾分布圖



圖 4.1-19 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種哺乳類-家犬分布圖




圖 4.1-20 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種哺乳類-家貓分布圖




圖 4.1-21 2008-2020 年各季哺乳類累計物種數




圖 4.1-22 2008-2020 年各季哺乳類記錄物種數




圖 4.1-23 2012-2020 年哺乳類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-6 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區哺乳類物種與數量

目	科	中文名	保育類	特有性	營運中第 8 季 (秋 2020/9-11)	
					A 區	全區
食肉目	犬科	家犬		@	V	V
食肉目	貓科	家貓		@	V	V
食肉目	貂科	鼬獾		○	V/掘痕 1	V/掘痕 4
食肉目	靈貓科	白鼻心		○	V	V/掘痕 1
食肉目	靈貓科	麝香貓	II	○	V	V
食肉目	獾科	食蟹獾	III		V	V
翼手目	葉鼻蝠科	臺灣葉鼻蝠		○	※	※
翼手目	蹄鼻蝠科	臺灣大蹄鼻蝠		◎		
翼手目	蹄鼻蝠科	臺灣小蹄鼻蝠		◎	※	※
翼手目	蝙蝠科	堀川氏棕蝠		○		
翼手目	蝙蝠科	東亞褶翅蝠			※	※
翼手目	蝙蝠科	臺灣管鼻蝠		◎		
翼手目	蝙蝠科	管鼻蝠屬				
翼手目	蝙蝠科	鼠耳蝠屬			※	※
翼手目	蝙蝠科	長趾鼠耳蝠		◎		
翼手目	蝙蝠科	長尾鼠耳蝠				
翼手目	蝙蝠科	赤黑鼠耳蝠			※	※
翼手目	蝙蝠科	絨山蝠				
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠			※	※
翼手目	蝙蝠科	家蝠屬				
翼手目	蝙蝠科	高頭蝠			※	※
翼手目	游離尾蝠科	東亞游離尾蝠				
鼯形目	尖鼠科	小麝鼯		○		
鼯形目	尖鼠科	臺灣灰麝鼯		◎		
鼯形目	尖鼠科	麝鼯屬				
鼯形目	尖鼠科	臭鼯				
鼯形目	鼯鼠科	臺灣鼯鼠		○		
兔形目	兔科	臺灣野兔		○		
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	II	○		V/掘痕 1
靈長目	獼猴科	臺灣獼猴		◎		
偶蹄目	鹿科	山羌		○	V	V
嚙齒目	鼠科	臺灣刺鼠		◎	V	V
嚙齒目	鼠科					
嚙齒目	鼠科	小黃腹鼠				V
嚙齒目	松鼠科	赤腹松鼠		○	V/1	V/2
嚙齒目	松鼠科	大赤鼯鼠		○	4	V/8
目數					4	5
科數					11	12
種數					16	18
隻數					5	10
痕跡筆數					1	6

註：特有性：◎臺灣特有種、○臺灣特有亞種、@外來引進種；

保育類：I - 瀕臨絕種保育類野生動物、II - 珍貴稀有保育類野生動物、III - 一般保育類野生動物；

樣區：A 區 - 國家生技研究園區、B 區 - 生態研究區、C 區 - 其餘位於 202 兵工廠調查範圍；

V：自動相機記錄、※：超音波偵測記錄、#：捕獲；

營運中自動相機陷阱共 24 台：A 區 6 台、B 區 4 台、C 區 14 台

4.1.3 兩棲類

表 4.1-7 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 兩棲類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
兩 棲 類	2020/9/21	09:00-15:00	日間兩棲類調查	兩棲類沿線調查法、 鳴叫等級計數法、導 板集井式陷阱	國家生技研究園區 (A 區)、 生態研究區 (B 區)、202 兵 工廠區 (C 區)	3 人
		18:30-21:30	夜間兩棲類調查			
	2020/9/22	09:00-15:00	日間兩棲類調查			3 人
		18:30-21:30	夜間兩棲類調查			
	2020/9/23	09:00-15:00	日間兩棲類調查			3 人
		18:30-21:30	夜間兩棲類調查			

4.1.3.1 本季調查成果分析

● 物種組成與數量

本季兩棲類調查於 2020/9/21-24 共進行了早晚之全區沿線目視遇測法、鳴叫等級計數法及導板集井式陷阱調查法，其中導板集井式陷阱調查法於 2020/9/24 巡視完後撤收陷阱，調查工作日期詳表 4.1-7。

3 種調查方法共記錄兩棲類 1 目 5 科 9 種 (表 4.1-8)。其中，目視遇測法記錄 1 目 4 科 6 種；鳴叫等級計數法記錄 1 目 4 科 7 種；導板集井式陷阱無記錄物種。

● 保育類

本季兩棲類調查無記錄保育類物種。

● 特有種

本季調查有特有種有面天樹蛙、斯文豪氏赤蛙及盤古蟾蜍 3 種。面天樹蛙體色會隨環境變成淡褐色或深褐色，兩眼間有深色橫帶，背部有一個 X 或 H 型的深色斑，雄蛙常爬在小草上面或者躲在樹林底層或土堆中鳴叫；斯文豪氏赤蛙棲息於溪澗中，白天躲在石縫或溪邊草叢裡，晚上則出現在水邊草叢或石頭上；盤古蟾蜍鼓膜顯著，耳後腺長橢圓形，經常出現在陸地較開闊的地方，例如闊葉林、草地、開墾地及步道上，繁殖期會遷移到溪流或靜水池。

● 外來種

本季調查有外來種斑腿樹蛙 (圖 4.1-24)，偏好利用蓄水池、水桶進行繁殖，晚上常常端坐在蓄水的水桶上、藏身在水域旁的草叢裡，或躲在樹上的葉叢中或樹幹上。本季本團隊及院方生態志工可樂蛙團隊 (不含中研院志工移除數據) 共移除 78 隻斑腿樹蛙 (雄蛙 37 隻、雌蛙 12 隻、幼蛙 17 隻、未記錄性別 12 隻)，自施工中第 14 季開始進行斑腿樹蛙移除作業起，2017 年春季至 2020 年秋季累計共移除斑腿樹蛙 589 隻成蛙 (113 隻雌蛙、369 隻雄蛙、未知性別 86 隻)、幼蛙 137 隻，卵泡 19 團。

● 優勢種

目視遇測法調查隻次百分比 $\geq 5\%$ 之優勢種依序為斑腿樹蛙 (41.38%)、澤蛙

(27.59%)、黑眶蟾蜍 (17.24%) 及面天樹蛙 (6.90%)。

鳴叫等級計數法本季國家生技園區全區以小雨蛙 (2.00 ± 0) 為最高，面天樹蛙 (1.94 ± 0.57) 次之，黑眶蟾蜍 (1.67 ± 0.58) 及腹斑蛙 (1.53 ± 0.51) 也不低，其他蛙類及其他區域鳴叫等級詳見附表。

- **空間分布、棲地利用**

本季綜合 3 種調查方法共記錄 1 目 5 科 9 種兩棲類：國家生技研究園區 5 科 7 種，生態研究區 4 科 6 種，202 兵工廠區 4 科 7 種，三區均有記錄的蛙種有澤蛙、腹斑蛙、面天樹蛙、班腿樹蛙及黑框蟾蜍等 5 種；福建大頭蛙、斯文豪氏赤蛙及盤古蟾蜍僅在 B 區有記錄；拉都希氏赤蛙僅在 C 區有記錄；小雨蛙及盤古蟾蜍僅在 A 區有記錄；斯文豪氏赤蛙在 B、C 區有記錄。

4.1.3.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

兩棲類調查全區歷年共累積 6 科 19 種，A 區共累積 6 科 18 種(圖 4.1-25)；本季所調查到之所有物種，歷年調查皆有記錄過，無新增物種。

- **整體趨勢分析**

與上季夏季相比，全區物種數略為下降，A 區不變，這可能是因為溫度下降等季節性變化，以及不同種蛙類之生殖季節不同有關；與去年同季相比，全區及 A 區都略為下降，這則可能與調查當時的環境氣候及棲所干擾有關，但整體而言，趨勢呈穩定的現象 (圖 4.1-26)。

- **指標變化分析**

因兩棲類調查鳴叫指數為一級距等級，並非實際數量，因此多樣性及均勻度指數只取目視遇測法及陷阱等實際數量進行估算。本季全區多樣性指數為 0.63，均勻度指數為 0.80；A 區多樣性指數為 0.64，均勻度指數為 0.91(表 4.1-8)。上述指數分析，不管是全區還是 A 區，多樣性指數均不高，顯示此區域兩棲類物種不算豐富；均勻度指數中等偏高，則顯示本區域物種分布算平均，沒有優勢物種產生。

在相似度分析上，本季全區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 80.0 及 66.7；本季 A 區與去年同季及 2013 指標年夏季相比，相似度為 66.7 與 50.0 (圖 4.1-27)，造成差異的原因可能為兩棲類種類不算多，因此差一種數值差異就很大；另外，本季所調查之物種數與過去相比差異不大，雖物種組成有所差異，然而本季物種符合過去該地所調查到之物種組成，且屬於本季或全年繁殖之蛙種多數有記錄到，本季數量不少之腹斑蛙在 2013 指標年未記錄，因此是否為環境棲地或是物種活動模式的改變，還需要更長期的監測才能下定論。

4.1.3.3 結論建議事項

本季營運中第 8 季調查為秋季，屬於秋季或全年繁殖之蛙種在本季多數有記錄到，臺北樹蛙樹蛙在本季尚未有記錄。營運前期環境變動極大、可能影響兩棲類生存的 A 區臺北樹蛙復育區已有改善，水池水量趨於穩定，本季調查此區域蛙種及數

量均不少。此外，在臺北樹蛙復育區有大量的外來種美國螯蝦，此物種雜食性且兇猛，會挖掘洞穴，平時生活於水域中，可能對臺北樹蛙及其他共域蛙種造成影響。本團隊於 108 年 5 月至 109 年 2 月每月進行美國螯蝦的移除作業，發現成體美國螯蝦數量有減少趨勢，但這些是否為主要影響原因，抑或是其他環境因素影響，還需持續監測並視後續移除成果一段時間後方可下定論，但就本團隊美國螯蝦移除成效，以及清淤工程完成後之成果來看，2019 年冬季調查臺北樹蛙數量有回來，也有一定的數量，在本季調查此區域蛙種及數量均不少。另外，本團隊也在臺北樹蛙復育區架設錄音機，每月份全天候進行錄音監測，以便釐清臺北樹蛙以及其他共域蛙種在本區的生存情形。

本季外來入侵種斑腿樹蛙不管是調查期間的移除紀錄，或是志工團隊的移除數量都有增加，分佈範圍也有擴散的趨勢，需擬定提出更有效率的控制方法（懇請軍方長官們協助移除 202 兵工廠區），或是設置誘捕陷阱捕捉，並持續控制監測斑腿樹蛙在本區域的情形。




圖 4.1-24 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種兩棲類-斑腿樹蛙分布圖




圖 4.1-25 2008-2020 年各季兩棲類累計物種數




圖 4.1-26 2008-2020 年各季兩棲類記錄物種數




圖 4.1-27 2012-2020 年兩棲類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-8 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區兩棲類物種與數量

目	科	中文名	學名	特有性	保育類	營運中監測第 8 季 (2020 年秋季)														
						目視遇測法				集井導板式陷阱法				百分比	鳴叫計數法				綜合方法	
															A 區	B 區	C 區	全區	A 區	B 區
無尾目	蟾蜍科	盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	E		1			1					3.45%					●	●
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>			4	1		5					17.24%	I		II	II	●	●
無尾目	樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>																	
無尾目	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>												II			II	●	●
無尾目	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>														II	II		●
無尾目	赤蛙科	腹斑蛙	<i>Babina adenopleura</i>				1		1					3.45%	II	II	II	II	●	●
無尾目	赤蛙科	斯文豪氏赤蛙	<i>Odorrana swinhoana</i>	E												II	II	II		●
無尾目	赤蛙科	長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>	E																
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana quentheri</i>																	
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>			2	4	2	8					27.59%					●	●
無尾目	叉舌蛙科	虎皮蛙	<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>																	
無尾目	叉舌蛙科	福建大頭蛙	<i>Limnonectes fujianensis</i>																	
無尾目	樹蛙科	日本樹蛙	<i>Buergeria japonica</i>																	
無尾目	樹蛙科	褐樹蛙	<i>Buergeria robusta</i>	E																
無尾目	樹蛙科	艾氏樹蛙	<i>Kurixalus eiffingeri</i>																	
無尾目	樹蛙科	面天樹蛙	<i>Kurixalus idiootocus</i>	E		2			2					6.90%	II	II	II	II	●	●
無尾目	樹蛙科	布氏樹蛙	<i>Polypedates braueri</i>																	
無尾目	樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	@		1	5	6	12					41.38%	II	II	I	II	●	●
無尾目	樹蛙科	臺北樹蛙	<i>Rhacophorus taipeianus</i>	E	III															
科數						3	4	2	4	0	0	0	0		4	2	3	4	5	5
屬數						5	4	2	6	0	0	0	0		5	4	6	7	7	9
種數						5	4	2	6	0	0	0	0		5	4	6	7	7	9
隻數						10	11	8	29	0	0	0	0							
多樣性						0.64	0.50	0.24	0.63											
均勻度						0.91	0.84	0.81	0.80											

特有性：◎臺灣特有種○臺灣特有亞種@外來種； 保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍

鳴叫計數法 (等級)：1=單一雄性鳴叫；2=2-5 隻雄性聚集鳴叫；3=6-10 隻雄性聚集鳴叫；4=超過 10 隻雄性聚集鳴叫；AT 表示鳴叫記錄

全季鳴叫等級統計為取該物種各分區各次調查平均鳴叫等級之最大值

表 4.1-9 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各區兩棲鳴叫計數法記錄物種與相對豐富度

目	科	中文名	學名	特有性	保育類	營運中監測第 8 季 (2020 年秋季)			
						鳴叫計數法等級 (mean ± SD)			
						A 區	B 區	C 區	全區
無尾目	蟾蜍科	盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	E					
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>			1.00		2.00±0.00	1.67±0.58
無尾目	樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>						
無尾目	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>			2.00±0.00			2.00±0.00
無尾目	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>					3.00	3.00
無尾目	赤蛙科	腹斑蛙	<i>Babina adenopleura</i>			1.85±0.38	1.42±0.51	1.31±0.48	1.53±0.51
無尾目	赤蛙科	斯文豪氏赤蛙	<i>Odorrana swinhoana</i>	E			1.38±0.52	1.50±0.71	1.40±0.52
無尾目	赤蛙科	長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>	E					
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>						
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>						
無尾目	叉舌蛙科	虎皮蛙	<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>						
無尾目	叉舌蛙科	福建大頭蛙	<i>Limnonectes fujianensis</i>						
無尾目	樹蛙科	日本樹蛙	<i>Buergeria japonica</i>						
無尾目	樹蛙科	褐樹蛙	<i>Buergeria robusta</i>	E					
無尾目	樹蛙科	艾氏樹蛙	<i>Kurixalus eiffingeri</i>						
無尾目	樹蛙科	面天樹蛙	<i>Kurixalus idiootocus</i>	E		1.71±0.49	1.67±0.50	2.20±0.56	1.94±0.57
無尾目	樹蛙科	布氏樹蛙	<i>Polypedates braueri</i>						
無尾目	樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	@		1.50±0.53	1.50±0.71	1.00	1.46±0.52
無尾目	樹蛙科	臺北樹蛙	<i>Rhacophorus taipeianus</i>	E	III				
科數						4	2	3	4
屬數						5	4	6	7
種數						5	4	6	7

特有性：◎臺灣特有種○臺灣特有亞種@外來種； 保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍

鳴叫計數法 (等級)：1=單一雄性鳴叫；2=2-5 隻雄性聚集鳴叫；3=6-10 隻雄性聚集鳴叫；4=超過 10 隻雄性聚集鳴叫；AT 表示鳴叫記錄

全季鳴叫等級統計為取該物種各分區各次調查平均鳴叫等級之最大值

4.1.4 爬蟲類

表 4.1-10 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 爬蟲類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
爬蟲類	2020/9/21	09:00-15:00	日間爬蟲類調查	爬蟲類沿線調查法、導板集井式陷阱、龜類松鼠籠	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區 (C 區)	3 人
		18:30-21:30	夜間爬蟲類調查			
	2020/9/22	09:00-15:00	日間爬蟲類調查			3 人
		18:30-21:30	夜間爬蟲類調查			
	2020/9/23	09:00-15:00	日間爬蟲類調查			3 人
		18:30-21:30	夜間爬蟲類調查			

4.1.4.1 本季調查成果分析

• 物種組成與數量

本季爬蟲類調查於 2020/9/21-24 共進行了早晚之全區沿線目視遇測法、導板集井式陷阱及龜類松鼠籠調查法，其中導板集井式陷阱及龜類松鼠籠調查法於 2020/9/24 巡視完後撤收陷阱，調查工作日期詳見表 4.1-10。

3 種調查方法共記錄爬蟲類 2 目 6 科 11 種 62 隻次，名錄及調查隻次詳見表 4.1-11。其中，目視遇測法記錄 1 目 5 科 10 種 59 隻次；導板集井式陷阱無捕獲記錄；龜類松鼠籠調查法記錄 1 目 1 科 1 種 3 隻次。本季園方志工南港可樂蛙記錄蛇類 2 科 2 種 2 隻次，為雨傘節及龜殼花。

• 保育類

本季調查記錄有 1 種保育類爬蟲類 (圖 4.1-31)，██████特有種

本季記錄有 3 種特有種爬蟲類，分別為斯文豪氏攀蜥、蓬萊草蜥及臺灣滑蜥。其中斯文豪氏攀蜥及蓬萊草蜥全區皆有記錄，臺灣滑蜥在 A、B 區有記錄。

• 外來種

本季爬蟲類無記錄外來物種。

• 優勢種

調查隻次百分比 $\geq 5\%$ 之優勢種依序為斯文豪氏攀蜥 (40.32%)、鉛山壁虎 (11.29%)、古氏草蜥 (9.68%)、臺灣滑蜥 (8.06%) 及蓬萊草蜥 (8.06%)。

• 空間分布、棲地利用

本季共記錄爬蟲類 2 目 6 科 11 種。其中各分區記錄爬蟲類種數 A 區 1 目 5 科 7 種，B 區 1 目 5 科 7 種，C 區 2 目 5 科 7 種，三區均有記錄的爬蟲類有斯文豪氏攀蜥、古氏草蜥及蓬萊草蜥 3 種；印度蜓蜥僅在 A 區有記錄；白梅花蛇及茶斑蛇僅在 B 區有記錄；██████；臺灣滑蜥僅在 A、B 區有記錄；大頭蛇及鉛山壁虎僅在 A、C 區有記錄；無疣蝟虎僅在 B、C 區有記錄。

4.1.4.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

爬蟲類調查全區共累計 11 科 34 種，A 區共累積 9 科 27 種，無新增物種 (圖 4.1-28)。

- **整體趨勢分析**

。

- **指標變化分析**

本季全區多樣性指數為 0.81，均勻度指數為 0.81；A 區多樣性指數為 0.74，均勻度指數為 0.87。上述指數分析，不管是全區還是 A 區，多樣性指數均不高，顯示此區域爬蟲類物種不算豐富；均勻度指數中等偏高，則顯示本區域物種分布算平均，沒有優勢物種產生。本季多樣性指數略高於上季，是因為蛇類物種增加。

在相似度分析上，本季全區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 70.00 及 66.67；本季 A 區與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 54.54 與 72.72 (圖 4.1-30)。不管是全區還是 A 區與過去相比，所記錄之物種組成相似，而相似度造成差異的原因可能為爬蟲類種類不算多，且記錄到的數量也少量，因此差一種數值差異就很大，加上每季蛇類偵測度不同，若想確認本區域之情形，則還需要更長期的監測才能下定論。

4.1.4.3 結論建議事項

全區歷年共計 11 科 34 種，其中以蜥蜴類記錄隻數最多，蛇類各季記錄差異明顯，數量亦不多。爬蟲類以春、夏兩季記錄種類與數量較多，秋季次之，冬季最少。目前是營運中第 8 季調查，若想確認爬蟲類群的種類及數量變化趨勢，尚需持續監測後，方可下定論。目前園區建設多已完工，建議應確實進行後續植栽養護及外來物種移除與控制作業，以提供更完善的棲息環境供爬蟲類使用。




圖 4.1-28 2008-2020 年各季爬蟲類累計物種數




圖 4.1-29 2008-2020 年各季爬蟲類記錄物種數




圖 4.1-30 2012-2020 年爬蟲類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-11 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區爬蟲類物種與數量

目	科	中文名	學名	特有性	保育類	營運中監測第 5 季 (2020 年冬季)														
						目視遇測法				導板集井式陷阱				松鼠籠/相機陷阱				綜合方法		百分比
						A 區	B 區	C 區	全區	A 區	B 區	C 區	全區	A 區	B 區	C 區	全區	A 區	全區	
龜鱉目	鱉科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>																	
龜鱉目	地龜科				I															
龜鱉目	地龜科				I									3	3		●	4.84%		
龜鱉目	地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>																	
龜鱉目	澤龜科	紅耳龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>	@																
有鱗目	飛蜥科	黃口攀蜥	<i>Diploderma polygonatum xanthostomum</i>	Es																
有鱗目	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Diploderma swinhonis</i>	E		10	9	6	25							●	●	40.32%		
有鱗目	壁虎科	鉛山壁虎	<i>Gekko hokouensis</i>			6		1	7							●	●	11.29%		
有鱗目	壁虎科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>				1	3	4								●	6.45%		
有鱗目	正蜥科	臺灣草蜥	<i>Takydromus formosanus</i>	E																
有鱗目	正蜥科	古氏草蜥	<i>Takydromus kuehnei</i>			3	2	1	6							●	●	9.68%		
有鱗目	正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	E		3	1	1	5							●	●	8.06%		
有鱗目	石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	<i>Plestiodon chinensis formosensis</i>	Es																
有鱗目	石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>																	
有鱗目	石龍子科	臺灣滑蜥	<i>Scincella formosensis</i>	E		1	4		5							●	●	8.06%		
有鱗目	石龍子科	印度蜓蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>			2			2							●	●	3.23%		
有鱗目	盲蛇科	鉤盲蛇	<i>Ramphotyphlops braminus</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	梭德氏游蛇	<i>Hebius sauteri</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	大頭蛇	<i>Boiga kraepelini</i>			2		1	3							●	●	4.84%		
有鱗目	黃領蛇科	青蛇	<i>Cyclophiops major</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	白梅花蛇	<i>Lycodon ruhstrati</i>				1		1								●	1.61%		
有鱗目	黃領蛇科	赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	紅竹蛇	<i>Oreocryptophis porphyraceus kawakamii</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	茶斑蛇	<i>Psammodynastes pulverulentus</i>				1		1								●	1.61%		
有鱗目	黃領蛇科	南蛇	<i>Ptyas mucosus</i>																	
有鱗目	黃領蛇科	草花蛇	<i>Xenochrophis flavipunctatus</i>		III															
有鱗目	鈍頭蛇科	臺灣鈍頭蛇	<i>Pareas formosensis</i>	E																
有鱗目	鈍頭蛇科	泰雅鈍頭蛇	<i>Pareas atayal</i>	E																

有鱗目	蝙蝠蛇科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>																
有鱗目	蝙蝠蛇科	環紋赤蛇	<i>Sinomicrurus maclellandi swinhoei</i>	Es	III														
有鱗目	蝮蛇科	龜殼花	<i>Protobothrops mucrosquamatus</i>																
有鱗目	蝮蛇科	赤尾青竹絲	<i>Trimeresurus stejnegeri</i>																
科數						5	5	4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6
屬數						6	6	5	9	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10
種數						7	7	6	10	0	0	0	0	0	0	1	1	7	11
隻數						27	19	13	59	0	0	0	0	0	0	3	3	27	62
多樣性						0.74	0.67	0.64	0.81										
均勻度						0.87	0.79	0.83	0.81										

特有性：◎臺灣特有種○臺灣特有亞種@外來種； 保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍； 施工前：國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫、環說書：國家生技研究園區環境影響評估說明書

鼠籠及松鼠籠陷阱為原生種龜類及小獸類調查用陷阱，若捕捉到其他兩棲爬蟲類亦列入數量統計；*表示相機、陷阱影像記錄；#表示院方生態志工團隊提供之記錄。

4.1.5 ██████████

表 4.1-12 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) ██████████ 調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
	2020/9/21	09:30-12:00	██████	松鼠籠陷阱捕捉法、沿線調查法	國家生技園區(A區)、生態研究區(B區)、202 兵工廠區 (C 區)	3 人
	2020/9/22	09:30-12:00	██████			3 人
	2020/9/23	09:30-12:00	██████			3 人
	2020/9/24	09:30-12:00	██████			3 人

4.1.5.1 本季調查成果分析

██████。

4.1.5.2 歷年比較分析

██████。

4.1.5.3 結論建議事項

██████。

██████。

██████。

██████。

圖 4.1-31 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) ■■■■發現位置圖

表 4.1-13 施工中第 13-18、營運中第 1-8 季

表 4.1-14 施工中第 14-20、營運中第 1-8 季

4.1.6 蝶類

表 4.1-15 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 蝶類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
蝶類	2020/09/21	09:47-15:45	蝶類調查	沿線調查法、網捕法、 吊網陷阱	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠 區 (C 區)	1 人
	2020/09/23	09:00-12:00	蝶類調查			1 人
	2020/10/15	09:00-12:00	蝶類調查			1 人
	2020/10/26	14:02-15:22	蝶類調查			1 人
	2020/11/25	08:45-15:30	蝶類調查			1 人

4.1.6.1 本季調查成果分析

- **物種組成與數量**

本季蝶類調查之日期與時間如表 4.1-15 所示。全區所有方法共記錄 5 科 67 種 690 隻，取三次重覆最大值，總數為 465 隻，其中吊網法 1 科 7 種 55 隻。詳細物種組成與數量見表 4.1-16。

- **保育類**

本季蝶類調查未記錄到保育類物種。

- **特有種**

本季台灣特有種大黑星弄蝶、埔里三線蝶及大波紋蛇目蝶 3 種；台灣特有亞種有埔里波紋小灰蝶等 34 種，詳細名錄與數量見表 4.1-16。

- **外來種**

本季調查有外來種鳳眼方環蝶及尖翅翠蛺蝶，鳳眼方環蝶棲息在竹林或有竹類植物生長的闊葉林，幼蟲取食竹類植物葉片；尖翅翠蛺蝶多在芒果樹附近活動，雄蝶喜於近地表飛行，雌蝶常高踞於枝頭盤桓，抑或於樹葉間活動，甚少出沒於空曠地帶。

尖翅翠蛺蝶為近年新出現於台灣的外來種，此物種原分布於南亞及中國華南地區，2019 年 10 月首次在基隆被記錄到，隨後在大台北各地陸續出現。今年於 2020 年 5 月中曾有園區生態委員目擊尖翅翠蛺蝶；本季在進行穿越線調查時並未目擊成蝶，但在生技園區設置吊網陷阱捕獲雌蝶，顯示目前可能已經在園區建立繁殖族群，成蝶的活動習性使其不易目擊，未來必須持續監測並留意。

- **優勢種**

以總數 5% 以上為優勢種，計有臺灣黃蝶 (9.89%)、永澤黃斑蔭蝶 (9.68%)、白波紋小灰蝶 (8.17%)、琉璃波紋小灰蝶 (5.38%)、臺灣黑星小灰蝶 (5.16%) 等 5 種，所佔比例均不甚高。

- **空間分布、棲地利用**

A 區共計 5 科 50 種 170 隻，吊網法 1 科 4 種 13 隻；B 區記錄 5 科 20 種 59 隻，吊網法 1 科 6 種 36 隻；C 區記錄 5 科 45 種 236 隻，吊網法 1 科 2 種 6 隻。

4.1.6.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

全區共累積 5 科 142 種，A 區共累積 5 科 131 種 (圖 4.1-32)。本季 A 區新增尖翅翠蛺蝶及紋黃蝶 2 種，尖翅翠蛺蝶為多世代蝶種，成蝶不吸食花蜜，喜腐果、排遺和樹液等，幼蟲取食芒果樹的成熟老葉。紋黃蝶棲息在草原性環境，飛行活潑快速，好訪花。幼蟲取食豆科之菽草、天藍苜蓿等豆科植物。紋黃蝶於北部最容易觀察的季節為東北季風開始之初的秋季。

- **整體趨勢分析**

本季與前一季相較，物種數及數量均稍減少 (圖 4.1-33)，此為秋季時蝴蝶族群波動常見現象。往年秋季幾乎每年均有物種數較夏季稍微減少之趨勢，數量則在一些年份有較夏季增多現象，本季全區趨勢與去年趨勢符合，顯示近一兩年環境及天候未有太大改變。整體而言今年度秋季未見大幅偏離往年趨勢之情形。

- **指標變化分析**

本季 A 區歧異度指數為 1.54，均勻度指數為 0.90。歧異度及均勻度均甚高，顯示 A 區於秋季有豐富蝴蝶多樣性，優勢種不甚明顯。本季全區歧異度指數為 1.55，均勻度指數為 0.84，其中 A 區歧異度最高，均勻度各區相似。

A 區與去年同季比較，相似度為 71.56，相似度甚高。A 區與施工前 2013 年同季相比較，相似度為 49.44。A 區與去年同季相似度較施工前同季高。全區與去年同季比較，相似度為 75.65，全區與施工前 2013 年同季相比較，相似度為 64.62。A 區與全區均顯示與施工前相似度低，與去年同季相似度高，顯示近年環境變化較施工期間小。

4.1.6.3 結論建議事項

本季蝴蝶調查顯示蝶類組成與往年相似，並可能物種數在增加中。本季與過去數年秋季趨勢相似，物種數有微幅增加趨勢，數量方面也與去年相近。建議維持現行園區維護措施，不宜再擴大整理範圍，以維持昆蟲棲地不受擾動。




圖 4.1-32 2008-2020 年各季蝶類累計物種數




圖 4.1-33 2008-2020 年各季蝶類記錄物種數




圖 4.1-34 2012-2020 年蝶類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-16 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蝶類物種與數量

科	新中文名	中文名	學名	性 特 有	類 保 育	A 區	B 區	C 區	吊 網	總計	百分比
灰蝶科	大娜波灰蝶	埔里波紋小灰蝶	<i>Nacaduba kurava thersasia</i>	○		1				1	0.22
灰蝶科	折列藍灰蝶	小小灰蝶	<i>Zizina otis riukuensis</i>			5				5	1.08
灰蝶科	豆波灰蝶	波紋小灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>			1				1	0.22
灰蝶科	波灰蝶	姬波紋小灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i>	○		2		2		4	0.86
灰蝶科	玳灰蝶	恆春小灰蝶	<i>Deudorix epijarbas menesicles</i>	○				1		1	0.22
灰蝶科	淡青雅波灰蝶	白波紋小灰蝶	<i>Jamides alecto dromicus</i>	○		9	1	28		38	8.17
灰蝶科	細灰蝶	角紋小灰蝶	<i>Leptotes plinius</i>			1				1	0.22
灰蝶科	雅波灰蝶	琉璃波紋小灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>	○		7		18		25	5.38
灰蝶科	黑星灰蝶	臺灣黑星小灰蝶	<i>Megisba malaya sikkima</i>			11	2	11		24	5.16
灰蝶科	銀灰蝶	銀斑小灰蝶	<i>Curetis acuta formosana</i>	○				1		1	0.22
灰蝶科	燕灰蝶	墾丁小灰蝶	<i>Rapala varuna formosana</i>	○		4				4	0.86
灰蝶科	藍灰蝶	沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>			3		2		5	1.08
弄蝶科	台灣瑟弄蝶	大黑星弄蝶	<i>Seseria formosana</i>	◎		1	1	3		5	1.08
弄蝶科	玉帶弄蝶	玉帶弄蝶	<i>Daimio tethys moori</i>			3	1			4	0.86
弄蝶科	白斑弄蝶	狹翅弄蝶	<i>Isoteinon lamprospilus formosanus</i>			1		3		4	0.86
弄蝶科	禾弄蝶	臺灣單帶弄蝶	<i>Borbo cinnara</i>			2				2	0.43
弄蝶科	竹橙斑弄蝶	埔里紅弄蝶	<i>Telicota bambusae horisha</i>			5	1	5		11	2.37
弄蝶科	袖弄蝶	黑弄蝶	<i>Notocrypta curvifascia</i>			3	1	6		10	2.15
弄蝶科	黃斑弄蝶	臺灣黃斑弄蝶	<i>Potanthus confucius angustatus</i>	○				1		1	0.22
弄蝶科	黑星弄蝶	黑星弄蝶	<i>Suastus gremius</i>			1		2		3	0.65
弄蝶科	鐵色絨弄蝶	鐵色絨毛弄蝶	<i>Hasora badra</i>			1				1	0.22
粉蝶科	亮色黃蝶	臺灣黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>			18	2	26		46	9.89
粉蝶科	紋黃蝶	黃紋粉蝶	<i>Colias erate formosana</i>	○		1				1	0.22
粉蝶科	異色尖粉蝶	臺灣粉蝶	<i>Appias lyncida eleonora</i>					1		1	0.22
粉蝶科	遷粉蝶	銀紋淡黃蝶	<i>Catopsilia pomona</i>			1		1		2	0.43
粉蝶科	纖粉蝶	黑點粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i>	○			2			2	0.43
蛱蝶科	小紫斑蝶	小紫斑蝶	<i>Euploea tulliolus koxinga</i>	○				2		2	0.43
蛱蝶科	小環蛱蝶	小三線蝶	<i>Neptis sappho formosana</i>	○		2		5		7	1.51
蛱蝶科	切翅眉眼蝶	切翅單環蝶	<i>Mycalasis zonata</i>			3	5	4	3	12	2.58
蛱蝶科	幻蛱蝶	琉球紫蛱蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>			2		1		3	0.65
蛱蝶科	方環蝶	鳳眼方環蝶	<i>Discophora sondaica tulliana</i>	@		1	2	1	1	4	0.86
蛱蝶科	白圈帶蛱蝶	白圈三線蝶	<i>Athya asura baelia</i>	○				1		1	0.22
蛱蝶科	尖翅翠蛱蝶	尖翅翠蛱蝶	<i>Euthalia phemius</i>	@		1			1	1	0.22
蛱蝶科	曲紋黛眼蝶	雌褐蔭蝶	<i>Lethe chandica ratnacri</i>	○				2		2	0.43
蛱蝶科	豆環蛱蝶	琉球三線蝶	<i>Neptis hylas luculenta</i>			3		7		10	2.15
蛱蝶科	虎斑蝶	黑脈樺斑蝶	<i>Danaus genutia</i>			1		3		4	0.86
蛱蝶科	金斑蝶	樺斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>				2			2	0.43
蛱蝶科	長紋黛眼蝶	玉帶蔭蝶	<i>Lethe europa pavida</i>			1				1	0.22
蛱蝶科	青眼蛱蝶	孔雀青蛱蝶	<i>Junonia orithya</i>			2				2	0.43
蛱蝶科	眉眼蝶	小蛇目蝶	<i>Mycalasis francisca formosana</i>	○			3	2	3	5	1.08

科	新中文名	中文名	學名	性 特 有	類 保 育	A 區	B 區	C 區	吊 網	總計	百分比
蛱蝶科	琉璃蛱蝶	琉璃蛱蝶	<i>Kaniska canace drilon</i>	○				1		1	0.22
蛱蝶科	密紋波眼蝶	臺灣波紋蛇目蝶	<i>Ypthima multistriata</i>	○		6	1	13		20	4.30
蛱蝶科	異紋帶蛱蝶	小單帶蛱蝶	<i>Athyma selenophora laela</i>	○		1		18		19	4.09
蛱蝶科	異紋紫斑蝶	端紫斑蝶	<i>Euploea mulciber barsine</i>	○		2		3		5	1.08
蛱蝶科	眼蛱蝶	孔雀蛱蝶	<i>Junonia almana</i>			6				6	1.29
蛱蝶科	細帶環蛱蝶	臺灣三線蝶	<i>Neptis nata lutatia</i>	○				1		1	0.22
蛱蝶科	斯氏絹斑蝶	小青斑蝶	<i>Parantica swinhoei</i>	○			1			1	0.22
蛱蝶科	森林暮眼蝶	黑樹蔭蝶	<i>Melanitis phedima polishana</i>	○		1	1	1	2	3	0.65
蛱蝶科	珠蛱蝶	紅擬豹斑蝶	<i>Phalanta phalantha</i>			3				3	0.65
蛱蝶科	紫俳蛱蝶	紫單帶蛱蝶	<i>Parasarpa dudu jinamitra</i>	○		2				2	0.43
蛱蝶科	黃襟蛱蝶	臺灣黃斑蝶	<i>Cupha erymanthis</i>			5		2		7	1.51
蛱蝶科	絹斑蝶	姬小紋青斑蝶	<i>Parantica aglea maghaba</i>	○				1		1	0.22
蛱蝶科	旂斑蝶	琉球青斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>			2		1		3	0.65
蛱蝶科	網絲蛱蝶	石牆蝶	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i>	○		1		12		13	2.80
蛱蝶科	蓬萊環蛱蝶	埔里三線蝶	<i>Neptis taiwana</i>	◎		3				3	0.65
蛱蝶科	褐翅蔭眼蝶	永澤黃斑蔭蝶	<i>Neope muirheadi nagasawae</i>	○		14	25	6	39	45	9.68
蛱蝶科	藍紋鋸眼蝶	紫蛇目蝶	<i>Elymnias hypermnestra hainana</i>			4	4	8	6	16	3.44
蛱蝶科	雙色帶蛱蝶	臺灣單帶蛱蝶	<i>Athyma cama zoroastes</i>	○		1		1		2	0.43
蛱蝶科	雙標紫斑蝶	斯氏紫斑蝶	<i>Euploea sylvester swinhoei</i>	○				1		1	0.22
蛱蝶科	寶島波眼蝶	大波紋蛇目蝶	<i>Ypthima formosana</i>	◎			2			2	0.43
鳳蝶科	大鳳蝶	大鳳蝶	<i>Papilio memnon heronus</i>	○				4		4	0.86
鳳蝶科	木蘭青鳳蝶	青斑鳳蝶	<i>Graphium doson postianus</i>	○		1				1	0.22
鳳蝶科	玉帶鳳蝶	玉帶鳳蝶	<i>Papilio polytes polytes</i>			2		1		3	0.65
鳳蝶科	青鳳蝶	青帶鳳蝶	<i>Graphium sarpedon connectens</i>	○		4		5		9	1.94
鳳蝶科	琉璃翠鳳蝶	大琉璃紋鳳蝶	<i>Papilio paris nakaharai</i>	○		8	1	10		19	4.09
鳳蝶科	無尾白紋鳳蝶	無尾白紋鳳蝶	<i>Papilio castor formosanus</i>	○		1				1	0.22
鳳蝶科	黑鳳蝶	黑鳳蝶	<i>Papilio protenor protenor</i>			6	1	8		15	3.23
總計						170	59	236	55	465	100
種數						50	20	45	7	67	
歧異度						1.54	1.01	1.41	0.48	1.55	
均勻度						0.90	0.76	0.86	0.53	0.84	

特有性：◎台灣特有種○台灣特有亞種@外來種；

保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物；

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍；*吊網

4.1.7 蜻蛉類

表 4.1-17 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 蜻蛉類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
蝶類	2020/09/21	09:47-15:45	蜻蛉調查	沿線調查法、網捕法、 吊網陷阱	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠 區 (C 區)	1 人
	2020/09/23	09:00-12:00	蜻蛉調查			1 人
	2020/10/15	09:00-12:00	蜻蛉調查			1 人
	2020/10/26	14:02-15:22	蜻蛉調查			1 人
	2020/11/25	08:45-15:30	蜻蛉調查			1 人

4.1.7.1 本季調查成果分析

- **物種組成與數量**

本季蜻蛉類調查時間如表 4.1-17 所示。本季全區共記錄蜻蛉類 8 科 28 種 323 隻，取三次重覆最大值，總數為 248 隻。詳細物種組成與數量見表 4.1-18。

- **保育類**

本季調查記錄 II 級保育類無霸勾蜓 1 種。

- **特有種**

本季蜻蛉類調查記錄有特有種短腹幽蟪、白痣珈蟪、中華珈蟪、善變蜻蜓等 4 種，台灣特有亞種褐基蜻蜓 1 種，詳細物種組成與數量見表 4.1-18。

- **外來種**

本季蜻蛉類調查未記錄到外來種蜻蛉。

- **優勢種**

以總數 5% 以上為優勢種，計有杜松蜻蜓 (31.45%)、善變蜻蜓 (12.90%)、薄翅蜻蜓 (12.10%)、紫紅蜻蜓 (6.85%) 及霜白蜻蜓 (6.85%) 等 5 種。

- **空間分布、棲地利用**

本季 A 區共記錄蜻蛉類 6 科 23 種 222 隻；B 區記錄蜻蛉類 5 科 8 種 10 隻，C 區記錄 3 科 8 種 16 隻。

4.1.7.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

全區共累積 10 科 63 種，A 區共累積 10 科 49 種，本季新增 1 種褐基蜻蜓，分布於低中拔山區，棲息於池塘、沼澤等靜水域，喜歡停棲在獨立突出的枝條末端上 (圖 4.1-35)。

- **整體趨勢分析**

本季與前一季相較，物種數減少，數量增多。本季與往年秋季相較，物種數

相似而數量增多。本季於 A 區記錄到大量杜松蜻蜓，為適應力佳且數量豐富的種類。雖使均勻度降低，A 區仍有記錄到許多種類蜻蛉，使均勻度仍甚高。其他區域則呈現與往年相似趨勢。整體而言今年度秋季未見大幅偏離往年趨勢之情形，但有單一物種大量發生現象，宜針對 A 區監測其他物種數的變化。

- **指標變化分析**

本季 A 區歧異度指數為 0.98，均勻度指數為 0.72。歧異度高，顯示 A 區於秋季有豐富蜻蛉多樣性；均勻度一般，有一最優勢種。本季全區歧異度指數為 1.07，均勻度指數為 0.74，其中 A 區歧異度最高，均勻度卻最低，其他各區均勻度相似。

A 區與去年同季比較，相似度為 65.12，A 區與施工前 2013 年同季相比較，相似度為 45.16。A 區與去年同季相似度較施工前同季高。全區與去年同季比較，相似度為 71.43，全區與施工前 2013 年同季相比較，相似度為 61.22。A 區及全區均與去年同季更相似，A 區於施工前同季記錄較少蜓種，尤其有多種細蟴於施工前同季無記錄，可能反映鄰近水域植被及水生植物的變化。本季 A 區族群指數增多，全區則持平，顯示可能有些種類自他處遷入 A 區。

4.1.7.3 結論建議事項

本季蜻蛉調查顯示蜻蛉組成與往年相似，並可能物種數在增加中，種類數較去年同季更多。由於物種數可能有增加趨勢，宜再觀察未來數季趨勢。A 區於本季有一優勢種大量發生，雖仍有記錄許多物種而歧異度高，仍須持續監測其他種類的變動趨勢。建議維持主要水域的豐水狀態，並維持現行園區維護措施，不宜再擴大整理範圍，以維持昆蟲棲地不受擾動。

歷年各季蜻蛉類種類數及數量變化圖




圖 4.1-35 2008-2020 年各季蜻蛉類累計物種數

歷年各季蜻蛉類種類數及數量變化圖




圖 4.1-36 2008-2020 年各季蜻蛉類記錄物種數




圖 4.1-37 2012-2020 年蜻蛉類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.1-18 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蜻蛉類物種與數量

科	中文名	學名	保育類	特有性	營運中監測第 8 季 (秋季 2020/09-2020/11)				百分比
					A 區	B 區	C 區	總計	
幽蟪科	短腹幽蟪	<i>Euphaea formosa</i>		◎	10	2		12	4.84
珈蟪科	白痣珈蟪	<i>Matrona cyanoptera</i>		◎	1		1	2	0.81
珈蟪科	中華珈蟪	<i>Psolodesmus mandarinus mandarinus</i>		◎		2		2	0.81
細蟪科	弓背細蟪	<i>Pseudagrion pilidorsum pilidorsum</i>			2			2	0.81
細蟪科	青紋細蟪	<i>Ischnura senegalensis</i>			1			1	0.40
細蟪科	紅腹細蟪	<i>Ceriagrion auranticum ryukyuanum</i>			3			3	1.21
細蟪科	葦笛細蟪	<i>Paracercion calamorum dyeri</i>			7			7	2.82
細蟪科	昧影細蟪	<i>Ceriagrion fallax fallax</i>					6	6	2.42
琵琶蟪科	青黑琵琶蟪	<i>Coeliccia cyanomelas</i>				1		1	0.40
勾蜓科	無霸勾蜓	<i>Anotogaster klossi</i>	II			1		1	0.40
春蜓科	粗鉤春蜓	<i>Ictinogomphus rapax</i>			1			1	0.40
晏蜓科	綠胸晏蜓	<i>Anax parthenope julius</i>			7			7	2.82
蜻蛉科	大華蜻蛉	<i>Tramea virginia</i>			3	1		4	1.61
蜻蛉科	灰黑蜻蛉	<i>Orthetrum melania</i>				1	1	2	0.81
蜻蛉科	呂宋蜻蛉	<i>Orthetrum luzonicum</i>			1	1		2	0.81
蜻蛉科	杜松蜻蛉	<i>Orthetrum sabina sabina</i>			76		2	78	31.45
蜻蛉科	侏儒蜻蛉	<i>Diplacodes trivialis</i>			2			2	0.81
蜻蛉科	彩裳蜻蛉	<i>Rhyothemis variegata arria</i>			2		2	4	1.61
蜻蛉科	善變蜻蛉	<i>Neurothemis taiwanensis</i>		◎	31	1		32	12.90
蜻蛉科	猩紅蜻蛉	<i>Crocothemis servilia servilia</i>			8			8	3.23
蜻蛉科	紫紅蜻蛉	<i>Trithemis aurora</i>			16		1	17	6.85
蜻蛉科	鼎脈蜻蛉	<i>Orthetrum triangulare</i>			2			2	0.81
蜻蛉科	廣腹蜻蛉	<i>Lyriothemis elegantissima</i>			2			2	0.81
蜻蛉科	樂仙蜻蛉	<i>Trithemis festiva</i>			1			1	0.40
蜻蛉科	褐基蜻蛉	<i>Urothemis signata yiei</i>		○	1			1	0.40
蜻蛉科	褐斑蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>			1			1	0.40
蜻蛉科	薄翅蜻蛉	<i>Pantala flavescens</i>			28		2	30	12.10
蜻蛉科	霜白蜻蛉	<i>Orthetrum pruinosum neglectum</i>			16		1	17	6.85
科數					6	5	3	8	
種數					23	8	8	28	
隻數					222	10	16	248	
歧異度					0.98	0.88	0.80	1.07	
均勻度					0.72	0.97	0.89	0.74	

特有性：◎台灣特有種○台灣特有亞種@外來種；

保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物；

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍

4.1.8 螢火蟲

表 4.1-19 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 螢火蟲調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
螢火蟲	2020/9/21	18:00-20:00	螢火蟲調查	沿線調查法、 網捕法	國家生技研究園區(A區)、生態研究區(B區)、202 兵工廠區(C區)	2 人
	2020/9/22	18:00-20:00	螢火蟲調查			2 人
	2020/9/23	18:00-20:00	螢火蟲調查			2 人

4.1.8.1 本季調查成果分析

- 物種組成與數量

本季螢火蟲調查於 2020/9/21-23 晚間進行，以沿線調查法搭配網捕法，調查工作日期詳見表 4.1-19，發現螢火蟲 1 種 2 隻 (表 4.1-20)。

4.1.8.2 歷年比較分析

- 物種累積分析

螢火蟲類調查全區歷年共累積 1 科 8 種，A 區共累積 1 科 7 種 (圖 4.1-38)；本季無新增物種。

- 整體趨勢分析

本季螢火蟲呈正常季節變化趨勢，於秋季初期記錄處於發生期的黃緣螢。各年度及各季間螢火蟲種數及數量變化大，是因螢火蟲成蟲發生期短，有時調查期間未遇到發生期，此外不同季節以不同種類為優勢，且容易受環境細微變化影響。

- 指標變化分析

本季僅調查到 1 種螢火蟲，故歧異度為 0，無均勻度。

施工前 2013 年同季無記錄到螢火蟲，去年同季於 A 區亦無記錄螢火蟲。與往年同季比較，於 A 區曾記錄有黃緣螢、臺灣窗螢、山窗螢等，今年度僅記錄黃緣螢一種。

4.1.8.3 結論建議事項

A 區的螢火蟲族群不穩定，往年調查經常無螢火蟲紀錄。本季有記錄黃緣螢，顯示 A 區水域環境仍可供黃緣螢棲息，棲境復育可行，後續應盡量降低經營維護造成的擾動、持續外來種移除，並進一步落實夜間光源管制。




圖 4.1-38 2008-2020 年各季螢火蟲類累計物種數




圖 4.1-39 2008-2020 年各季螢火蟲類記錄物種數

表 4.1-20 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區螢火蟲物種與數量

科	中文名	學名	保育類	特有性	營運中監測第 8 季(冬季 2020/9-2020/11)				百分比
					A 區	B 區	C 區	總計	
螢科	黃緣螢	<i>Luciola ficta</i>			2			2	100
科數					1	0	0	1	
種數					1	0	0	1	
隻數					2	0	0	2	
歧異度					-	-	-	-	
均勻度					-	-	-	-	

特有性：◎臺灣特有種○臺灣特有亞種@外來種；

保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物 II 表珍貴稀有保育類野生動物 III 表一般保育類野生動物；

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍

4.2 水域動植物調查分析

4.2.1 魚類

表 4.2-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 魚類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查方法	地點	調查人力
魚類	2020/9/21	13:00-15:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	三重埔埤	2 人
	2020/9/22	13:40-15:00			2 人
	2020/9/23	13:15-14:40			2 人
	2020/9/24	13:20-14:00			2 人
魚類	2020/10/24	09:00-14:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	四分溪上游、四分溪 下游、滯洪池	4 人
	2020/10/25	09:00-13:00			2 人
	2020/10/26	09:00-13:00			2 人
	2020/10/27	09:00-11:10			3 人

4.2.1.1 本季調查成果分析

- 物種組成與數量

本季魚類調查分為兩個時段，三重埔埤部分於 2020/9/21-24 進行調查，四分溪及滯洪池部分調查時間為 2020/10/24-27，誘餌籠於各區首日調查時放置，並在第四日巡視完後回收，詳細工作日程列於表 4.2-1。

本季共記錄到魚類 3 目 5 科 12 種共計 777 隻次 (表 4.2-2)，四分溪上、下游分別記錄到 3 目 5 科 6 種及 2 目 4 科 5 種；滯洪池及三重埔埤則分別記錄 3 目 4 科 4 種及 3 目 4 科 7 種。

- 保育類

本季魚類調查未記錄到保育類物種。

- 特有種

本季共調查到特有種魚類 2 科 3 種，分別為鯉科的臺灣石魚賓、粗首馬口鱮及鰕虎科的明潭吻鰕虎。

- 外來種

本季魚類調查外來魚種有 2 科 4 種，分別為花鱗科的食蚊魚及劍尾魚，麗魚科的巴西珠母麗魚及尼羅口孵非鯽 (圖 4.2-1)。

- 優勢種

本季魚類調查大於 5% 之優勢種有高體鰱鰻 333 尾 (42.86%)、尼羅口孵非鯽 320 尾 (41.18%) 及粗首馬口鱮 72 尾 (9.27%)。

- 空間分布、棲地利用

本季四分溪於上游紀錄 6 種、下游紀錄 5 種，四分溪本季以外來種的尼羅口孵非鯽為主要物種，本季四分溪尼羅口孵非鯽族群依舊數量龐大，而粗首馬口鱮

數量較上季明顯下降，可能是由於繁殖季結束所導致，上下游物種分佈情形相當接近，但上游數量稍高於下游。

本季三重埔埤高體鰱鯪數量頗豐，共記錄 317 隻次，其餘物種數量相對稀少；滯洪池則是以外來種食蚊魚為主要優勢物種，且數量不高，整體狀況仍舊不佳。

4.2.1.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

魚類調查歷季共累積 10 科 26 種，本季魚類調查無新增物種（圖 4.2-2）。

- **整體趨勢分析**

本季魚類調查較前季夏季減少了 3 種，個體數亦減少到了一半左右（圖 4.2-3），時間進入到秋季，遠離粗首馬口鱖之繁殖期，且大多數物種活動漸漸降低，應屬正常季間消長。但滯洪池已連續數季個體數下降，同時三重埔埤卻記錄了相當多的高體鰱鯪族群，自 2019 春季以來滯洪池所調查到之生物有減少的趨勢，建議針對此狀況進行調查以釐清造成之原因。

- **指標變化分析**

比較施工前同季（2013 年秋季）與去年同季（2019 年秋季）魚類調查，2013 年物種多樣性指數（H'）為 0.57、均勻度指數（E）為 0.74；2019 年物種多樣性指數（H'）為 0.70、均勻度指數（E）為 0.62；而本季（2020 年秋季）物種多樣性指數（H'）為 0.53、均勻度指數（E）為 0.49，顯示本季記錄的物種多樣性有些微下降，且優勢種亦有更加優勢的情況，但整體差異不大。

在族群指標上（圖 4.2-4），本季與 2013 年同季相比為 200，有著明顯差異。相似度分析上，本季與去年同季及 2013 指標年秋季相比，相似度為 76.92 及 66.67；與去年相比差異大，主要差異部分為外來物種的增加，原生物種則無明顯差異；而與 2013 年相比組成差異相當大，雖有增加少量外來種記錄，但更多的是本土物種，因此與施工前比較此差異是正向的。

4.2.1.3 結論建議事項

本季調查時溫度明顯較上季有所下降，天氣則多有降雨，四分溪上下游流速相對趨緩，兩岸堆積的淺堆上植被叢生，外來種尼羅口孵非鯽族群依舊龐大，建議盡可能的移除，以增進原生物種的生存空間。三重埔埤高體鰱鯪數量較上季多了不少，但羅漢魚數量則依舊稀少。滯洪池的各物種數量多季以來持續下降，建議針對此問題進行調查以釐清數量下降的原因。




圖 4.2-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種魚類分佈圖




圖 4.2-2 2008-2020 年各季魚類累計物種數




圖 4.2-3 2008-2020 年各季魚類記錄物種數




圖 4.2-4 2012-2020 年魚類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.2-2 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區魚類物種與數量

目	科	種	學名	特有性	四分溪		滯洪池	三重埔埤	總計
					上游	下游			
鯉形目	鯉科	臺灣石魚賓	<i>Acrossocheilus paradoxus</i>	◎	2				2
鯉形目	鯉科	鯽魚	<i>Carassius auratus</i>					1	1
鯉形目	鯉科	羅漢魚	<i>Pseudorasbora parva</i>					1	1
鯉形目	鯉科	高體鰱鰻	<i>Rhodeus ocellatus</i>				16	317	333
鯉形目	鯉科	粗首馬口鱮	<i>Opsariichthys pachycephalus</i>	◎	60	12			72
鯉形目	鯽科	中華花鰱	<i>Cobitis sinensis</i>		1	1			2
鱗形目	花鱗科	食蚊魚	<i>Gambusia affinis</i>	@			23	4	27
鱗形目	花鱗科	劍尾魚	<i>Xiphophorus hellerii</i>	@	1				1
鱸形目	慈鯛科	巴西珠母麗魚	<i>Geophagus brasiliensis</i>	@				2	2
鱸形目	慈鯛科	尼羅口孵魚	<i>Oreochromis niloticus</i>	@	188	103	11	18	320
鱸形目	鰕虎科	極樂吻鰕虎	<i>Rhinogobius giurinus</i>		7	1	2	4	14
鱸形目	鰕虎科	明潭吻鰕虎	<i>Rhinogobius candidianus</i>	◎		2			2
目					3	2	3	3	3
科					5	4	4	4	5
種					6	5	4	7	12
總計					259	119	52	347	777

特有性：◎臺灣特有種○臺灣特有亞種@外來種

4.2.2 兩棲類 (含卵、幼體)

表 4.2-3 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 兩棲類 (含卵、幼體) 調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查方法	地點	調查人力
兩棲類類 (含卵、幼體)	2020/9/21	13:00-15:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	三重埔埤	2 人
	2020/9/22	13:40-15:00			2 人
	2020/9/23	13:15-14:40			2 人
	2020/9/24	13:20-14:00			2 人
	2020/10/24	09:00-14:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	四分溪上游、四分溪 下游、滯洪池	2 人
	2020/10/25	09:00-13:00			2 人
	2020/10/26	09:00-13:00			2 人
	2020/10/27	09:00-11:10			2 人

4.2.2.1 本季調查成果分析

- **物種組成與數量**

本季水域兩棲類 (含卵、幼體) 生物調查分兩個時段，第一個時段於三重埔埤進行，第二個時段則在四分溪上游、四分溪下游、生態滯洪池進行，兩時段各進行 4 天，共 8 天調查，調查工作執行時間如表 4.2-3。本季水域兩棲類 (含卵、幼體) 記錄 1 目 2 科 2 種 5 隻 (表 4.2-4)，包括斑腿樹蛙幼生蝌蚪 4 隻次及盤古蟾蜍成熟青蛙個體 1 隻次。水域兩棲類調查 (含卵、幼體) 僅呈現定點水域樣站調查成果，陸域之兩棲類調查成果比較與分析詳 4.1.3 節。

- **保育類**

本季水域兩棲類無調查到保育類兩棲類 (含卵、幼體)。

- **特有種**

本季調查特有種兩棲類 (含卵、幼體) 1 科 1 種，為盤古蟾蜍。

- **外來種**

本季調查外來種兩棲類 (含卵、幼體) 1 科 1 種，為斑腿樹蛙 (圖 4.2-5)。

- **優勢種**

本季水域兩棲類 (含卵、幼體) 大於 5% 之優勢物種為斑腿樹蛙 4 隻次 (80%)，其次為盤古蟾蜍 1 隻次 (20%)。

- **空間分布、棲地利用**

本季四分溪無發現兩棲類個體，而滯洪池本季則記錄到盤古蟾蜍成熟個體及斑腿樹蛙蝌蚪，盤古蟾蜍發現於主池旁邊，而斑腿樹蛙則發現於防爆牆邊的水坑中。

4.2.2.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

水域兩棲類 (含卵、幼體) 調查歷季共累積 4 科 8 種，本季無新記錄之種類。

(圖 4.2-6)。

- **整體趨勢分析**

與上季夏季相比，兩棲類調查物種數相同而個體數則較多 (圖 4.2-7)；而與去年同季相比，物種數方面多了 2 種，個體數則多了 5 隻次，但歷來滯洪池並無穩定調查到兩棲幼生，因此仍可視作正常的季節消長變化。

- **指標變化分析**

因施工前同季 (2013 年秋季) 還未記錄兩棲類 (含卵、幼體) 調查資料，故此以 2014 夏季、去年同季 (2019 年秋季) 兩棲類 (含卵、幼體) 調查與本季做比較。2014 年因僅調查到一種物種而多樣性及均勻度指數 (H') 為 0；2019 年則無記錄物種而無法計算；而本季 (2020 年秋季) 多樣性指數 (H') 為 0.2173，均勻度指數 (E) 為 0.0654，本季的多樣性及均勻度皆高於 2014 年同季，但考量到兩棲物種並非長期停留在水域中，因此無法以此斷定此區域兩棲類之多樣性高低。

在族群指標上，與 2014 年同季比為 66.67% (圖 4.2-7)，有著些微差異。相似度分析上，本季與 2014 年相似度為 66.67，與 2019 年則為 0，兩者差異相當大，這是由於水域兩棲難以完整調查，且種類稀少，因此容易得到差異大的結果，實際物種僅有一兩種的差距。

4.2.2.3 結論建議事項

兩棲類幼體受水域環境的影響大，水質的汙染、人為干擾與自然因素都是可能影響其物種與數量變動的原因。本季調查在物種及數量皆不算多，四分溪茂盛的植被很適合兩棲類幼體的躲藏，但可能由於氣溫下降而使兩棲類進入到水體或植被更為龐大的區域；而滯洪池周圍之水坑是兩棲類於水邊主要的繁殖區域，外來種斑腿樹蛙亦會利用此區域進行繁衍，建議可針對此做為外來種移除的重點區域。



圖 4.2-5 營運中第 8 季外來種水域兩棲類分布圖。




圖 4.2-6 2008-2020 年各季水域兩棲類 (含幼體與卵) 累計物種數




圖 4.2-7 2008-2020 年各季水域兩棲類 (含幼體與卵) 記錄物種數




圖 4.2-8 2014-2020 年水域兩棲類 (含幼體與卵) 秋季族群指標變化
(定首次兩棲類卵、幼體調查年份 2014 年為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.2-4 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區水域兩棲類 (含幼體與卵) 物種與數量

目	科	種	學名	特有性	四分溪		滯洪池	三重埔埤	總計	百分比
					上游	下游				
無尾目	蟾蜍科	盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	◎		0	1		1	20%
無尾目	樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	@		0	4		4	80%
目					0	0	1	0	1	
科					0	0	2	0	2	
種					0	0	2	0	2	
總計 (未計入蛙卵)					0	0	5	0	5	

特有性：◎ 表示台灣特有種 ○ 表示台灣特有亞種 @ 表示外來種

4.2.3 底棲動物 (蝦蟹螺貝類)

表 4.2-5 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 底棲動物-蝦蟹螺貝類調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查方法	地點	調查人力
底棲動物 (蝦蟹螺貝類)	2020/9/21	13:00-15:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	三重埔埤	2 人
	2020/9/22	13:40-15:00			2 人
	2020/9/23	13:15-14:40			2 人
	2020/9/24	13:20-14:00			2 人
	2020/10/24	09:00-14:00	誘餌籠誘捕法、 手拋網、撈網、 目視穿越線法	四分溪上游、四分溪 下游、滯洪池	2 人
	2020/10/25	09:00-13:00			2 人
	2020/10/26	09:00-13:00			2 人
	2020/10/27	09:00-11:10			2 人

4.2.3.1 本季調查成果分析

- **種類與數量**

本季調查工作執行時間如表 4.2-5。本季調查共記錄到蝦蟹類 1 目 3 科 6 種共計 674 隻 (表 4.2-6)，螺貝類共記錄有 3 目 5 科 8 種共計 231 隻 (表 4.2-7)。

- **保育類**

本季並未調查到任何保育類蝦蟹螺貝類動物。

- **特有種**

本季水域調查記錄到蝦蟹類特有種 1 科 1 種，為凱達格蘭新米蝦。螺貝類未調查到任何特有物種。

- **外來種**

本季水域調查蝦蟹類未記錄到外來種。螺貝類外來種記錄 1 科 1 種，為福壽螺 (圖 4.2-9)。

- **優勢種**

本季蝦蟹類大於 5% 之優勢物種有日本沼蝦 628 隻次 (93.18%)；螺貝類大於 5% 之優勢物種有臺灣蜆 74 顆 (32.03%)、網蜷 65 顆 (28.14%)、川蜷 40 顆 (17.32%)、瘤蜷 16 顆 (6.93%) 及臺灣椎實螺 12 顆 (5.19%)。

- **空間分布、棲地利用**

本季蝦蟹類四分溪上游記錄 4 種，下游記錄 6 種，物種組成差異不大，但僅在下游處發現匙指蝦科物種，而日本絨螯蟹在每日的調查中皆有捕獲。螺貝類於四分溪上游記錄 1 種而下游記錄到 6 種，下游泥灘之中的臺灣蜆數量仍舊不少，其餘物種僅有瘤蜷數量相對較高。

本季蝦蟹類在三重埔埤記錄 1 種，滯洪池記錄 4 種，皆以日本沼蝦為最優勢物種，而在滯洪池中也發現了少許的臺灣沼蝦及日本絨螯蟹。滯洪池本季記錄螺貝類 5 種，主要為椎蜷科的川蜷，而外來種福壽螺在本季下降不少；三重埔埤本

季記錄 4 種，過去三重埔埤少有螺貝類，而本季則發現了為數不少的網蜷，是歷年中記錄個體數最高的一次。

4.2.3.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

全區蝦蟹類調查歷季共累積 6 科 11 種，本季蝦蟹類無記錄新物種（圖 4.2-10）；全區螺貝類調查歷季共累積 9 科 14 種，本季螺貝類調查無記錄新物種（圖 4.2-11）。

- **整體趨勢分析**

本季蝦蟹類與上季相比物種數與上季相同，但個體數減少了許多（圖 4.2-12），主要為進入秋季生物活動漸降，僅日本絨螯蟹仍舊活躍，個體數差異大則是因為在三重埔埤及滯洪池調查到的日本沼蝦較上季減少所導致。

螺貝類方面，物種數減少 1 種而個體數則略有增加（圖 4.2-13），雖然本季臺灣椎實螺數量明顯下降，但在三重埔埤中的網蜷及四分溪下游的臺灣蜆大量出現，使整體個體數較上季增加。

- **指標變化分析**

比較施工前同季（2013 年秋季）與去年同季（2019 年秋季）蝦蟹類調查，2013 年蝦蟹類物種多樣性指數（H'）為 0.19、均勻度指數（E）為 0.63；2019 年物種多樣性指數（H'）為 0.26、均勻度指數（E）為 0.31；而本季（2020 年秋季）物種多樣性指數（H'）為 0.15、均勻度指數（E）為 0.19。與施工前相比多樣性及均勻度都有所下降，且均勻度差異明顯，與前季相比亦是呈現出些許下降的情形。螺貝類 2013 年多樣性指數為 0.34，均勻度為 0.44；2019 年為 0.64 及 0.71；本季多樣性指數為 0.74，均勻度指數為 0.82，較施工前及去年皆有明顯上升，可見螺貝類多樣性呈現出增加的趨勢。

在族群指標上，與 2013 年相比，蝦蟹類指標值為 300（圖 4.2-14），整整高出 2 倍；螺貝類為 133，稍高於指標年（圖 4.2-15）。相似度分析上，本季蝦蟹類與去年同季及 2013 夏季相比，相似度為 92.31 及 25.00，與去年相比組成差異不大，而與 2013 年相比則相當不同。螺貝類相似度則皆為 100，各年度組成完全相同。

4.2.3.3 結論建議事項

本季底棲生物在物種差異不大而數量減少，季節變化為主要原因之一，特別的是日本絨螯蟹在本季仍就活躍，在四分溪及滯洪池皆有個體發現，而凱達格蘭新米蝦則數量下降，本季僅記錄到 2 隻，應留意此物種後續變動趨勢。



圖 4.2-9 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 之外來種螺貝類-福壽螺分布圖




圖 4.2-10 2008-2020 年各季蝦蟹類累計物種數




圖 4.2-11 2008-2020 年各季螺貝類累計物種數




圖 4.2-12 2008-2020 年各季蝦蟹類記錄物種數




圖 4.2-13 2008-2020 年各季螺貝類記錄物種數




圖 4.2-14 2012-2020 年蝦蟹類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)




圖 4.2-15 2012-2020 年螺貝類秋季族群指標變化
(以施工前 2013 年定為指標年，該季物種數定為指標值 100)

表 4.2-6 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區蝦蟹類物種與數量

目	科	種	學名	特有性	四分溪		滯洪池	三重埔埤	總計
					上游	下游			
十足目	匙指蝦科	多齒新米蝦	<i>Neocaridina denticulata</i>			1			1
十足目	匙指蝦科	凱達格蘭新米蝦	<i>Neocaridina ketagalan</i>	◎		2			2
十足目	長臂蝦科	粗糙沼蝦	<i>Macrobrachium asperulum</i>		3	8	1		12
十足目	長臂蝦科	臺灣沼蝦	<i>Macrobrachium formosense</i>		3	5	3		11
十足目	長臂蝦科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>		2	2	170	454	628
十足目	弓蟹科	日本絨螯蟹	<i>Eriocheir japonicus</i>		6	11	3		20
目					1	1	1	1	1
科					2	3	2	1	3
種					4	6	4	1	6
總計					14	29	177	454	674

特有性：◎ 表示臺灣特有種 ○ 表示臺灣特有亞種 @ 表示外來種

表 4.2-7 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區螺貝類物種與數量

目	科	種	學名	特有性	四分溪		滯洪池	三重埔埤	總計
					上游	下游			
簾蛤目	蜆科	臺灣蜆	<i>Corbicula fluminea</i>			74			74
基眼目	椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix swinhoei</i>			1	10	1	12
中腹足目	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	@		1	9	1	11
中腹足目	錐蝸科	網蝸	<i>Melanoides tuberculatus</i>			1		64	65
中腹足目	錐蝸科	川蝸	<i>Semisulcospira libertina</i>				40		40
中腹足目	錐蝸科	瘤蝸	<i>Tarebia granifera</i>		1	10	5		16
中腹足目	錐蝸科	塔蝸	<i>Thiara scabra</i>			2			2
中腹足目	田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>				3	8	11
目					1	3	2	2	3
科					1	4	4	4	5
種					1	6	5	4	8
總計					1	89	67	74	231

特有性：◎ 表示臺灣特有種 ○ 表示臺灣特有亞種 @ 表示外來種

4.2.4 底棲動物（水棲昆蟲（含蜻蛉類水蠅）與環節動物）

表 4.2-8 營運中第 8 季（2020 年 9-11 月）底棲動物-水棲昆蟲與環節動物調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
底棲動物 (水棲昆蟲) 及環 節動物	2020/10/24	09:00-15:00	底棲動物(水棲昆蟲)及環節動物調查	以蘇伯氏水網及撈網採集	四分溪上游、四分溪下游、滯洪池、三重埔埤、新設池塘	2 人
	2020/10/25	09:00-15:00	底棲動物(水棲昆蟲)及環節動物調查			2 人
	2020/10/26	09:00-15:00	底棲動物(水棲昆蟲)及環節動物調查			2 人

4.2.4.1 本季調查成果分析

• 種類與數量

本季水棲昆蟲調查工作時間表如表 4.2-8，共記錄水棲昆蟲 5 目 11 科 19 種 163 隻次、環節動物蛭類記錄 2 目 2 科 4 種 42 隻次（表 4.2-9）。

• 保育類

本季調查並無保育類水棲昆蟲或環節動物的記錄。

• 臺灣族群特有性

本季記錄臺灣特有種善變蜻蜓，是本區最常見的物種，幾乎全年可見，本季僅在四分溪上游發現 1 稚蟲。

• 外來種

本季水棲昆蟲無外來種，蛭類有外來種八罩澤蛭。

• 空間分布、棲地利用

滯洪池本季水位恢復到原有水位，除了在水面活動的圓臀大黽蟬外，網捕與陷阱皆無其他水蟲，推測前一季的水位調節，讓原在池岸水草域棲息的物種，在水位下降後，移棲到池中的個體可能多數被捕食性魚類捕食，目前族群尚需時間恢復。三重埔埤在近一年的採樣水蟲相當稀少，本季也未採獲任何水棲昆蟲。本季就有採獲底棲與水棲物種之四分溪討論，就物種群聚而言，四分溪下游物種較多，上游相對較少，數量上下游差異大，上游高於下游，特別是細蟬屬和弓背細蟬；物種上則是下游明顯高於上游，特別是蜻蜓目的稚蟲，發現的物種皆是四分溪相當常見的蜻蜓。大黽蟬向來為四分溪相當常見的大型半翅目昆蟲，經常在溪流表面活動，由於活動範圍和移動速度相當快速，數量不易統計，一般不特別列入優勢種的討論，分布四分溪者為長翅大黽蟬，滯洪池為圓臀大黽蟬。草蜉科之斑水蜉屬在下游水草區有發現。水棲昆蟲的種類、數量與分佈均持續呈現較高的多樣性，近兩年的調查，顯示秋季是四分溪水域水棲稚蟲較少的季節，可能因夏季大量成蟲羽化後，水域多為小型稚蟲為主，較難採獲與發現。本季四分溪物種多分布於下游具礫石及水草較多的溪段，雖然下游環境底質多為水泥鋪面，較少底棲動物躲藏避難棲所，不過受到季節性雨量的影響，大水沖刷上游泥砂至下游堆積，提供了部分蜻蜓稚蟲的棲所。

4.2.4.2 歷年比較分析

本季調查記錄物種與歷年同期物種數差異不大，但與去年差異較大。2019 年秋季的數量低許多，主要是蜉蝣目和搖蚊類較少，本季則是物種數減少許多，但數量增加較多。環節動物包括歐洲澤蛭、八澤澤蛭、巴蛭與寬身白舌蛭，在四分溪有穩定的族群。

4.2.4.3 結論建議事項

本季僅四分溪區域內有採獲水棲昆蟲，滯洪池與三重埔埤幾無發現；四分溪上游為完整的天然溪流，能提供四分溪下游的物種來源；前季滯洪池進行棲地管理，水位下降，導致原在湖岸水草棲息的水蟲移棲到深水域後多數被捕食，致使滯洪池水蟲大量減少，建議除了目前周邊挺水植物提供較多樣性的棲地外，水域中可增加岩石、枯木和浮草，以增加水棲生物較多的棲所。由於水棲昆蟲幼生期與成蟲期有不同的棲地需求，未來建議同步增加燈光誘集，才能明確的鑑定水域稚蟲。




圖 4.2-16 2008-2020 年各季水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅) 與環節動物記錄物種數

表 4.2-9 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區水棲昆蟲 (含蜻蛉類水虻) 與環節動物物種與數量

綱	目	科	學名	中名	特有性	四分溪 上游	四分溪 下游	滯洪池	總計	百分比	
昆蟲綱	半翅目	黽蟯科	<i>Aquarius elongatus</i>	長翅大黽蟯		1			1	0.61%	
			<i>Aquarius paludum paludum</i>	圓臀大黽蟯			3	3	1.84%		
	蜉蝣目	四節蜉科	<i>Baetiella bispinosa</i>	二刺花翅蜉			1	1	0.61%		
			<i>sp.</i>		10	13	23	14.11%			
		扁蜉科	<i>sp.</i>			1	1	0.61%			
	蜻蛉目	細蜉科	<i>Caenis sp.</i>	細蜉屬		44	17	61	37.42%		
		春蜓科	<i>Sinogomphus formosanus</i>	鉸剪春蜓			1	1	0.61%		
			<i>Pseudagrion pilidorsum</i>								
		細蟴科	<i>pilidorsum</i>	弓背細蟴		20	4	24	14.72%		
			蜻蜓科	<i>Neurothemis ramburii ramburii</i>	善變蜻蜓	◎	1		1	0.61%	
		<i>Orthetrum melania</i>		灰黑蜻蜓			2	2	1.23%		
		<i>Orthetrum pruinosum neglectum</i>		霜白蜻蜓(中印亞種)			4	4	2.45%		
		<i>Orthetrum sabina sabina</i>		杜松蜻蜓			1	1	0.61%		
		<i>Orthetrum triangulare</i>		鼎脈蜻蜓			1	1	0.61%		
		<i>Trithemis aurora</i>		紫紅蜻蜓		1	1	2	1.23%		
		<i>Trithemis festiva</i>	樂仙蜻蜓		2	1	3	1.84%			
		雙翅目	蚋科	<i>sp.</i>				1	1	0.61%	
	搖蚊科			<i>sp.</i>		19	11	30	18.40%		
	蛾蚋科			<i>Pericoma sp.</i>	毛緣蛾蚋屬			1	1	0.61%	
	鱗翅目	草螟科	<i>Eoophyla sp.</i>	斑水螟屬			2	2	1.23%		
	數量						98	62	3	163	100.00 %
	物種						8	16	1	19	
	歧異度						0.632	0.940	-	0.833	
	均勻度						0.700	0.780	-	0.652	
	環帶綱	有吻蛭目	舌蛭科	<i>Alboglossiphonia lata</i>	寬身白舌蛭		2	3		5	11.90%
<i>Helobdella europaea</i>				歐洲澤蛭		1		1	2.38%		
<i>Helobdella octatestisaca</i>				八罩澤蛭	@	7	9	16	38.10%		
無吻蛭目		沙蛭科	<i>Barbronia weberi</i>	巴蛭		11	9	20	47.62%		
數量						21	21		42	100 %	
物種						4	3	0	4		
歧異度						0.466	0.436	-	0.462		
均勻度						0.775	0.914	-	0.767		

特有性：◎ 表示臺灣特有種 ○ 表示臺灣特有亞種 @ 表示外來種

4.2.5 浮游動物

表 4.2-10 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 浮游動物調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查方法	地點	調查人力
浮游動物	2020/9/21	13:00-15:00	浮游動物網	三重埔埤	1 人
	2020/9/22	13:40-15:00			1 人
	2020/9/23	13:15-14:40			1 人
	2020/9/24	13:20-14:00		四分溪上游、四分溪下游、滯洪池	1 人
	2020/10/24	09:00-14:00			1 人
	2020/10/25	09:00-13:00			1 人

4.2.5.1 本季調查成果分析

- **種類與數量**

本季浮游動物調查共記錄 8 目 8 科 11 種 (表 4.2-11)；浮游動物鑑定會因樣本保存狀況或個體生長階段等原因而無法鑑定至種，但為與過去進行統一，將鑑定出的各種類都視為種進行分析，共計 24 種。本季野外採集工作努力量為 6 人天，室內鏡檢分析努力量為 7 個人天。調查工作執行時間如調查工作執行時間如表 4.2-10。

- **保育類**

本季無調查到保育類浮游動物。

- **特有種**

本季無調查到特有種浮游動物。

- **外來種**

本季無調查到外來種浮游動物。

- **優勢種**

本季浮游動物大於 5% 之優勢物種有劍水蚤科 62,834 inds./m³ (78.05%)。

- **空間分布、棲地利用**

本季調查四分溪上游記錄 11 種，下游記錄 8 種，組成上大致相同，但下游處的個體數為上游的 2 倍。

本季三重埔埤紀錄 11 種，滯洪池記錄 8 種，滯洪池以橈足類為主要組成，而三重埔埤還發現了少數枝角類，且個體數遠多於其他測站，最為適合浮游動物的生長。

4.2.5.2 歷年比較分析

- **物種累積分析**

全區浮游動物調查累積 56 科 82 種，累積種類 161 種，本季新增 7 種 (圖 4.2-17)，

為冠狀砂殼蟲、寬角粗毛蚤、點滴尖額蚤、微小近劍水蚤、隱密列囊猛水蚤、細蜉蝣及毛緣蛾蚋。

- **整體趨勢分析**

本季浮游動物物種較上季少了許多，而個體數較上季有所增加，造成原因為劍水蚤的大量出現所導致，而與去年同季相比個體數及物種數都明顯上升。歷年各季浮游動物物種及數量變化繪於圖 4.2-18。

- **指標變化分析**

比較施工前同季 (2013 年秋季) 與去年同季 (2019 秋季) 之多樣性及均勻度指數，2013 年多樣性指數為 0.6952，均勻度指數為 0.7286；2019 年為 0.2034 及 0.2034；本季調查為 0.4768 及 0.3455；與施工前相比，多樣性及均勻度指數皆有下降，但較去年同季相比則皆有上升，代表本季多樣性有所增加，但仍未回復到施工前的狀態。

4.2.5.3 結論建議事項

本季採樣時為秋季，三重埔埤仍舊是所有區域中浮游動物最為繁盛的；四分溪屬河流，本不利於浮游動物生長，但滯洪池本季調查到的數量及種類亦不多，後續應關注此情形以了解滯洪池之生態狀況是否有所變化。

浮游動物物種累積圖




圖 4.2-17 2008-2020 年各季浮游動物累計物種數

歷年各季浮游動物種類數及數量變化圖




圖 4.2-18 2008-2020 年各季浮游動物記錄物種數

表 4.2-11 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 各樣區浮游動物物種與數量

類群	小類	物種	學名	四分溪上游	四分溪下游	滯洪池	三重埔	總計	百分比
原生動物	葉狀根足蟲	冠狀砂殼蟲	<i>Diffugia corona</i>	333				333	0.41%
甲殼類	枝角類	枝角類	Cladocera				167	167	0.21%
		粗毛蚤	<i>Macrothrix</i> sp.	167				167	0.21%
		寬角粗毛蚤	<i>Macrothrix laticornis</i>		167			167	0.21%
		點滴尖額蚤	<i>Alona guttata</i>				833	833	1.03%
		矩形尖額蚤	<i>Alona rectangula</i>				500	500	0.62%
		尖額水蚤	<i>Alona</i> sp.				167	167	0.21%
	橈足類	劍水蚤	Cyclopoida	167	167	3167	59333	62834	78.05%
	枝角類	微小近劍水蚤	<i>Tropocyclops parvus</i>				167	167	0.21%
		毛篩擬劍水蚤	<i>Paracyclops fimbriatus</i>	167		167		334	0.41%
		廣佈中劍水蚤	<i>Mesocyclops leuckarti</i>	167			1833	2000	2.48%
		臺灣溫劍水蚤	<i>Thermocyclops taihokuensis</i>				500	500	0.62%
		短尾溫劍水蚤	<i>Thermocyclops brevifurcatus</i>				333	333	0.41%
		跨立小劍水蚤	<i>Microcyclops vanicans</i>			333	3500	3833	4.76%
		猛水蚤	Hetropoda	667	1000	333		2000	2.48%
		隱密列囊猛水蚤	<i>Schizopera clandestina</i>	167				167	0.21%
		無節幼蟲	nauplius			333	833	1166	1.45%
介形類		介形類	Ostracoda	167	1333	167		1667	2.07%
水生昆蟲	蜉蝣目	蜉蝣目	Ephemeroptera	167				167	0.21%
		四節蜉蝣	<i>Baetis</i> sp.			167		167	0.21%
		細蜉蝣	<i>Caenis</i> sp.		167			167	0.21%
	雙翅目	毛緣蛾蚋	<i>Pericoma</i> sp.	167	667			834	1.04%
	毛翅目	毛翅目	Trichoptera		167			167	0.21%
		蛻皮		167	1333	167		1667	2.07%
單位個體量				2503	5001	4834	68166	80504	100.00%
種類				11	8	8	11	36	
歧異指數				0.98	0.76	0.56	0.27	0.48	

* 單位個體量表示方式為每公升個體量 (ind./m³)

4.3 陸域植物

4.3.1 移植後樹木

表 4.3-1 營運中第 8 季移植後樹木調查工作時間表

類群	季別	調查天次	調查日期	地點	調查人力
移植後樹木生長狀況	第 8 季	1 天	2020/11/26	國家生技研究園區 (A 區)	2 人
移植後樹木物候		1 天	2020/11/26		2 人
移植後樹木生長狀況	12 月	1 天	2020/12/01		2 人

依「國家生技研究園區營運中生態監測調查計畫」承諾園區開發範圍內的現有樹木裡，將篩選生長勢良好、主幹直挺、樹形開展者予以移植或保留，並針對移植樹木進行抽樣複查，監測以樹木的存活率及生長狀況為主，抽樣複查以胸徑每 10 公分為一監測區間，每一區間隨機取樣 20% 進行複查。本季（營運中第 8 季）調查針對本區移植樹木進行複查，本季調查時仍有多數植株未尋獲，加上周邊新植小苗與少數的楓香標牌掉落，以及補植或移植資訊不明確，難以和過往資料比對，故針對樹木銀行之楓香與周邊栽植苗木全數清查，以及補上遺失標牌，並於 12 月再進行一次複查，執行時間如表 4.3-1。

前次（第四季）樹木銀行調查時，共計有 122 株，其中楓香有 63 株，其餘 59 株為其他多種苗木。本季複查結果胸徑小於 10 cm 計有 29 株，10-20 cm 計有 51 株，20-30 cm 計有 11 株，共計複查 91 株，其中 62 株為楓香，另 29 株為其他多種苗木（胸徑小於 10 cm），樹種資訊詳見附錄。相比第四季調查結果，本季有 1 株楓香未尋獲，而有 30 株其他多種苗木未尋獲，其原因可能為死亡後移除或移植至其他區域。

本季（2020 年 9-11 月）樹木銀行植株之生長狀況方面，6 株楓香呈現枯死，4 株楓香生長狀況不佳，剩餘楓香生長狀況良好，而周圍樹種之苗木生長狀況多數正常，僅有 1 株青楓苗木葉子萎靡，生長狀況不佳，另外奧氏虎皮楠、樹杞皆各有 1 株受到輕微蟲害影響。植物物候調查依變化週期分為生長期、開花期、結果期、落葉期等 4 大時期，多數楓香處於生長期，少數楓香的葉片由綠轉枯黃進入落葉期，發現 1 株楓香結果，而周圍樹種之苗木處於生長期。

依歷季資料顯示，原移植楓香共有 352 株，後來因工程一再移植，許多未尋獲。2018 年複查到 151 株楓香，當中僅有 102 株楓香存活，存活率 67.5%；2019 年複查仍有多數楓香未尋獲，僅複查到 63 株楓香，存活率為 61.8%；本季（2020 年）存活之楓香有 54 株，存活率為 88.9%，歷季存活之楓香的總存活率為 15.3%。其餘周圍樹種由於歷季的移植與補植資訊不明，無資料核對，難以評估，故不列入統計。

12 月複查結果胸徑小於 10 cm 計有 29 株，10-20 cm 計有 51 株，20-30 cm 計有 11 株，共計複查 91 株，其中 62 株為楓香，另 29 株為其他多種苗木（胸徑小於 10 cm），樹種資訊詳見附錄。與上次（11 月）調查資料相比，12 月並無明顯差異之變動，存活之楓香同為 54 株，存活率 100%，歷季之楓香（原先共移植 352 株）總存活率 15.3%，其餘周圍樹

種苗木亦無變化。除了因天氣潮濕造成楓香枯木上有明顯真菌生長，生長狀況與存活率仍需要長時間的觀察比較，短時間內不易發現生長變化。

與過往資料相比，樹木銀行中許多植株已不復見，加上多數存活植株的標牌遺失（主要為楓香林周邊栽植苗木），也難以核對過往資料，可能是因移植時未妥善處理照顧，後續又疏於管理，建議未來仍須注意植物維護與管理，若有移植樹木或新植苗木時，應避免填土過高、土質不佳、施工之器械傷害、短期再移植與排水不良等情形。樹木銀行移植樹木栽植區現場照片如圖 4.3-1 與圖 4.3-2，移植樹木物候調查結果詳如表 4.3-2。



(1) 國家生技研究園區樹木銀行現況



(2) 已枯死之楓香



(3) 多數楓香生長狀況良好，少數楓香的葉子由綠轉枯黃



(4) 楓香周圍苗木，其中奧氏虎皮楠稍微受蟲害干擾

圖 4.3-1 2020 年 9-11 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片



(1) 多數楓香生長狀況良好



(2) 生長狀況不佳之楓香



(3) 已枯死之楓香



(4) 已枯死之楓香上有明顯真菌生長

圖 4.3-2 2020 年 12 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片

表 4.3-2 移植樹木物候調查結果

中文名	類型	2014	2015												2016												2017												2018					2019					2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	2	5	7	11	1	4	7	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
楓香	落葉喬木	●/-	●/-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+							-/+	+/@	+	+	+	+	-	-	-/+	+/*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

中文名	類型	2014	2015												2016												2017												2018					2019					2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
香楠 (C010)	常綠喬木				+	+	+	+	+	枯死(移除)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
正榕 (G034)	常綠喬木						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

4.3.2 原生雜木林復育區（低海拔原生林復育區）

表 4.3-3 營運中第 8 季原生雜木林復育區調查工作時間表

類群	季別	調查天次	調查日期	地點	調查人力
新植苗木及園區生長狀況	第 8 季	1 天	2020/10/23	國家生技研究園區 (A 區)	2 人
		1 天	2020/10/26		3 人
		2 天	2020/10/29-30		2 人
植被物候		2 天	2020/10/29-30		2 人
新植苗木及園區生長狀況	12 月	1 天	2020/12/01		2 人

依據「國家生技研究園區營運中生態監測調查計畫」承諾，須於原生雜木林復育區對新植樹苗依合約每半年監測 1 次，每年度需有 2 次的監測，但年初新植苗木之掛牌全數被移除，使調查無法進行。因此需重新清查，並補上標牌，所以規劃於 10 月進行 1 次的清查、補牌與監測，12 月另進行 1 次監測（因為季度的關係），依合約承諾於第 8 季報告中繳交 2 次的資料。每樹種隨機取樣 20%，且數量不得少於 10 株；未滿 10 株之樹種全數取樣。上述每半年監測 1 次，依期程計畫本季須執行調查，並於 12 月再進行 1 次，由於年初新植苗木標牌全數已被拔除，加上現有植株與樹苗定植位置圖無法核對，以致過往資料無法比對，故本季調查參考前案，依 2016/11/14 施工單位提供之植栽名冊之樹種（新植樹苗 34 種共 323 株），並針對名冊中過往調查之樹種重新掛牌編號，並進行清查與測量，執行時間如表 4.3-3。

本季調查總計 36 種 287 株的苗木，歷季調查樹種有 34 種，本季有 33 種與歷季樹種相符，其中 1 種為沙朴未尋獲，額外紀錄的 3 種分別是台灣欒木、幹花榕、赤皮，此 3 種應是後來園區補植之樹種，清查樹種與尋獲植株詳見附錄。由於舊有標牌已被全數拔除，加上新補植的植栽，重新編號掛牌後的資訊與過往資訊無法核對，表示過往的舊有資料均無法對映現有的植株狀況，因此僅能呈現本季測量調查之結果，無法呈現與過往資料比對的資訊，且難以釐清長期生長存活概況，需於後續 12 月復查再進行評估。

胸徑小於 10 cm 共有 258 株，胸徑介於 10-20 cm 有 29 株，當中有 2 株奧氏虎皮楠生長狀況不佳，而受到蟲害干擾的樹種主要有 4 種，分別為稜果榕、水同木、錫蘭饅頭果、穗花棋盤腳，合計共有 22 株，另外有 1 株魚木受到槭葉牽牛的纏繞干擾，其餘多數植栽處於生長期階段，少數為開花或結果期。關於苗木有病蟲害之情形，若是情況嚴重可能導致植物死亡，可針對上述之樹種多加注意。

12 月調查總計 36 種 287 株的苗木，胸徑小於 10 cm 共有 258 株，胸徑介於 10-20 cm 有 29 株。上次(10 月)調查時，有 2 株生長狀況不佳的奧氏虎皮楠，在 12 月判定其中 1 株奧氏虎皮楠已枯死。而受到病蟲害干擾的樹種主要有 6 種，合計共有 31 株，相較於上次調查多出 9 株，樹種分別為稜果榕、水同木、錫蘭饅頭果、穗花棋盤腳、臭娘子與海州常山，其中臭娘子與海州常山為 12 月調查時新增，另外觀察到 1 株杜英上有漢氏山葡萄攀附，2 株山刈葉枝幹上長出真菌，其餘多數苗木處於生長期階段，少數為開花或結果期，詳見附

錄。關於苗木有病蟲害之情形，若是情況嚴重可能導致植物死亡，可針對上述樹種多加注意。12 月新植苗木生長狀況相較 10 月並無明顯變化，除了病蟲害有新增變動，存活率方面僅有 1 株奧氏虎皮楠明顯枯死。重新掛牌後，短時間內的複查難以馬上反映植物的生長與存活概況，加上以往的資料均已無法核對，因此仍需長時間的持續觀察。

物候方面紫花藿香薷、藿香薷、大花咸豐草持續開花生長；山芙蓉、暎穗蓼、江某、野薑花、小梗木薑子及山刈葉進入花期；水同木、稜果榕、菲律賓榕、水冬瓜、錫蘭饅頭果為花果並存期；鐵冬青、九節木、白匏子、瑪瑙珠、九芎、臭娘子、穗花棋盤腳進入果期，樹杞則有殘果；其餘樹種多數處於生長期。環境現況照片如圖 4.3-3 與圖 4.3-4，各樹種物候概況詳如表 4.3-4。




(1) 國家生技園區山芙蓉開花



(2) 九節木結果



(3) 穗花棋盤腳受蟲害影響




(4) 槭葉牽牛纏繞魚木

圖 4.3-3 2020 年 9-11 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片



(1) 國家生技園區小梗木薑子開花



(2) 山刈葉結果



(3) 受嚴重蟲害影響之錫蘭饅頭果



(4) 已枯死之奧氏虎皮楠

圖 4.3-4 2020 年 12 月國家生技研究園區原生雜木林復育區現場照片

表 4.3-4 原生雜木林復育區新植樹苗物候調查結果

編號	種類	類型	數量 (株)	需測量	2018								2019												2020						備註
					1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	4	7	11	12		
A01	楊梅	常綠	5	5	+	+/*	+/*	+	+	+	+	+	+	+/*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A02	魚木	落葉	8	8	-	-/+	-/+	-/+	-/+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A03	刺杜密	常綠	13	10	+	+	+	+	+/*	+	+	+	+	+/*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A04	山埔姜	落葉	2	2	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A05	羅氏鹽膚木	落葉	13	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A06	樹杞	常綠	12	10	+	+	+	+	+	+/*	+/◎	+/●	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A07	森氏紅淡比	常綠	10	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A08	小梗木薑子	常綠	6	6	+	+/*	+	+	+	+	+	+	+/*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A09	鐵冬青	常綠	12	10	+/*	+/◎	+	+/*	+/◎	+/◎	+/●	+/●	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A10	山刈葉	常綠	8	8	+	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/-	+/*	+/*	+/*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A11	大頭茶	常綠	10	10	+/◎	+/●	+/●	+/●	+/●	+	+	+	+	+/●	+/●	+/●	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A12	江某	常綠	5	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+/●	+/●	+/●	+/●	+	+	+	+	+	+/◎	+/◎	+/*	+/*	+/*	+	+	+/*	+/*	
A13	臭娘子	落葉	13	10	-	-/+	+	+/*	+/*	+/◎	+/◎	+/◎	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A14	白雞油	常綠	8	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A15	杜英	常綠	13	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A16	青剛櫟	常綠	10	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A17	山菜豆	落葉	12	10	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A18	水金京	常綠	7	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
A19	九芎	落葉	9	9	+/●	+/●	-/+	+	+	+/*	+/◎	+/◎	+/●	+	+	+	+/*	+/◎	+/◎	+	+/●	+	+	+/●	+/●	+	+/◎	●	●		
A20	稜果榕	常綠	6	6	+/*	+/◎	+	+	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	+	+	+/◎	+/◎	+/◎	
A21	沙朴	落葉	3	3	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-/+																	未尋獲	
A22	菲律賓榕	常綠	7	7	+/◎	+/◎	+	+	+	+	+/◎	+/◎	+/◎	+	+	+	+	+/◎	+/◎	+	+	+/◎	+	+	+	+	+/◎	+/◎	+/◎		
A23	水冬瓜	常綠	16	10	+	+	+	+	+	+/*	+/◎	+/◎	+	+	+/◎	+/◎	+/*	+/◎	+/◎	+	+/◎	+/◎	+	+	+	+	+/◎	+/◎	+/◎	+/◎	

編號	種類	類型	數量 (株)	需測量	2018								2019												2020								備註
					1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	4	7	11	12				
A24	水同木	常綠	8	8	+	+	+	+	+/ $\odot$	+	+	+	+	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+	+	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\bullet$				
A25	海州常山	落葉	7	7	+	+	+	+	+/*	+/*	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+	+	+	+/*	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+	+/ $\bullet$	+	+	+	+	+/ $\odot$	+	+				
A26	大葉楠	常綠	6	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
A27	奧氏虎皮楠	常綠	7	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
A28	構樹	半落葉	9	9	+	-/+	+	+	+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
A29	賊仔樹	落葉	6	6	-	-/+	+	+	+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
A30	薯豆	常綠	4	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
D01	錫蘭饅頭果	常綠	28	10	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+/ $\bullet$	+/ $\bullet$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+/ $\odot$					
D02	水柳	落葉	17	10	-	-/+	-/+	+	+	+	+	+	-/+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-				
D03	水社柳	落葉	9	9	+/*	+/ $\bullet$	+/ $\bullet$	+	+	+	+	+	+/ $\bullet$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/*	+/*	+/*	+	+	+	+				
D04	穗花棋盤腳	常綠	10	10	+	+	+	+	+/*	+/*	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/ $\odot$	+/ $\odot$	+	+	+/ $\bullet$	+/ $\bullet$	+	+	+	+/ $\odot$	+/ $\bullet$	+/ $\bullet$			
補植	台灣欒木	落葉																										+	+	補植			
補植	幹花榕	常綠																										+	+	補植			
補植	赤皮	常綠																										+	+	補植			
生長期：+ 開花期：* 結果期：● 落葉期：- 開花結果期：◎																																	

4.4 紅外線自動相機監測及分析

表 4.4-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 紅外線自動相機調查工作時間表

類群	調查日期	調查項目	調查方法	地點	調查人力
自動相機調查	2020/12/1-2 (電池記憶卡更換) 2020/9/1-2020/11/30 (相機工作時間)	紅外線相機 調查法	紅外線相機調查	國家生技研究園區(A 區)、生態研究區(B 區)、202 兵工廠區(C 區)	3 人
	2020/9/9-2020/12/31		紅外線自動相機 影像辨識	本團隊辦公室	4 人

4.4.1 本季調查成果分析

● 種類與數量

本案自動相機架設樣點接續前案進行監測，其中 13 個樣點為延續施工 1-20 季中設立的樣點，並額外新增 11 台自動相機，共計架設 24 台自動相機 (表 4.4-2、圖 2.5-1)。本季全區歷年架設之 12 臺相機總工作時數為 24770.87 小時，各樣點工作時數平均為 2064.24 小時，最短工作時數為 C04 相機的 1176.37 小時，最長工作時數為 2184 小時，共拍攝物種有效照片 1020 張 (一小時內拍攝到同一物種，非不同個體之所有照片視為一張有效照片)。本季全區 24 臺相機總工作時數為 48975 小時，各樣點工作時數平均為 2040.63 小時，最短工作時數為 A12 相機的 180.17 小時，最長工作時數為 2184 小時，共拍攝物種有效照片 1864 張。相機電池、記憶卡更換日期詳表 4.4-1。

本季歷年架設之 12 臺紅外線自動相機調查到哺乳類 9 科 11 種，鳥類 12 科 16 種，昆蟲 1 科 2 種，共計 22 科 29 種動物。全部 24 臺紅外線自動相機調查到哺乳類 9 科 12 種 (不包含人與無法鑑定之物種，表 4.4-3)，鳥類 13 科 19 種 (不包括無法鑑定之物種，表 4.4-4)，昆蟲 1 科 2 種 (表 4.4-5)，共計 23 科 32 種動物。

哺乳類部分，本季全區架設之 12 臺紅外線自動相機記錄哺乳類平均出現指數 (平均 OI 值) 以鼬獾最高 17.68 最高，其次依序為白鼻心 7.29、赤腹松鼠 3.01、家犬 2.81、麝香貓 1.70 及食蟹獾 1.01，其餘物種平均 OI 值均低於 1，並以大赤鼯鼠 0.04 最低。各相機出現樣點比例 (拍攝到該物種相機數/架設總相機數) 中，全區架設 12 臺相機樣點記錄哺乳動物出現樣點比例以鼬獾 91.67%最高，其次依序為白鼻心 83.33%、赤腹松鼠、麝香貓及食蟹獾三者皆為 75.00%、山羌及犬 41.67%與貓 33.33%，其餘哺乳類出現樣點比例均低於 33%。增設至 24 臺之樣點哺乳類出現樣點比例以鼬獾 83.33%最高，依次為白鼻心及赤腹松鼠 75.00%、麝香貓及食蟹獾 70.83%、山羌及貓 45.83%與家犬 41.67%，其餘哺乳類出現樣點比例均低於 33% (表 4.4-3)。

鳥類部分，本季全區架設之 12 臺相機樣點記錄鳥類平均出現指數 (平均 OI 值) 以黑冠麻鷺 3.45 最高，其餘物種平均 OI 值均低於 1，並以大冠鷺、五色鳥、紅尾伯勞及樹鵲皆為 0.04 最低。鳥類出現樣點比例以黑冠麻鷺 50.00%最高，其次依序為

翠翼鳩、臺灣藍鵲及臺灣竹雞 25.00%、藍腹鵲、臺灣山鷓鴣、虎鵲、短尾鶯與領角鴉 16.67%，其餘鳥類出現樣點比例均低於 10%。增設至 24 臺之樣點鳥類出現樣點比例以黑冠麻鷺 50.00%最高，依次為臺灣竹雞 25.00%、臺灣藍鵲 20.83%、虎鵲、翠翼鳩、領角鴉、樹鵲及藍腹鵲 12.50%，其於鳥類出現樣點比例均低於 10% (表 4.4-4)。

- **保育類**

本季全區 12 臺相機樣點記錄保育類動物 9 種，包括珍貴稀有之 II 級保育類[■]、麝香貓、大冠鶯、藍腹鵲、領角鴉等 5 科 5 種，其他應予保育之 III 級保育類之食蟹獐、臺灣藍鵲、臺灣山鷓鴣、紅尾伯勞等 3 科 3 種。增設至 24 臺之自動相機所記錄到之保育類動物種類除了上述物種，額外記錄珍貴稀有之 II 級保育類鳳頭蒼鷹。

- **特有種**

本季全區 12 臺相機樣點紀錄特有種 6 種，為臺灣刺鼠、臺灣藍鵲、臺灣竹雞、藍腹鵲、臺灣山鷓鴣及五色鳥。增設至 24 臺之樣點所記錄特有種與上述 6 種相同。全區 12 台相機樣點記錄特有亞種鼬獾、白鼻心、赤腹松鼠、麝香貓、山羌、[■]、大赤鼯鼠、領角鴉、白頭翁、大冠鶯及樹鵲，總共 11 種。增設至 24 臺之樣點額外記錄到特有亞種鳳頭蒼鷹。

- **外來種**

外來引進種方面，全區 24 台相機記錄家貓與家犬 2 種外來種 (圖 4.1-19、圖 4.1-20)。

- **空間分布、棲地利用**

本季歷年 12 臺相機 A 區記錄哺乳類 8 科 9 種 (不包含人)，B 區記錄哺乳類 8 科 9 種，C 區記錄哺乳類 9 科 11 種。增設至 24 臺自動相機之樣點 A 區記錄哺乳類 8 科 9 種 (不包含人)，B 區記錄哺乳類 9 科 10 種，C 區記錄哺乳類 9 科 12 種。以下針對幾種物種進行討論：

食蟹獐為溪流、池塘水質的指標物種，常活動於水質乾淨的溪流周遭，善於捕食螃蟹。本季全區有 17 臺相機有影像記錄，平均 OI 值 1.12，出現樣點比例 70.83%。麝香貓本季全區有 17 台相機有影像記錄，平均 OI 值 1.80，出現樣點比例 70.83%。

家犬、家貓等外來流浪或自由寵物，本季全區 24 臺相機犬及貓之平均 OI 值分別為 2.72 及 0.86，出現樣點比例分別為 41.67%與 45.83%。這 2 種外來種在本區闊葉次生林內分布與數量相當廣泛與豐富，對本區動物產生威脅，可能成為限制部分原生動物族群的重要因子。

4.4.2 歷年比較分析

地面活動的哺乳動物為本計畫自動相機監測法的主要目標物種，歷年共記錄哺乳動物 6 目 12 科 14 種 (不含人及未鑑定的物種)；本季記錄到之物種新增小黃腹鼠 1 種，其餘物種歷年均均有記錄過，以下針對幾種重要物種進行討論。

白鼻心與[■]請見 4.5.3 與錯誤! 找不到參照來源。節。山羌自 2017 年夏季起於 C 區首次記錄；2018 年秋季於 B 區首次記錄；營運期起於 2019 年春季在 B、C 兩區皆有影

像紀錄，2019 年夏季起出現在 A 區；2020 年春季由於疫情因素無法取得 B、C 區資料，不過 A 區仍有記錄到山羌；而後 2020 年夏季至本季（2020 秋季）全區皆有山羌活動之紀錄（表 4.4-3）。食蟹獐於 2017 年秋季在 B 區（生態研究區）首次記錄 2 隻個體，2018 年春季起於全區都有紀錄，而本季亦全區皆有食蟹獐之影像紀錄（表 4.4-3）。

4.4.3 結論建議事項

整體而言，過去多年由於工程造成的棲地破壞、變更、破碎化與噪音等干擾。如今工程結束，區內的野生動物族群恢復，但仍必須留意圍籬阻隔造成的棲地切割效應，盡可能在與南港山區間的圍籬維持動物通道。此外，本季有拍攝到，起因可能源於犬群的攻擊。因此，須特別留意區內的流浪犬貓族群並妥善控制，方能加速本區野生動物群聚生態的復原。

表 4.4-2 本計畫及歷年監測案紅外線自動相機位置表

相機樣點編號				TWD97X	TWD97Y	棲地類型	狀態說明	備註
總編號	施工前	施工中	本計畫					
A02	中機 A2	A02	A02	311364	2771412	次生林	延續架設	本季記憶卡自 6 月底毀損
A02-1	-	-	A02-1	311232	2771484	次生林	新設樣點	
A07	-	A07	A07	311636	2771096	次生林	延續架設	
A09	-	-	A09	311565	2771040	次生林	延續架設	取代 A08
A10	-	-	A10	311719	2771447	次生林	延續架設	取代 A06
A12	-	-	A12	311612	2771122	溝渠通道	延續架設	動物通道
B01	中機 B1	B01	B01	311059	2770267	次生林	延續架設	
B01-1	-	-	B01-1	310820	2770189	次生林	新設樣點	
B02	-	B02	B02	310958	2770286	次生林	延續架設	
B02-1	-	-	B02-1	310870	2770248	次生林	新設樣點	本季記憶卡毀損
C01	-	C01	C01	310613	2770559	次生林	延續架設	
C01-1	-	-	C01-1	310598	2770553	次生林	新設樣點	
C02	中機 C2	C02	C02	310846	2771403	次生林	延續架設	
C02-1	-	-	C02-1	310771	2771413	次生林	新設樣點	
C03	中機 C3	C03	C03	311050	2771094	次生林、竹林	延續架設	
C03-1	-	-	C03-1	311029	2771086	次生林	新設樣點	
C04	-	C04	C04	311356	2770523	次生林	延續架設	本季相機鏡頭發霉
C04-1	-	-	C04-1	311347	2770517	次生林	新設樣點	
C06	-	C06	C06	311182	2771174	次生林	延續架設	
C06-1	-	-	C06-1	311191	2771174	次生林	新設樣點	
C08	-	-	C08	311359	2770883	次生林	延續架設	取代 C07
C08-1	-	-	C08-1	311356	2770931	次生林	新設樣點	
廊道 01	-	-	廊道 01	310613	2770559	次生林	新設樣點	
廊道 02	-	-	廊道 02	311345	2771321	次生林	新設樣點	
A01	中機 A1	A01		311579	2771487	次生林	器材遭竊	
A03	中機 A3	A03		311609	2771020	次生林	器材遭竊	
A04	-	A04		311477	2770819	次生林	器材遭竊	
A05	-	A05		311700	2771530	次生林	點位撤除	
A06	-	A06		311660	2771475	次生林	點位撤除	樹倒塌
A08	-	A08		311567	2771025	次生林	點位撤除	人為干擾
A11	中機 A4	-		311491	2770829		點位撤除	
B03	中機 B2	-		310887	2770221		點位撤除	
B04	中機 B3	-		310865	2770355		點位撤除	
B05	中機 B4	-		310847	2770265		點位撤除	
B06	中機 B5	-		310932	2770350		點位撤除	
C05	中機 C9	C05		311244	2770491	次生林	器材遭竊	
C07	-	C07		311409	2770823	次生林	點位撤除	架設樹倒塌
C09	中機 C1	-		311198	2771473		點位撤除	
C10	中機 C4	-		310992	2770867		點位撤除	
C11	中機 C5	-		311230	2770525		點位撤除	
C12	中機 C6	-		310639	2770415		點位撤除	
C13	中機 C7	-		311406	2770514		點位撤除	
C14	中機 C8	-		311270	2770450		點位撤除	
C15	中機 C10	-		310719	2770409		點位撤除	

* 灰底色部分為本季架設之相機樣點

表 4.4-3 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱調查哺乳類各樣點出現指標

樣點	總工作時數	犬	貓	山羌	麝香貓	白鼻心	鼬獾	■ ■ ■	食蟹獾	大赤鼯鼠	赤腹松鼠	刺鼠	小黃腹鼠
A02	1754.50	3.99	0.00	1.71	4.56	1.14	33.06	0.00	3.99	0.00	6.84	0.00	0.00
A02-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.92	3.21	0.00	1.83	0.00	0.92	0.46	0.00
A07	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	8.24	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
A09	2184.00	0.00	0.00	3.21	1.83	6.87	47.62	0.00	0.46	0.00	4.12	0.00	0.00
A10	2184.00	2.29	1.37	0.92	0.46	1.83	13.74	0.00	0.92	0.00	6.41	0.46	0.00
AC	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01	2184.00	23.81	0.00	0.00	5.04	3.21	1.37	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01-1	2184.00	1.37	0.00	2.75	8.70	61.81	46.25	0.46	0.00	0.00	3.21	0.46	0.00
B02	2184.00	3.21	0.46	0.00	0.00	16.03	21.52	0.00	1.37	0.00	3.66	2.75	0.00
B02-1	2184.00	0.92	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00
C01	2184.00	0.00	0.92	0.92	4.12	16.03	3.21	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
C01-1	2184.00	0.46	0.46	0.46	3.66	25.64	5.49	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
C02	2184.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
C02-1	2184.00	10.07	1.83	2.75	0.46	4.12	6.87	0.00	0.46	0.00	0.92	0.00	0.00
C03	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	10.99	0.46	0.46	0.00	3.66	5.04	0.00
C03-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	1.37	0.00	0.46	0.00	4.12	1.83	4.58
C04	1176.37	0.00	0.00	1.70	2.55	21.25	11.05	0.00	1.70	0.00	0.85	0.00	0.00
C04-1	2184.00	0.00	0.46	0.00	0.46	2.29	0.92	0.00	0.46	0.00	0.92	0.00	0.00
C06	2184.00	0.00	5.04	0.00	0.46	20.15	58.15	0.00	1.83	0.00	2.75	0.00	0.00
C06-1	2184.00	0.00	0.46	0.00	0.00	1.37	5.95	0.00	1.37	0.00	2.29	0.00	0.00
C08	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	3.21	0.00	0.00	0.46	7.33	0.00	0.00
C08-1	2184.00	0.00	1.37	0.00	0.46	3.66	18.77	1.37	0.92	0.00	9.16	0.00	0.46

廊道 01	2184.00	0.00	6.41	2.29	5.04	11.90	3.66	1.37	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
廊道 02	2184.00	18.77	1.83	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12 台相機有效動物數		72	17	16	40	169	438	3	23	1	75	18	0
12 台相機平均 OI 值		2.81	0.65	0.71	1.70	7.29	17.68	0.12	1.01	0.04	3.01	0.69	0.00
12 台相機出現樣區數		5	4	5	9	10	11	2	9	1	9	3	0
12 台相機出現頻度		41.67%	33.33%	41.67%	75.00%	83.33%	91.67%	16.67%	75.00%	8.33%	75.00%	25.00%	0.00%
24 台相機有效動物數		141	45	64	90	413	640	10	55	1	126	24	11
24 台相機平均 OI 值		2.72	0.86	1.27	1.80	8.30	12.69	0.19	1.12	0.02	2.48	0.46	0.21
24 台相機出現樣區數		10	11	11	17	18	20	5	17	1	18	6	2
24 台相機出現頻度		41.67%	45.83%	45.83%	70.83%	75.00%	83.33%	20.83%	70.83%	4.17%	75.00%	25.00%	8.33%

表 4.4-4 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱調查鳥類各樣點出現指標

樣點	總工作時數	大冠鷲	山鵲	五色鳥	白腰鵲鵒	白腹鵲	白頭翁	赤腹鵲	虎鵲	紅尾伯勞	短尾鷲
A02	1754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
A07	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A09	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
B01-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B02	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.46
B02-1	2184.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
C01-1	2184.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
C03-1	2184.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04	1176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C06	2184.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
C06-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C08	2184.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C08-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

廊道 01	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廊道 02	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12 台相機有效動物數		1	0	1	2	2	2	0	4	1	2
12 台相機平均 OI 值		0.04	0.00	0.04	0.08	0.08	0.08	0.00	0.15	0.04	0.08
12 台相機出現樣區數		1	0	1	1	1	1	0	2	1	2
12 台相機出現頻度		8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	16.67%	8.33%	16.67%
24 台相機有效動物數		2	4	1	3	4	3	1	5	1	2
24 台相機平均 OI 值		0.04	0.08	0.02	0.06	0.08	0.06	0.02	0.10	0.02	0.04
24 台相機出現樣區數		2	2	1	2	2	2	1	3	1	2
24 台相機出現頻度		8.33%	8.33%	4.17%	8.33%	8.33%	8.33%	4.17%	12.50%	4.17%	8.33%

表 4.4 4 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱調查鳥類各樣點出現指標 (續)

樣點	總工作時數	黑冠麻鷺	翠翼鳩	臺灣山鷓鴣	臺灣竹雞	臺灣藍鵲	領角鴉	鳳頭蒼鷹	樹鵲	藍腹鵲
A02	1754.50	1.14	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
A02-1	2184.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A09	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	2184.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B01	2184.00	13.28	0.92	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
B01-1	2184.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.46	1.37
B02	2184.00	0.92	2.29	0.92	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
B02-1	2184.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01	2184.00	24.27	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C01-1	2184.00	13.28	0.00	0.00	2.29	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
C02	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
C02-1	2184.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C03	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
C03-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04	1176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
C06	2184.00	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.46	0.00	0.00	0.00
C06-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C08	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
C08-1	2184.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00

廊道 01	2184.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廊道 02	2184.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
12 台相機有效動物數	90	8	6	8	8	2	0	1	8	
12 台相機平均 OI 值	3.45	0.32	0.23	0.31	0.31	0.08	0.00	0.04	0.31	
12 台相機出現樣區數	6	3	2	3	3	2	0	1	2	
12 台相機出現頻度	50.00%	25.00%	16.67%	25.00%	25.00%	16.67%	0.00%	8.33%	16.67%	
24 台相機有效動物數	140	8	6	30	12	4	2	3	11	
24 台相機平均 OI 值	2.68	0.16	0.11	0.57	0.23	0.08	0.04	0.06	0.21	
24 台相機出現樣區數	12	3	2	6	5	3	1	3	3	
24 台相機出現頻度	50.00%	12.50%	8.33%	25.00%	20.83%	12.50%	4.17%	12.50%	12.50%	

表 4.4-5 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 相機陷阱昆蟲各樣點出現指標

樣點	總工作時數	臺灣黃斑蝶	黑樹蔭蝶
A02	1754.50	0.00	0.00
A02-1	2184.00	0.00	0.00
A07	2184.00	0.00	0.00
A09	2184.00	0.00	0.00
A10	2184.00	0.00	0.00
AC	180.17	0.00	0.00
B01	2184.00	0.00	0.46
B01-1	2184.00	0.00	0.00
B02	2184.00	0.00	0.00
B02-1	2184.00	0.00	0.00
C01	2184.00	0.00	0.00
C01-1	2184.00	0.00	0.00
C02	2184.00	0.00	0.00
C02-1	2184.00	0.00	0.00
C03	2184.00	0.00	0.00
C03-1	2184.00	0.00	0.00
C04	1176.37	0.00	0.00
C04-1	2184.00	0.00	0.00
C06	2184.00	0.46	0.00
C06-1	2184.00	0.00	0.00
C08	2184.00	0.00	0.00
C08-1	2184.00	0.00	0.00
廊道 01	2184.00	0.00	0.00
廊道 02	2184.00	0.00	0.00
12 台相機有效動物數		1	1
12 台相機平均 OI 值		0.04	0.04
12 台相機出現樣區數		1	1
12 台相機出現頻度		8.33%	8.33%
24 台相機有效動物數		1	1
24 台相機平均 OI 值		0.02	0.02
24 台相機出現樣區數		1	1
24 台相機出現頻度		4.17%	4.17%

4.5 指標物種族群分佈監測及分析

4.5.1 領角鴞

表 4.5-1 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種領角鴞調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
領角鴞	2020/9/23	18:50-20:40	夜間領角鴞回播調查	回播法調查	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區(C 區)	4 人

4.5.1.1 本季調查成果分析

- 回播調查結果

營運中第 8 季夜間領角鴞回播調查於 2020/09/23 進行 (表 4.5-1)，回播調查結果於 B 及 C 區各記錄一隻領角鴞，而 A 區則無領角鴞回應 (表 4.5-2)。

- 夜間探照燈沿線調查結果

指標物種領角鴞於本計畫中亦輔以夜間探照燈沿線調查法來補充調查領角鴞在本區的分布，營運中第 8 季共記錄 9 隻的領角鴞個體，其中 A 區 5 隻、B 區 1 隻以及 C 區 3 隻，其出現位置如



圖 4.1-6。

4.5.1.2 施工前、施工中與營運中各季調查結果比較

施工前至本季 (營運中監測第 8 季) 之領角鴉回播調查結果，各月份單次調查記錄領角鴉隻次最少 0 隻次，最多 18 隻次，各季記錄隻次詳見表 4.5-2，密度指標變化 (每 100 公頃領角鴉回應隻數) 如圖 4.5-1。

由圖 4.5-1 來看，本區領角鴉密度的波動相當大，且似呈下降的趨勢。不過進行領角鴉密度比較時，需注意調查方法上的差異：施工中監測期間，同一個月的一趟完整調查會分於不同夜晚進行，再取其總和做為該月的數量值；而營運中監測則是由數人同步進行回播調查。由於各回播點的距離相對於領角鴉領域的尺度而言並不遠，取數日調查的總和很可能造成重複計數，這可能是施工階段領角鴉密度較營運階段高的原因之一。不過同樣就施工中階段比較，施工後期 (2016-2018 年) 領角鴉的密度仍較施工前期 (2014-2015 年) 低，有可能為工程干擾的影響，包括夜間施工之噪音干擾、棲地破壞造成領角鴉趨避、植被覆蓋度降低導致獵物 (昆蟲及地棲小獸類) 減少等。

進入營運階段以來，領角鴉密度大致維持在施工後期的偏低之密度。本季回播調查共有兩隻的紀錄，與前一年同季相同，仍處於密度偏低的狀況，並無預期中秋季為領角鴉的繁殖求偶季節而有較多鳴叫回應的狀況，搭配沿線調查的結果顯示單日至少能記錄到 4 隻的領角鴉個體，顯示仍有一定的數量與本區活動，因此回播的結果偏低，可能不完全是個體數量減少所造成，也可能與領角鴉活動時間與活動範圍等影響有關。

4.5.1.3 結論建議事項

綜合歷年回播調查、夜間探照燈沿線調查、相機陷阱及前案輔助調查採用之音聲陷阱法資料顯示，領角鴉廣泛分布在本區域淺山闊葉次生林，秋季鳴叫最為頻繁，為本區領角鴉主要的求偶季節。施工前及施工中第一年本區域整體領角鴉的密度維持穩定，但國家生技研究園區於 2014 年 8 月起全面施工後，夜間施工頻率與強度持續增加，干擾夜間活動的動物，而影響偵測到的數量，使得施工中第三年整體回應率呈現下降的趨勢。施工中第四年進入施工後期，工程干擾趨和緩，領角鴉回應隻數變化逐漸恢復到趨近季節性波動模式，顯示本區領角鴉的族群及棲地利用已有逐漸恢復的跡象。由於動物對於先前累積的干擾，常需要一段時日方能回復，其恢復速度將與補償復育區的植被的多樣化程度及覆蓋度增加速度有關。預期植栽成長到一定高度後，園區內平坦區域的無脊椎動物及小獸類將可望漸漸恢復，增加本區平坦地形領角鴉棲地與食物資源。為免影響領角鴉族群恢復狀態，建議後續應落實夜間光源管制規範，並妥善養護補償復育區的植被，讓其發揮預期的生態功能，則本區域的領角鴉將能重新回到研究專區及生態滯洪池附近的樹木活動棲息。目前族群似乎有逐漸穩定的趨勢，未來將持續以回播調查法並輔以沿線調查法的方式，分析與監測本區領角鴉的數量變化及棲地利用，留意影響其族群的因素，並提供適時的保育建議。

領角鴉回播調查記錄密度(隻次/100公頃)變化圖




圖 4.5-1 歷年夜間回播調查領角鴉密度變化圖

表 4.5-2 歷年指標物種領角鴉回播記錄隻次及密度指標

樣區	A 區		C 區						B 區		A 區	C 區	B 區	總計	密度指標 (隻/100 公頃)
回播點	回 1	回 2	回 3	回 4	回 5	回 6	回 7	回 8	回 9	回 10					
施工前第 1 季(秋季 2012/11)	1	1	1		2	1	1	4	1	3	2	9	4	15	10.0
施工前第 2 季(冬季 2013/2)		1	1		1		1	1	1	2	1	4	3	8	5.3
施工前第 5 季(秋季 2013/11)									1				1	1	0.7
施工中監測第 1 季(冬季 2014/2)	1#			1#	1&	1#			1&		1	3	1	5	3.3
施工中監測第 2 季(春季 2014/5)	1*	1*							1*		2		1	3	2.0
施工中監測第 3 季(夏季 2014/6/24)		1	1	2	1	1	2	1			1	8		9	6.0
施工中監測第 3 季(夏季 2014/6/25)	2	1			1	3		2	1		3	6	1	10	6.7
施工中監測第 3 季(夏季 2014/6/26)	1	2			1		2	1	2		3	4	2	9	6.0
施工中監測第 3 季(夏季 2014/6)小計	2	2	1	2	1	3	2	2	2		4	11	2	17	11.3
施工中監測第 3 季(夏季 2014/7/16)	2			3	3		1		2		2	7	2	11	7.3
施工中監測第 3 季(夏季 2014/7/17)		1			1				2		1	1	2	4	2.7
施工中監測第 3 季(夏季 2014/7/18)		1		2	3		3	3		1	1	11	1	14	9.3
施工中監測第 3 季(夏季 2014/7)小計	2	1		3	3		3	3	2	1	3	12	3	18	12.0
施工中監測第 3 季(夏季 2014/8/20)	2	1	1	2		3	2	2	1		3	10	1	14	9.3
施工中監測第 3 季(夏季 2014/8/21)		2		2	1	3		3	1		2	9	1	12	8.0
施工中監測第 3 季(夏季 2014/8/22)		1		1							1	1		2	1.3
施工中監測第 3 季(夏季 2014/8)小計	2	2	1	2	1	3	2	3	1		4	12	1	17	11.3
施工中監測第 5 季(秋季 2014/9)	1	2	1	1	1		2	2	2	1	3	7	3	13	8.7
施工中監測第 5 季(秋季 2014/10)			3	3			2	4		3		12	3	15	10.0
施工中監測第 5 季(秋季 2014/11)			3			1	1	4	3	2		9	5	14	9.3
施工中監測第 5 季(冬季 2014/12)				1	2		3		2	1		6	3	9	6.0
施工中監測第 5 季(冬季 2015/1)		1		2			1	2	3		1	5	3	9	6.0
施工中監測第 5 季(冬季 2015/2)			3	1	3		1	2		2		10	2	12	8.0
施工中監測第 6 季(春季 2015/3)	1	2			1		3	2			3	6		9	6.0
施工中監測第 6 季(春季 2015/4)			1	1			1	1				4		4	2.7
施工中監測第 6 季(春季 2015/5)		1				3			1		1	3	1	5	3.3
施工中監測第 7 季(夏季 2015/6)			2	1			1			1		4	1	5	3.3
施工中監測第 7 季(夏季 2015/7)	1	1		1		1	3		1	1	2	5	2	9	6.0
施工中監測第 7 季(夏季 2015/8)					1	1	1	3		2		6	2	8	5.3
施工中監測第 8 季(秋季 2015/9)	1	1		1		2	3				2	6		8	5.3
施工中監測第 8 季(秋季 2015/10)	2		1	1	1		1	1	1		2	5	1	8	5.3
施工中監測第 8 季(秋季 2015/11)	1	1	2	1	1	1	2	4	2	2	2	11	4	17	11.3
施工中監測第 9 季(冬季 2015/12)	1					1	1		2	2	1	2	4	7	4.7
施工中監測第 9 季(冬季 2016/1)		1	1	1	2	1					1	5		6	4.0
施工中監測第 9 季(冬季 2016/2)					1	1			1	1		2	2	4	2.7
施工中監測第 10 季(春季 2016/3)							1		1	1		1	2	3	2.0
施工中監測第 10 季(春季 2016/4)				2		1						3		3	2.0
施工中監測第 10 季(春季 2016/5)	1	1	1	2						2	2	3	2	7	4.7
施工中監測第 11 季(夏季 2016/6)					3		1			1		4	1	5	3.3

樣區	A 區		C 區						B 區		A 區	C 區	B 區	總計	密度指標 (隻/100 公頃)
回播點	回 1	回 2	回 3	回 4	回 5	回 6	回 7	回 8	回 9	回 10					
施工中監測第 11 季(夏季 2016/7)			1	1						1		2	1	3	2.0
施工中監測第 11 季(夏季 2016/8)			1	1	1				1	2		3	3	6	4.0
施工中監測第 12 季(秋季 2016/9)		1		1		3					1	4		5	3.3
施工中監測第 12 季(秋季 2016/10)														0	0.0
施工中監測第 12 季(秋季 2016/11)										1			1	1	0.7
施工中監測第 13 季(冬季 2016/12)						1			1			1	1	2	1.3
施工中監測第 13 季(冬季 2017/1)								1					1	1	0.7
施工中監測第 13 季(冬季 2017/2)		2					1			2	2	1	2	5	3.3
施工中監測第 14 季(春季 2017/3)									1				1	1	0.7
施工中監測第 14 季(春季 2017/4)	1			1	1			1		1	1	3	1	5	3.3
施工中監測第 14 季(春季 2017/5)	1					2	1	2	1		1	5	1	7	4.7
施工中監測第 15 季(夏季 2017/6)	1		1		1	1	1			1	1	4	1	6	4.0
施工中監測第 15 季(夏季 2017/7)				1	1	1			1	2	0	3	3	6	4.0
施工中監測第 15 季(夏季 2017/8)		2		1	1	2	1	1	1	2	2	6	3	11	7.3
施工中監測第 16 季(秋季 2017/9)		1	1		2			2	2	1	1	5	3	9	6.0
施工中監測第 16 季(秋季 2017/10)						1		2	1	2	0	3	3	6	4.0
施工中監測第 16 季(秋季 2017/11)				2	2			1			0	5	0	5	3.3
施工中監測第 17 季(冬季 2017/12)	1										1	0	0	1	0.7
施工中監測第 17 季(冬季 2018/1)				3		1		1			0	5	0	5	3.3
施工中監測第 17 季(冬季 2018/2)											0	0	0	0	0.0
施工中監測第 18 季(春季 2018/5)			1	2	1		1			2	0	5	2	7	4.7
營運中監測第 1 季(冬季 2019/2)	2			2			1		1		2	3	1	6	4.0
營運中監測第 2 季(春季 2019/5)	1	2		2	2		1	1		1					4.7
營運中監測第 3 季(夏季 2019/7)		1				1		1	1		1	2	1	4	2.7
營運中監測第 4 季(秋季 2019/10)		1			1						1	1	0	2	1.3
營運中監測第 5 季(冬季 2020/01)		1		3			1	1			1	5	0	6	4.0
營運中監測第 6 季(春季 2020/04)*			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0.0
營運中監測第 7 季(春季 2020/07)											0	0	0	0	0.0
營運中監測第 8 季(秋季 2020/09)						1				1	0	1	1	2	1.3

A 區-國家生技研究園區；B 區-生態研究區；C 區-其餘位於 202 兵工廠調查範圍

施工前：國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫、施工中：國家生技研究園區施工中生態委託調查分析專業服務計畫

施工中第 1、2 季監測每季進行 1 次回播調查；施工中第 3 季監測每月進行 3 次回播調查，各月各樣點數量為 3 次回播回應數量之最大值；施工中第 5 季起，每月各進行一次回播調查；營運期起，每季進行連續 3 天之回播調查，取最大值進行計算

* 營運第 6 季受疫情影響，無法進入軍區，僅在 A 區進行調查

4.5.2 大赤鼯鼠

表 4.5-3 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種大赤鼯鼠調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
大赤鼯鼠	2020/9/21	18:00-21:00	夜間大赤鼯鼠調查	沿線探照燈調查	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區 (C 區)	3 人
	2020/9/22	18:00-21:00	夜間大赤鼯鼠調查			3 人
	2020/9/23	18:00-21:00	夜間大赤鼯鼠調查			3 人

4.5.2.1 本季調查成果分析

指標物種大赤鼯鼠延續前案施工中監測方法，以夜間探照燈沿線調查法進行樣線調查，全區樣線總長度約為 9.3 km (圖 2.1-2)，調查日期如表 4.5-3。本季為營運中第 8 季調查，A、B、C 區有目擊及聲音記錄大赤鼯鼠 8 隻次。

4.5.2.2 各季沿線調查結果比較

營運中延續施工中調查全區樣線總長度約為 9.3 km，本季有目擊及聲音記錄大赤鼯鼠 8 隻次，密度指標為 0.86 隻次/km。比較施工前及施工中同季 (秋季) 之密度指標，施工中前期大赤鼯鼠之密度指標約在 0.8-1 隻次/km 間，而施工中後期至營運中第 7 季，密度指標約在 0.2-0.4 隻次/km 間，營運中第 6 季春季大赤鼯鼠密度指標為 1.43 隻次/km，為營運中 8 季以來最高的一次，但須注意此季僅於 A 區進行調查，樣線總長度與涵蓋環境不同，加上開花結果植物多，營運中第 7 季密度指標為 0.22 隻次/km，營運中指標變化圖在季間有高低起伏，推測本區之大赤鼯鼠有一定的族群數量，但受季節溫度、植物開花結果食源以及人員偵測度等因素影響，後續仍需持續監測以釐清本區大赤鼯鼠族群狀況。目前營運中的夜間調查採數人同步進行，以同一夜記錄的數值計算密度指標，施工中的夜間調查則分多日完成，較有可能重覆計數而造成較高估值。

4.5.2.3 結論建議事項

營運中第 5 季冬季無大赤鼯鼠記錄，可能為氣候及偵測度問題。本季秋季於 A、B、C 區有目擊及聲音記錄大赤鼯鼠 6 隻次。歷年監測結果顯示本區域的大赤鼯鼠主要分布在闊葉次生林內，在 A 區開發區主要於鄰近南北兩側的森林邊緣發現，特別是國家實驗動物中心大樓 (G 棟) 周邊森林有較為穩定的出現紀錄，其餘平坦地兩側森林邊緣甚少記錄大赤鼯鼠，顯示大赤鼯鼠之分布受與林地距離及連接程度的影響。

本案 G 棟、D 棟及 E 棟等均位於指狀凹谷內 (圖 1.1-2)，建築物之設立可能對大赤鼯鼠有所影響，因此建築物周邊應有所棲地補償。G 棟周邊已補植原生種樹苗，D 棟旁有樹木銀行及臺北樹蛙棲境復育區，E 棟周邊有東北角臨時性積水濕地復育區，後續若能妥善養護，預期未來應可連結南港山系，完善生態綠廊功效。未來將持續監測本區大赤鼯鼠的數量變化及棲地利用，並提供保育建議。



圖 4.5-2 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種大赤鼯鼠記錄點位分布圖




圖 4.5-3 歷年夜間沿線調查大赤鼯鼠密度指標變化圖

表 4.5-4 歷年指標物種大赤鼯鼠記錄隻次及密度指標

施工階段	年/月	沿線調查法					音聲陷阱法*				
		樣線長度(km)	A 區	B 區	C 區	密度指標(隻次/km)	陷阱數量	A 區	B 區	C 區	記錄樣點比例
施工前第 1 季	2012/11	9.95	0	1	2	0.3	-	-	-	-	-
施工前第 2 季	2013/2	9.95	0	1	5	0.6	-	-	-	-	-
施工前第 3 季	2013/4	9.95	2	0	0	0.2	-	-	-	-	-
施工前第 4 季	2013/7	9.95	1	0	0	0.1	-	-	-	-	-
施工前第 5 季	2013/11	9.95	0	1	3	0.4	-	-	-	-	-
施工中第 1 季	2014/2	-	-	-	-	-	7	1	1	1	42.9%
施工中第 2 季	2014/3	-	-	-	-	-	8	2	1	3	75.0%
	2014/4	-	-	-	-	-	8	1	1	4	75.0%
	2014/5	-	-	-	-	-	8	1	1	2	50.0%
施工中第 3 季	2014/6	6	0	1	3	0.7	8	1	1	3	62.5%
	2014/7	6	0	0	0	0.0	8	2	1	3	75.0%
	2014/8	6	0	2	3	0.8	3	1	1	1	100.0%
施工中第 4 季	2014/9	9.3	3	1	3	0.8	3	1	1		66.7%
	2014/10	9.3	4	0	4	0.9	3	1	1	1	100.0%
	2014/11	9.3	0	2	1	0.3	3	1	1	1	100.0%
施工中第 5 季	2014/12	9.3	4	0	4	0.9	3	1	1	1	100.0%
	2015/1	9.3	0	1	4	0.5	3	1	1	1	100.0%
	2015/2	9.3	1	2	5	0.9	3	1	1	1	100.0%
施工中第 6 季	2015/3	9.3	2	1	3	0.6	3	1	1	1	100.0%
	2015/4	9.3	4	3	8	1.6	3	1	1	1	100.0%
	2015/5	9.3	3	1	2	0.6	3	1	1	1	100.0%
施工中第 7 季	2015/6	9.3	0	0	1	0.1	3	1	1	1	100.0%
	2015/7	9.3	2	5	2	1.0	3	1	1	1	100.0%
	2015/8	9.3	1	1	5	0.8	3	1	1	1	100.0%
施工中第 8 季	2015/9	9.3	1	1	3	0.5	3	1	1	1	100.0%
	2015/10	9.3	1	2	4	0.8	3	1	1	1	100.0%
	2015/11	9.3	1	3	2	0.6	3	1	1	1	100.0%
施工中第 9 季	2015/12	9.3	0	2	0	0.2	3	1	1	1	100.0%
	2016/1	9.3	0	0	0	0.0	3	1	1	1	100.0%
	2016/2	9.3	0	0	2	0.2	3	1	1	1	100.0%
施工中第 10 季	2016/3	9.3	0	3	5	0.9	3	1	1	1	100.0%
	2016/4	9.3	3	3	7	1.4	3	1	1	1	100.0%
	2016/5	9.3	1	4	7	1.3	3	1	1	1	100.0%
施工中第 11 季	2016/6	9.3	0	0	1	0.1	3	1	1	1	100.0%
	2016/7	9.3	0	2	1	0.3	3	1	1	1	100.0%
	2016/8	9.3	1	5	2	0.9	3	1	1	1	100.0%
施工中第 12 季	2016/9	9.3	0	1	3	0.4	3	1	1	1	100.0%
	2016/10	9.3	2	0	1	0.3	3	1	1	1	100.0%
	2016/11	9.3	3	1	5	1.0	3	1	1	1	100.0%
施工中第 13 季	2016/12	9.3	1	2	0	0.3	-	-	-	-	-

施工階段	年/月	沿線調查法					音聲陷阱法*				
		樣線長度(km)	A 區	B 區	C 區	密度指標(隻次/km)	陷阱數量	A 區	B 區	C 區	記錄樣點比例
	2017/1	9.3	1	3	5	1.0	-	-	-	-	-
	2017/2	9.3	0	0	1	0.1	-	-	-	-	-
施工中第 14 季	2017/3	9.3	2	1	3	0.6	-	-	-	-	-
	2017/4	9.3		1	1	0.2	-	-	-	-	-
	2017/5	9.3	1	1	5	0.8	-	-	-	-	-
施工中第 15 季	2017/6	9.3	1	1	1	0.3	-	-	-	-	-
	2017/7	9.3	1	0	2	0.3	-	-	-	-	-
	2017/8	9.3	3	1	3	0.8	-	-	-	-	-
施工中第 16 季	2017/9	9.3	2	1	0	0.3	-	-	-	-	-
	2017/10	9.3	2	0	7	1.0	-	-	-	-	-
	2017/11	9.3	1	1	4	0.6	-	-	-	-	-
施工中第 17 季	2017/12	9.3	0	1	1	0.2	-	-	-	-	-
	2018/1	9.3	0	0	0	0.0	-	-	-	-	-
	2018/2	9.3	0	0	3	0.3	-	-	-	-	-
施工中第 18 季	2018/5	9.3	1	2	4	0.8	-	-	-	-	-
施工中第 19 季	2018/8	9.3	1	0	2	0.3	-	-	-	-	-
施工中第 20 季	2018/9	9.3	0	0	2	0.2					
	2018/10	9.3	5	1	2	0.3					
	2018/11	9.3	0	0	9	0.7	-	-	-	-	-
營運中第 1 季	2019/2	9.3	1	2	2	0.3	-	-	-	-	-
營運中第 2 季	2019/5	9.3	1	2	5	0.3	-	-	-	-	-
營運中第 3 季	2019/7	9.3	0	0	3	0.2	-	-	-	-	-
營運中第 4 季	2019/10	9.3	1	3	2	0.4	-	-	-	-	-
營運中第 5 季	2020/1	9.3	0	0	0	0	-	-	-	-	-
營運中第 6 季**	2020/4	2.8	4	-	-	1.42	-	-	-	-	
營運中第 7 季	2020/7	9.3	2	0	0	0.22	-	-	-	-	-
營運中第 8 季	2020/9	9.3	4	2	2	0.86					

* 2014 年 2 月音聲陷阱數量共 7 個 (A 區 3 個、B 區 1 個、C 區 3 個)；2014 年 3-7 月音聲陷阱數量共 8 個 (A 區 3 個、B 區 1 個、C 區 4 個)；2014 年 8 月-2016/11 月音聲陷阱數量共 3 個 (A、B、C 區各 1 個)，2016 年 12 月取消音聲陷阱法

**營運中第 6 季僅調查國家生技研究園區 (A 區)。生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區 (C 區)，因新冠肺炎疫情影響，而暫緩入廠調查

4.5.3 白鼻心

表 4.5-5 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種白鼻心調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
白鼻心	2020/9/21	09:00-12:00	日間哺乳類調查	沿線痕跡調查法、小獸類鼠籠誘捕法、蝙蝠超音波偵測器錄音法	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區 (C 區)	3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/22	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/23	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/24	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
	2020/12/1-2 (電池記憶卡更換) 2020/9/1-2020/11/30(相機工作時間)			紅外線相機陷阱調查		3 人

4.5.3.1 監測方法及調查樣點

指標物種白鼻心於施工前監測規劃為使用相機陷阱調查法進行，本案接續以相機陷阱法輔以穿越線調查進行指標物種白鼻心的監測。穿越線調查樣線如圖 2.1-2，本季進行日、夜間全區穿越線 3 重複之調查；營運階段相機陷阱法共計架設 24 台自動相機，架設樣點其中 13 個樣點為延續施工中 1-20 季的樣點，並額外新增 11 台自動相機 (表 4.4-2、圖 2.5-1)。

本本季全區歷年架設之 12 臺相機總工作時數為 24770.87 小時，各樣點工作時數平均為 2064.24 小時，最短工作時數為 C04 相機的 1176.37 小時，最長工作時數為 2184 小時，共拍攝物種有效照片 1020 張 (一小時內拍攝到同一物種，非不同個體之所有照片視為一張有效照片)。本季全區 24 臺相機總工作時數為 48975 小時，各樣點工作時數平均為 2040.63 小時，最短工作時數為 A12 相機的 180.17 小時，最長工作時數為 2184 小時，共拍攝物種有效照片 1864 張。相機電池、記憶卡更換日期詳表 4.4-1。

4.5.3.2 本季調查成果分析

● 穿越線調查結果

本季 (2020 年 9 月) 全區穿越線於 C 區 C1 穿越線有記錄到白鼻心掘痕 1 筆。

● 自動相機調查結果

營運中第 8 季 (2020 年 9 至 11 月) 歷年架設之 12 台自動相機攝得白鼻心有效動物數 169 筆，平均 OI 值 7.29，出現樣點數共計 10 處，出現樣點比例為 83%；24 台自動相機攝得白鼻心有效動物數 413 筆，平均 OI 值 8.30，出現樣點數共 18 處，出現樣點比例為 75%。各樣點 OI 值最高為 B01-1 的 61.81，其次為 C01-1 的 25.64。全區皆有白鼻心活動 (表 4.5-6)。

4.5.3.3 歷年比較分析

取歷年架設之 12 台自動相機平均 OI 值與施工前及施工中歷年資料相比 (表 4.5-6)，其中，施工前相機 OI 值計算採逐季累積的方式，難以區分各季 OI 值，施工前 5 季白鼻心的平均 OI 值為 2.5，此值可以視為施工前本區白鼻心的相對密度指標值。

本區域歷年白鼻心出現指數，在 2015 年有個顯著的高峰期 (圖 4.5-5)，顯示此期間本區活動的白鼻心個體數較多，或是個體活動較為頻繁。由於白鼻心為偏向食果性動物的雜食性食肉目動物，當森林果實大發生時常會吸引鄰近區域的個體進入覓食，而造成該地區在植物果實豐年期間族群密度較高的現象。由 3 個分區 2015 年度白鼻心出現指數均呈現類似的波動趨勢，及 2015 年國家生技研究園區正處在激烈破壞階段，但本區域的白鼻心出現指數卻為歷年最高，且該年度也有幾筆在鄰近施工區的北側生態保留區邊緣發現白鼻心採食植物果實的目擊紀錄來看，推測 2015 年自動相機偵測到白鼻心的出現指數增加，可能是當年度本區域植物結果量處於年間高峰期，因食物資源增加吸引周邊白鼻心聚集取食或因而頻繁活動，使得相機偵測率提高。因此，在探討本園區施工對於白鼻心族群影響時，必須考慮植物果實物候的年度波動對族群波動的影響。然而，施工中後期白鼻心的平均出現指數呈現逐年下降趨勢，施工中第 3、4 年的年度平均 OI 值低於施工前 5 季的平均 OI 值，顯示園區生態經過 2014 年夏季至 2016 年夏季的施工時期，對本區的白鼻心族群可能有負面影響，惟其影響程度可能比不上食物資源帶來的波動，但仍需與予留意。施工中第 5 年 (2018 年) 的平均 OI 值則已有升高的跡象，顯示白鼻心的族群可能已逐漸恢復。

本季為營運中第 8 季，營運階段 12 台相機之白鼻心平均 OI 值，相比於施工階段有上升的趨勢，白鼻心發現數量呈季節性波動，在春夏時因植物果實發生期而有較高的趨勢。

4.5.3.4 結論建議事項

白鼻心為廣泛分布在中、低海拔闊葉林內的雜食性食肉目，其腳墊具有十字溝槽及許多圓凸小肉墊等特化，使其能在樹上穩健抓握行走，有利於其採食樹上果實，為中、低海拔闊葉樹種重要的種子傳播者，並對人類干擾有一定的容忍程度。歷年資料顯示白鼻心為本區域族群僅次於鼬獾的中小型食肉目動物，廣泛分布於各區。

本案在施工期間曾有白鼻心的出現指數下降之趨勢，不過隨著施工期進入後期，園區從破壞最激烈的階段緩慢進入復原期，白鼻心的出現指數近兩年已有恢復。在此恢復階段，各項生態復育措施如低海拔原生雜木林樹苗的撫育等相當重要，應督導工程單位確實妥善養護使其成林，將能吸引白鼻心、大赤鼯鼠、麝香貓等食果性哺乳動物及眾多食果性鳥類前來覓食，有助於本區低海拔闊葉次生林的復原與演替。

此外，食物資源量可能對白鼻心的族群波動有相當大的影響。可考慮增加經費定量收集本地區樹木果實的物候資料，來釐清食物資源與人為干擾對本區白鼻心族群波動的貢獻程度。未來將依循相同方法，繼續監測白鼻心在本地區族群動態的長期趨勢，並提供適時建議。



圖 4.5-4 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種白鼻心記錄點位分布圖




圖 4.5-5 歷年指標物種白鼻心出現指數 (OI 值) 變化圖

表 4.5-6 歷年指標物種白鼻心各相機陷阱出現指數

樣點	施工前	施工中				施工中																		
		2014	2015	2016	2017	第 1~2 季	第 3 季	第 4 季	第 5 季	第 6 季	第 7 季	第 8 季	第 9 季	第 10 季	第 11 季	第 12 季	第 13 季	第 14 季	第 15 季	第 16 季	第 17 季	第 18 季	第 19 季	
		2012/11~ 2013/11	2014/02~ 2014/11	2014/11~ 2015/11	2015/11~ 2016/11	2016/11~ 2017/11	2014/2~5	2014/5~8	2014/8~11	2014/11~ 2015/2	2015/2~5	2015/5~8	2015/8~11	2015/11~ 2016/2	2016/2~5	2016/5~8	2016/8~11	2016/12~ 2017/2	2017/3~5	2017/6~8	2017/9~11	2017/12~ 2018/2	2018/3~ 5	2018/6~8
A01	0.5	-	-			遭竊(替代為 A05)																		
A02	2.8	3.2	9.6			3.2	4	2.7	5.7	15.1	15	5.4	0	3.8	4.8	0	0	0	3.3	0.5	0	2.9	1.8	
A02-1	2019 年春季新設																							
A03	3	4.7	1.5			11.1	5	2.5	1.5	遭竊(替代為 A07)														
A04	施工中新設	0.2	-			0.5	0	0	遭竊(替代為 A08)															
A05	施工中新設	0.8	-			2014 年夏季 新設	1	移至 A06																
A06	施工中新設	3.5	17.5			2014 年秋季新設		3.5	29.1	14.9	9.8	8.7	1.5	1	6.5	1.6	1.5	移至 A10						
A07	施工中新設	-	16.2			2015 年春季新設				14.2	19.8	7.8	1	1	3.6	2.4	0.8	2.5	1	1.8	10.3	0	13.3	
A08	施工中新設	-	4.4			2015 年春季新設				2	8.9	1.3	1	2.5	1.6	1.5	-	移至 A09						
A09	2017 年冬季新設(取代 A08)																	0	0	0.6	1	0	0.9	3.6
A10	2017 年冬季新設(取代 A06)																	0.9	1.2	5.9	0	0.9	4.6	17.8
A12																								
B01	0.1	0.4	0.1			0.9	0	0	0	1.1	0	0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0.9	0	
B01-1	2019 年春季新設																							
B02	施工中新設	1.2	0.6			1.5	1.1	0.9	0	1	1.4	0	0	0.9	1	-	0	0	2.9	2.3	1.4	4.1	10.9	
B02-1	2019 年春季新設																							
C01	施工中新設	5.3	3.5			8.4	3.4	3.3	1.6	5.6	5	2.4	0	8.2	9.5	5.5	0.8	2.3	7.7	2.7	0.9	4.2	11.3	
C01-1	2019 年春季新設																							
C02	5.7	5.7	8.7			6.1	8.6	2.3	2.5	12.7	16.9	3.9	5.4	4.8	-	2.6	0	8.6	8.6	0.5	0.5	9.1	13.2	
C02-1	2019 年春季新設																							
C03	8	2.4	1.9			6	0	0.5	1.2	2	2.2	2.4	0.7	3.7	5.1	0	1.2	6.1	8.5	1.1	4.2	1.4	3.2	
C03-1	2019 年春季新設																							
C04	施工中新設	7	23.9			12.6	1.9	1.8	50.2	29.5	13.7	3.8	0	4	3	4.4	0.9	0	1.4	0.8	0.9	0.9	6.3	
C4-1	2019 年春季新設																							
C05	施工中新設	-	-			遭竊(替代為 C07)																		
C06	施工中新設	1.3	1.9			1.4	1.9	0.5	0	2	5.8	0	0	0	0	0	0	0.5	4.5	0.9	0.5	0	0.5	
C06-1	2019 年春季新設																							

C07	施工中新設	1	0.9			2014 年夏季 新設	0.8	1.1	0	3.3	0	0	1	0.9	0.5	2.4	-	移至 C08					
C08	2017 年冬季新設(取代 C07)																0	2.3	3.2	0.5	0.9	2.7	0.9
C08-1	2019 年春季新設																						
廊道 01	2019 年春季新設																						
廊道 02	2019 年春季新設																						
12 台總工作小時	89,967	61,703	92,023			19,739	19,676	22,288	25,545	21,361	23,001	22,115	17,877	20,904	23,405	16,330	23,009	20,402	21,790	22,538	22,893	20,859	24,187
12 台有效照片數	226	182	681			95	48	36	216	199	210	56	12	58	81	27	10	43	91	24	32	54	149
12 台平均 OI 值	-	2.8	7			4.7	2.3	1.6	8.3	8.6	8.2	3	0.9	2.6	3.3	1.9	0.5	2	4	1	1.7	2.6	6.9
12 台出現樣點數	-	13	13			10	9	10	7	12	10	8	6	11	10	7	6	7	11	10	9	10	11
12 台出現頻度	-	100%	100%			91%	75%	83%	64%	100%	83%	67%	50%	92%	91%	64%	46%	58%	92%	83%	75%	83%	92%
24 台總工作小時	89,967	61,703	92,023			19,739	19,676	22,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 台有效照片數	226	182	681			95	48	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 台平均 OI 值	-	2.8	7			4.7	2.3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 台出現樣點數	-	13	13			10	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 台出現頻度	-	100%	100%			91%	75%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

樣點	營運中							
	第 1 季	第 2 季	第 3 季	第 4 季	第 5 季	第 6 季	第 7 季	第 8 季
	2018/12~ 2019/2	2019/3~5	2019/6~8	2019/9~ 11	2019/12~2020/2	2020/3~2020/5	2020/6~2020/8	2020/9~2020/11
A01								
A02	0	4.53	2.54	0.49	1.02	2.26	21.42	1.14
A02-1	0	3.17	0.45	1.37	0.92	0	1.37	0.92
A03								
A04								
A05								
A06								
A07	6.34	24.8	1.36	0.46	0	0	0	0.46
A08								
A09	3.46	1.88	4.08	0	1.02	8.15	10.01	6.87
A10	0	3.14	3.17	1.37	0.46	3.62	14.57	1.83
A12	0	0	0	0	0	0	0	0
B01	0	0	0	0	0	0	12.74	3.21
B01-1	0	2.26	9.96	8.24	0	0	23.21	61.81
B02	0	4.53	0	1.37	0	0	24.58	16.03
B02-1	0	器材遺失	記憶卡毀損	2.3	2.82	0	5.46	0
C01	4.45	8.61	9.51	0	0.94	0	18.66	16.03
C01-1	0	1.36	3.17	1.37	0.93	0	16.39	25.64
C02	1.66	23.55	13.59	10.45	0.47	0	0.46	0
C02-1	0	6.79	17.21	9.62	0	0	0	4.12
C03	0	1.81	4.53	1.87	0	0	0	0.46
C03-1	0	1.36	3.62	0	2.76	0	3.19	0
C04	7.79	2.26	0.45	3.21	0	0	52.97	21.25
C4-1	0	7.25	1.81	2.3	4.65	0	1.49	2.29
C05								
C06	8.89	0	0.45	3.21	5.17	0	30.04	20.15
C06-1	0	5.22	2.72	0.92	0	0	5.01	1.37

C07								
C08	0	1.81	1.36	0	0	0	11.83	0
C08-1	0	0.91	4.98	8.07	0.94	0	0.46	3.66
廊道 01	0	0	0.91	0	0	0.91	21.05	11.9
廊道 02	0	3.18	4.08	0.46	0.46	0	0	0
12 台總工作小時	17,935	27,476	24,681	26,074	24,091		25,399	24,771
12 台有效照片數	58	151	86	39	19		387	169
12 台平均 OI 值	2.72	6.41	3.42	1.87	0.76		16.44	7.29
12 台出現樣點數	6	10	10	8	6		10	10
12 台出現頻度	46%	77%	83%	67%	50%		83%	83%
24 台總工作小時	-	46,779	48,969	52,147	44,127		50,788	48,975
24 台有效照片數	-	214	194	102	48		555	413
24 台平均 OI 值	-	4.71	3.91	2.38	0.94		11.45	8.30
24 台出現樣點數	-	19	20	17	12		19	18
24 台出現頻度	-	79%	83%	71%	50%		79%	75%
A 區 6 台總工作小時						13248		
A 區 6 台有效照片數						33		
A 區 6 台平均 OI 值						2.49		
A 區 6 台出現樣點數						4		
A 區 6 台出現頻度						66.67		

* 營運中第 6 季 (2020 年春季) 受疫情影響，僅在 A 區做調查

4.5.4

表 4.5-7 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種調查工作時間表

類群	調查日期	調查時間	調查項目	調查方法	地點	調查人力
	2020/9/21	09:00-12:00	日間哺乳類調查	沿線痕跡調查法、小獸類鼠籠誘捕法、蝙蝠超音波偵測器錄音法	國家生技研究園區 (A 區)、生態研究區 (B 區)、202 兵工廠區 (C 區)	3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/22	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/23	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
		18:00-21:00	夜間哺乳類調查			3 人
	2020/9/24	09:00-12:00	日間哺乳類調查			3 人
	2020/12/1-2 (電池記憶卡更換) 2020/9/1-2020/11/30(相機工作時間)			紅外線相機陷阱調查		3 人

4.5.4.1 監測方法及調查樣點

。

。

4.5.4.2 本季調查成果分析

• 穿越線調查結果

。

• 自動相機調查結果與歷年比較

。

4.5.4.3 歷年比較分析

。

4.5.4.4 結論建議事項

。

。

。

圖 4.5-6 營運中第 8 季 (2020 年 9-11 月) 指標物種記錄點位分布圖

圖 4.5-7 歷年指標物種出現指數 (OI 值) 變化圖

表 4.5-8 歷年指標物種[REDACTED]各相機陷阱出現指數

* 營運中第 6 季 (2020 年春季) 受疫情影響，僅在 A 區做調查

五、本季調查結果討論與綜合分析

5.1 陸域生態

營運中第 8 季陸域動物調查結果，共記錄有鳥類 29 科 54 種、哺乳類 12 科 18 種、兩棲類 5 科 9 種、爬蟲類 6 科 11 種、蝶類 5 科 67 種、蜻蛉類成蟲 8 科 28 種、螢火蟲 1 科 1 種。陸域動物調查記錄之保育類物種有 15 種，包括 1 種一級瀕臨絕種保育類動物 (■)，10 種二級珍貴稀有保育類動物 (藍腹鷗、東方蜂鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黑鳶、黃嘴角鴉、領角鴉、■、麝香貓、無霸勾蜓)，與 4 種三級其他應予保育類動物 (台灣山鷓鴣、紅尾伯勞、台灣藍鵲與食蟹獐)。

鳥類方面，指標物種領角鴉在經過兩季回播調查無回應後，本季有 2 隻次回應；過去資料顯示本區域的領角鴉於秋季的回應隻次最高，因此本季由回播法換算而得的密度 (1.3 隻次/100 公頃) 與過去相比仍是偏低的。但夜間沿線調查時有記錄到 9 隻個體，顯示本區領角鴉仍有相當數量，只是在固定回播點的回應並不理想，可能與其領域變動有關。

哺乳類方面，大赤鼯鼠的密度指標為 0.65 隻次/km，自第 6 季記錄到的特高值 (1.42 隻次/km) 回復至過去三年來的水平。白鼻心在固有 12 台相機之平均 OI 值為 7.29，出現樣點比例為 83%，較前一季的特高值低，不過仍屬偏高的數值。■在固有 12 台相機平均 OI 值為 0.12，出現樣點比例為 17%，較施工後期高，但較前季低，是否營運以來的恢復趨勢能夠持續值得關注。

兩棲類部分，本季外來入侵種斑腿樹蛙的數量相當高，分佈範圍也十分廣泛，需擬定提出更有效率的控制方法，例如設置誘捕陷阱捕捉，並持續控制監測斑腿樹蛙在本區域的情形。

爬蟲類部分，本季■類捕獲 3 隻次的■，均於鄰近 B 區的 202 兵工廠 C 區捕獲，1 隻為林務局野放之個體，1 隻為本團隊曾捕獲之個體，1 隻為新記錄個體。■。

蝶類部分，尖翅翠蛺蝶為近年新出現於台灣的外來種，2019 年 10 月首次在基隆被記錄到，2020 年 5 月曾於園區被生態委員目擊，本季則在園區吊網陷阱中捕獲雌蝶，須持續監測並留意。

陸域植物部分，移植喬木以及新植原生樹苗生長狀況，依歷季資料顯示，原移植楓香共有 352 株，後來因工程一再移植，許多未尋獲。2018 年複查到 151 株楓香，當中僅有 102 株楓香存活，存活率 67.5%；2019 年複查仍有多數楓香未尋獲，僅複查到 63 株楓香，存活率為 61.8%；本季 (2020 年) 存活之楓香有 54 株，存活率為 88.9%，歷季存活之楓香的總存活率為 15.3%。其餘周圍樹種由於歷季的移植與補植資訊不明，無資料核對，難以評估，故不列入統計。新植原生樹苗則因標牌被全數拔除後，於本季再重新掛牌，表示現今資訊與過往資訊無法核對，難以和歷年資料比較，因此存活率需重新進行估計。在新植原生樹苗之中，受到蟲害干擾的樹種主要有 4 種，分別為稜果榕、水同木、錫蘭饅頭果、穗花棋盤腳，若是情況嚴重可能導致植物死亡，可針對上述之樹種多加注意。

12 月移植喬木以及新植原生樹苗生長狀況複查，與上次 (10、11 月) 調查資料相比，本季並無明顯差異之變動，存活之楓香同為 54 株，存活率 100%，歷季之楓香 (原先共移

植 352 株) 總存活率 15.3%，其餘周圍樹種苗木亦無變化，除了因天氣潮濕造成楓香枯木上有明顯真菌生長。同樣新植原生苗木生長狀況方面亦無變化，除了受病蟲害影響之樹種有新增 9 株(當中包含新增 2 種，分別是臭娘子與海州常山)，存活率方面僅有 1 株奧氏虎皮楠明顯枯死。重新掛牌後，短時間內的複查難以馬上反映植物的生長與存活概況，加上以往的資料均已無法核對，因此仍需長時間的持續觀察。本區如今干擾減少，植被覆蓋與濕地品質逐漸改善，生態功能與群聚網絡隨著新物種的加入愈趨完備與穩定，但仍須持續管控外來植種及外來動物的族群。本季曾拍攝到家貓捕食臺灣鼫鼠之畫面，顯示外來種對原生動物產生威脅，可能成為限制部分動物族群的重要因子。

5.2 水域生態

營運中第 8 季水域動物調查共調查到水域動物魚類 5 科 12 種、兩棲類 (含卵與幼體) 2 科 2 種、蝦蟹類 3 科 6 種、螺貝類 5 科 8 種、水棲昆蟲 (含蜻蛉類水蠅) 11 科 19 種、環節動物 2 科 4 種、浮游動物 7 科 11 種共 24 個種類。

水域動物中，四分溪麗魚科的數量依舊龐大，是本季中主要的組成物種，原生的粗首馬口鱖數量較上季明顯下降。滯洪池本季高體鰱魚數量相當低，而三重埔埤則發現了較上季還要多的個體，需要留意滯洪池的生態品質。

本季蝦蟹螺所調查到的個體數較上季有所減少，物種數方面與上季相同，日本絨螯蟹較上季更為活躍，在四分溪及滯洪池中都發現了不少個體，特有種凱達格蘭新米蝦則是明顯減少，本季僅發現 2 隻個體；本季螺貝類物種數略有下降而個體數則略有上升，椎蜷科物種及臺灣蜆的增加最為明顯，而臺灣椎實螺數量則是呈現出下降的情形。

本季浮游動物個體數明顯增加，而物種數則有所減少，本季採樣記錄到的浮游動物以橈足類佔多數，但大多為未成熟之個體而僅能鑑定至科的層級，因此無法呈現處正確的種類。

滯洪池本季調查的狀況仍舊不佳，高體鰱魚數量低迷，浮游動物與水棲昆蟲的數量也偏低，推測與前季進行棲地管理、水位下降有關，須密切監測其復原情況。

5.3 建議事項

- 鳥擊狀況持續追蹤與分析：

園區現行的鳥擊通報系統與記錄內容已相對完善，並已逐步推動具體改善措施，包括採用窗貼、請各單位配合拉窗簾等。本年度前兩季鳥類撞擊次數有呈現降低的趨勢，顯示鳥擊的防範措施似有一定的防範作用；但近兩季卻又數量大增，本季並有保育類之松雀鷹。建議對撞擊位置進行分析，考慮增加使用窗貼的範圍。

- 評估流浪犬貓控管計畫：

本季區內仍有相當數量的流浪犬貓遊蕩，雖然進入營運期以來，山羌、白鼻心、食蟹獾與■■■■等哺乳動物皆有 OI 值增加或分布範圍擴張的趨勢，不過過去曾記錄有遭犬隻攻擊而斷尾的■■■■、遭犬隻攻擊致死的白鼻心、遭家貓捕食之臺灣鼫鼠等，顯見流浪犬貓在個體層級上仍會威脅園區野生動物的安危；此外，■■■■，本季亦捕獲受傷之■■■■，可能為受野生貓犬攻擊所致。園區雖已禁止飼主帶寵物

進入區內，並已聯繫臺北市動保處商請協助移除，但由於動保處收容能量已滿，無法協助進行捕捉移置作業，以致現有流浪犬隻問題無法解決；建議與動保處保持聯繫，並持續監測現有犬隻的活動地點與結群狀況，以俾在動保處有收容空間時可最有效率地進行捕捉，並考慮採行認養、絕育釋回等逐漸減量之動作。

- **持續水域外來種移除：**

本季斑腿樹蛙的數量增加，分佈範圍也有擴散的趨勢，需持續進行移除，以維護棲地品質與原生物種的族群。

- **園方與各協力廠商之密切溝通：**

希望園區內有任何工程或生態措施經營管理進行時，可以通知相關或可能接觸之協力廠商，避免各廠商間的訊息或調查資料有所落差，資訊的平行交流讓大家更瞭解園區的現況，共同努力讓園區變得更加完善。

六、參考文獻

- Audubon New York City, 2007. Bird-safe building guidelines. New York City Audubon Society, Inc. Available at: <http://www.nycaudubon.org/pdf/BirdSafeBuildingGuidelines.pdf>
- Carbone, E., S. Christie, T. Coulson, N. Franklin, J. Ginsberg, M. Griffiths, J. Holden, K. Kawanishi, M. Kinnaird, R. Laidlaw, A. Lynam, D.W. Macdonald, D. Martyr, D. McDougal, L. Nath, T. O'Brien, J. Seidensticker, D. Smith, M. Sunquist, R. Tilson, and W.N.W. Shahrudin. 2001. The use of photographic rates to estimate densities of tigers and other cryptic mammals. *Animal Conservation* 4:75-79.
- Chen T. H., K. Y. Lue. 2010. Population status and distribution of the aquatic freshwater turtles in Taiwan. *Oryx* 44:261-266.
- Chiang, P. J., K. J. C. Pei, M. R. Vaughan, and C. F. Li. 2012. Niche relationships of carnivores in a subtropical primary forest in southern Taiwan. *Zoological Studies* 51:500-511.
- Chiang, P.-J. 2007. Ecology and conservation of Formosan clouded leopard, its prey, and other sympatric carnivores in southern Taiwan. Ph.D. dissertation. Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, U.S.A.
- Lin Y. F., S. H. Wu, J. J. Mao, and T. H. Chen. 2010. Population status and distribution of the endangered yellow-margined box turtle *Cuora flavomarginata* in Taiwan. *Oryx* 44:581-587
- Lue K. Y., T. H. Chen. 1999. Activity, movement patterns, and home range of the yellow-margined box turtle (*Cuora flavomarginata*) in northern Taiwan. *Journal of Herpetology* 33:590-600.
- Rovero, F., and A. R. Marshall. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. *Journal of Applied Ecology* 46:1011-1017.
- Sládeček, H. 1973. System of water quality from the biological point of view. *Arch. Hydrobiol. Beih.* 7:1-218.
- Wang, H. 1999. Wildlife conservation in rural southeastern China: wildlife harvest and the ecology of sympatric carnivores. Ph.D. Dissertation. University of Massachusetts, Amherst. 181pp.
- Wu, J. T. 1999. Occurrence of Four Freshwater Rhodophytes in Taiwan. *Taiwania* 44(1):145-153.
- Zelinka, M. and P. Marvan, 1961. Zur Präzisierung der biologischen Klassifikation der Reiheit fliessender Gewässer. *Arch. Hydrobiol.* 57:387-497.
- 千原光雄、村野正昭。1997。日本産海洋浮游生物検索図説。東海大學出版會。
- 山路勇。1986。日本海洋浮游生物圖鑑。保育社出版。
- 川合禎次。1985。日本産水生昆蟲検索圖説。日本東海大學出版會。
- 中央研究院。2012。國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書（定稿本）【本文冊】。行政院環境保護署。
- 中央研究院。2012。國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書（定稿本）【附錄冊】。行政院環境保護署。
- 毛俊傑。2011。淺山森林環境的有鱗目爬行類動物相調查需要多少努力量？建國百年森林資源永續經營研討會—生態暨保育組論文集。pp.253-262。
- 水野壽彥。1987。日本淡水浮游生物圖鑑。Hoikusha Publishing Co. Ltd. Japan。
- 王立言。1987。溪頭地區大赤鼯鼠之行為及生態學研究。國立臺灣大學動物學研究所 碩士論文。
- 臺北市捷運局。2010。臺北市區鐵路地下化東延南港工程南港車站 BOT 設計案環境影響說明書。行政院環境保護署。
- 臺北市捷運局。2011。臺北都會區大眾捷運系統捷運南港線東延段工程環境影響差異分析報告。

- 行政院環境保護署。
- 交通部臺灣鐵路管理局。2010。臺北市區鐵路地下化東延南港工程南港車站 BOT 設計案環境影響說明書。行政院環境保護署。
- 行政院農業委員會。2019。保育類野生動物名錄 (108 年 1 月 9 日公告)。行政院農業委員會。
- 行政院環境保護署。1999。基隆河指標生物調查方法的藻類。行政院環境保護署。
- 行政院環境保護署。2002。植物生態評估技術規範。行政院環境保護署。
- 行政院環境保護署。2003。動物評估規範核定本。行政院環境保護署。
- 行政院環境保護署。2011。動物生態評估技術規範 (100.7.12 公告修訂)。行政院環境保護署。
- 行政院環境保護署環境檢驗所。1990。臺灣河川污染生物指標一底棲動物類。
- 何健鎔。2004。奧萬大森林遊樂區螢火蟲資源調查及賞螢可行性評估(1/2)。行政院農業委員會林務局南投林區管理處。
- 吳俊宗、吳先琪，以生態工法淨化水庫水質控制優養化研究計畫，國立臺灣大學執行，行政院環保署委託，民國 94 年 12 月。
- 李玲玲、林雅玲、黃俊嘉、郭浩志。2007。大鹿林道東線工程之環境監測。內政部營建署雪霸國家公園管理處。
- 李培芬、謝長富、曹先紹。2012。臺北市生物多樣性指標調查計畫。臺北市動物保護處。
- 李培芬。1982。大赤鼯鼠之生態與生殖。國立臺灣大學動物學研究所碩士論文。
- 汪良仲。2000。臺灣的蜻蛉。人人出版。
- 沈世傑。1989。臺灣魚類誌。國立臺灣大學動物學系。
- 周銘泰、高瑞卿。2011。臺灣淡水及河口魚圖鑑。晨星出版。
- 林文隆、王穎。2010。領角鴉 (*Otus lettia*) 在都會區的繁殖生物學。2010 臺灣猛禽生態研討會。
- 林文隆。2003。臺灣中部森林領角鴉繁殖生物學初探。臺灣猛禽研究 1: 29-35 頁。
- 林佩蓉。2000。福山試驗林食果動物隊五種樟科樹木果實與種子的利用。國立東華大學碩士論文。
- 林春吉。2007。臺灣淡水魚蝦生態大圖鑑(上)。天下遠見出版股份有限公司。
- 林春吉。2007。臺灣淡水魚蝦生態大圖鑑(下)。天下遠見出版股份有限公司。
- 林春吉。2009。臺灣水生與溼地植物生態大圖鑑(上)。天下遠見出版股份有限公司。
- 林春吉。2009。臺灣水生與溼地植物生態大圖鑑(下)。天下遠見出版股份有限公司。
- 林春吉。2009。臺灣水生與溼地植物生態大圖鑑(中)。天下遠見出版股份有限公司。
- 林致綱。2012。臺中霧峰地區大赤鼯鼠之活動範圍與巢位利用。臺灣師範大學生命科學系碩士論文。
- 林敬勛。2011。臺東鸞山地區臺灣穿山甲 (*Manis pentadactyla pentadactyla*) 活動範圍與洞穴利用之研究。國立屏東科技大學野生動物保育研究所碩士論文。
- 祁偉廉、徐偉。2008。臺灣哺乳動物。大樹文化事業股份有限公司。
- 邵廣昭、陳麗淑。2004。魚類圖鑑。遠流出版社。
- 南港輪胎股份有限公司。2009。南港輪胎南港廠開發計畫環境影響說明書。行政院環境保護署。
- 施志昀、李伯。2009。臺灣淡水蟹圖鑑。晨星出版社。
- 施志昀、游祥平。1998。臺灣淡水蝦。國立海洋生物博物館。
- 胡鴻鈞、李堯英、魏印心、朱蕙忠、陳嘉佑、施之新。1981。中國淡水藻類。上海科學技術出版社。
- 范中行。2005。翡翠水庫臺灣穿山甲洞穴棲地研究。臺灣大學森林環境暨資源學系碩士論文。
- 徐堉峰。2000。臺灣蝶圖鑑第一卷。國立鳳凰谷鳥園。
- 徐堉峰。2002。臺灣蝶圖鑑第二卷。國立鳳凰谷鳥園。

- 徐堉峰。2006。臺灣蝶圖鑑第三卷。國立鳳凰谷鳥園。
- 徐崇斌、楊平世。1997。「應用水生昆蟲生物指標評估基隆河水質之研究」。中華昆蟲 17(3):pp.152-162。
- 張永達、陳俊雄。2003。夢幻湖生態系保護區臺灣水韭保育與植群演替監測。陽明山國家公園管理處執行。
- 張俊彥。2006。高速公路照明對沿線生態之影響。交通部臺灣區國道新建工程局。
- 曹美華、葉文琪、陳錫隆。2005。臺灣 120 種蜻蜓圖鑑。臺北市野鳥學會。
- 郭奇芊。1998。福山試驗林大赤鼯鼠 (*Petaurista petaurista*) 之食性、活動範圍及活動模式。臺灣大學動物學研究所 碩士論文。
- 野聲環境生態顧問有限公司。2017-2018。國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務第十三季 - 第二十季報告書 (定稿本)。中央研究院。
- 陳子英、毛俊傑、阮忠信。2006。南澳闊葉樹林自然保留區神祕湖濕地演替之研究。行政院農業委員會林務局保育研究系列第 94-09 號。
- 陳主恩。1999。福山試驗林臺灣獼猴 (*Macaca cyclopis*) 對於植物種子傳播的影響。國立臺灣大學動物學研究所 碩士論文。
- 陳志煌。2001。關刀溪森林生態系干擾地土壤種子庫及小苗組成之研究。國立中興大學植物學系 碩士論文。
- 陳添喜。1998。臺灣北部地區斑龜 (*Ocadia sinensis*) 及食蛇龜 (*Cistoclemmys flavomarginata*) 生活史之研究。國立臺灣師範大學生物學系博士論文。124 頁。
- 陳雪臻。2015。福山試驗林雌性大赤鼯鼠棲所形質與溫度緩衝程度。國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所 碩士論文。
- 陳義雄、方力行。1999。臺灣淡水及河口魚類誌。國立海洋生物博物館出版。
- 陸聲山。2005。臺灣北部山區穿山甲分布、現況及生態之研究。農委會林業試驗所 94 年度自辦科技計畫。
- 曾建偉、曾翌碩、林文隆。2009。臺灣南部地區領角鴉 (*Otus lettia*) 利用人工巢箱繁殖的案例探討。野生動物保育彙報及通訊 13(3):36-39。
- 森若美代子、齊家、王錫永。1996。臺灣地區水庫浮游藻類圖鑑。行政院環境保護署環境檢驗所。
- 湯冠臻、曾彥學、曾喜育、呂金誠。2011。臺中大坑地區次生林土壤種子庫組成之研究。林業研究季刊 33(1): 35-48。
- 華梵大學團隊。2014-2016。國家生技研究園區施工中生態監測委託調查分析專業服務第一季 - 第十二季報告書(定稿本)。中央研究院。
- 黃美秀、曾貴鴻。2013。國道 3 號 286K 動物通道白鼻心利用情形調查。交通部高速公路局南區工程處白河工務段。
- 黃增泉、吳俊宗、謝長富。1999。環境影響評估及環境影響說明書有關陸域植物生態之調查及撰寫規範。國立臺灣大學植物學系。
- 黃增泉、吳俊宗、謝長富。1999。環境影響評估及環境影響說明書有關陸域植物生態之調查及撰寫規範---臺灣地區稀特有植物名錄。國立臺灣大學植物學系。
- 楊平世。1992。水棲昆蟲生態入門。臺灣省政府教育廳。
- 楊懿如、向高世、李鵬翔、李承恩。2008。臺灣兩棲動物-野外調查手冊。行政院農業委員會林務局。
- 經濟部。2011。國家會展中心 (南港展覽館擴建) 新建工程暨附屬工程環境影響說明書。行政院環境保護署。

- 詹雅婷。2009。圈養臺灣穿山甲繁殖行為與親子關係之研究。國立屏東科技大學野生動物保育研究所 碩士論文。
- 裴家騏、姜博仁。2004。大武山自然保留區和周邊地區雲豹及其他中大型哺乳動物之現況與保育研究(三)。行政院農委會林務局保育研究 92-02 號。行政院農委會林務局。
- 裴家騏、陳美汀。2008。新竹、苗栗之淺山地區小型食肉目動物之現況與保育研究(3/3)。行政院農業委員會林務局。
- 裴家騏。1998。利用自動照相設備記錄野生動物活動模式之評估。臺灣林業科學 13(4): 289-296。
- 裴家騏。2006。自動相機自動動物監測上之應用與成效分析。利用紅外線自動相機於野生動物調查小型研討會。
- 趙榮台。1989。臺灣穿山甲 (*Manis pentadactyla pentadactyla*) 之繁殖保存研究：一般生物學與現況分析。
- 劉小如。2007。陽明山國家公園生態廊道系統評估之研究。陽明山國家公園管理處。
- 劉世賢。2008。雌性臺灣白鼻心生殖模式之研究。中興大學獸醫學系暨研究所博士論文。
- 劉育宗。2011。利用聲音回播探討領角鴉棲地選擇之研究。高雄師範大學生物科技系碩士論文。
- 蔡育倫、袁孝維、陳寶忠、楊翕雯。2004。木柵地區臺灣穿山甲野外棲地初探。臺大實驗林研究報告 18(1):29-34。
- 鄭世嘉。1991。臺灣特有亞種白鼻心之生物學研究。臺灣師範大學生物學研究所碩士論文。
- 鄭錫奇、方引平、周政翰。2010。臺灣蝙蝠圖鑑。行政院農業委員會特有生物研究保育中心。
- 鄭蕙如。2004。臺灣大學校園領角鴉冬季繁殖觀察。臺灣猛禽研究第 3 期。
- 賴景陽。2005。臺灣貝類圖鑑。貓頭鷹出版社。
- 龍巖股份有限公司。2012。南港中南段一小段 737 等 2 筆地號大樓新建工程環境影響說明書。行政院環境保護署。
- 濱野榮次、白水隆、朱耀沂。1987。臺灣蝶類生態大圖鑑。牛頓出版社。
- 謝森和。2004。水棲昆蟲調查技術，整合性生物資源調查人力培訓研討會講義(p76-90)。楊正澤、郭雅惠主編。中興大學。
- 觀察家生態顧問有限公司。2011。營運階段國道永續發展環境復育改善研究計畫。交通部臺灣區國道高速公路局。
- 觀察家生態顧問有限公司。2012。以紅外線自動相機調查法瞭解臺灣野生動物資源。動物行為學研討會。
- 觀察家生態顧問有限公司。2014。國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫。中央研究院。